

※※2020年12月改訂（第7版 販売名変更に伴う改訂）

※2009年3月改訂

含嗽剤

(7w/v%ポビドンヨード含嗽剤)

※※ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」※※

※※Povidone-Iodine Gargle Solution 7%“SIOE”

貯法：直射日光を避けて室温保存

使用期限：容器等に記載

日本標準商品分類番号

87226

承認番号 30200AMX00731

薬価収載 薬価基準収載

販売開始 1990年10月

【禁忌】（次の患者には使用しないこと）

本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

成分・含量 (1mL中)	日本薬局方 ポビドンヨード 70mg (有効ヨウ素 7mg)
添加物	リン酸水素ナトリウム水和物、無水リン酸二水素ナトリウム、グリセリン、サッカリンナトリウム水和物、 <i>l</i> -メントール、ポリソルベート80、香料、エタノール
性状	赤褐色の液で、わずかに特異なおいがあり、味はわずかに甘い。 pH：2.5～3.5 比重 ₂₀ ²⁰ ：約1.00

【効能・効果】

咽喉炎、扁桃炎、口内炎、拔牙創を含む口腔創傷の感染予防、口腔内の消毒。

【用法・用量】

用時15～30倍（本剤2～4mLを約60mLの水）に希釈し、1日数回含嗽する。

【使用上の注意】

(1) 慎重投与（次の患者には慎重に使用すること）

甲状腺機能に異常のある患者〔血中ヨウ素の調節ができず甲状腺ホルモン関連物質に影響を与えるおそれがある。〕

(2) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

●重大な副作用（頻度不明）

ショック、アナフィラキシー（呼吸困難、不快感、浮腫、潮紅、蕁麻疹等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

●その他の副作用

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
口腔	口腔、咽喉の刺激感等、口腔粘膜びらん、口中のあれ等
消化器	悪心等
その他	不快感

注) 症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

(3) 適用上の注意

1) 使用部位

含嗽用だけに使用させること。

2) 使用時

ア. 用時希釈して使用させること。

イ. 拔牙後等の口腔創傷の場合、血餅の形成が阻害されると考えられる時期には、はげしい洗口を避けさせること。

ウ. 眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

エ. 銀を含有する補綴物等が変色することがある。

【薬効薬理】

1. 抗菌作用

ポビドンヨードは広範囲な殺菌作用をもち、グラム陽性菌・グラム陰性菌、結核菌、真菌、一部ウイルスに有効である。

芽胞形成菌の芽胞には効果が劣るとされている。¹⁾

※※2. ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」の最小発育阻止濃度(MIC)²⁾

菌種	MIC(μg/mL)
グラム陽性菌	
<i>Staphylococcus aureus</i> IFO12732	1,600
<i>Streptococcus mutans</i> IFO13956	1,600
グラム陰性菌	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> IFO13275	6,400
<i>Proteus vulgaris</i> IFO3988	6,400
<i>Escherichia coli</i> IFO3806	12,800
<i>Enterobacter cloacae</i> IFO13595	3,200

MIC(μg/mL)は、ポビドンヨードとしての濃度を示す。


【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ポビドンヨード(Povidone-Iodine)

化学名：Poly[1-(2-oxopyrrolidin-1-yl)ethylene]iodine

分子式：(C₆H₉NO)_n・xI

化学構造式：



性状：ポビドンヨードは暗赤褐色の粉末で、わずかに特異なおいがある。本品は水又はエタノール(99.5)に溶けやすい。本品1.0gを水100mLに溶かした液のpHは1.5～3.5である。

【取扱い上の注意】

1) 本剤は用時希釈し、希釈後は早目に使用すること。

2) 皮膚や衣類に付着した場合は、水で容易に洗い落とせる。また、チオ硫酸ナトリウム溶液で脱色できる。

※※3) 安定性試験³⁾

最終包装製品を用いた長期保存試験（室温、3年）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

【包装】

250mL 30mL×50

※※【主要文献】

1) 古泉秀夫 他：薬事新報, 932, 980(1977)

2) シオエ製薬(株)社内資料

3) シオエ製薬(株)社内資料 ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」の安定性試験

※※【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

シオエ製薬株式会社 製品情報担当

〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

TEL 06(6470)2102

FAX 06(6499)8132

製造販売元 **シオエ製薬株式会社**
兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

販売 **日本新薬株式会社**
京都市南区吉祥院西ノ庄門町14