

※※2021年6月改訂（第3版）
 ※2021年2月改訂

日本標準商品分類番号
872649

貯法：1. 遮光した気密容器に保存
 2. 室温保存
 使用期限：外箱及び内袋の表示を参照

※※ 承認番号	ロキソプロフェンNaパップ 100mg「ラクール」 30200 A M X 00205000 ロキソプロフェンNaパップ 200mg「ラクール」 30300 A M X 00064000
※※ 薬価収載	ロキソプロフェンNaパップ 100mg「ラクール」 2020年6月 ロキソプロフェンNaパップ 200mg「ラクール」 2021年6月
※※ 販売開始	ロキソプロフェンNaパップ 100mg「ラクール」 2020年6月 ロキソプロフェンNaパップ 200mg「ラクール」 2021年6月

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」

※※ **ロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」**

LOXOPROFEN Na PAP 100mg「RAKOOL」



LOXOPROFEN Na PAP 200mg「RAKOOL」

ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤

【禁忌】（次の患者には使用しないこと）

- 本剤の成分に過敏症の既往歴のある患者
- アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある患者〔喘息発作を誘発することがある。〕

【組成・性状】

※※ 販売名	ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」 ロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」
※※ 成分・含量（1枚中）	ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」 1枚10×14cm（膏体10g）中にロキソプロフェンナトリウム水和物（日局）113.4mg（無水物として100mg）含有 ロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」 1枚14×20cm（膏体20g）中にロキソプロフェンナトリウム水和物（日局）226.8mg（無水物として200mg）含有
添加物	グリセリン、酸化チタン、カルメロースナトリウム、タルク、ケイ酸アルミン酸Mg、エデト酸Na水和物、ポリソルベート80、クロタミトン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ハッカ油、pH調節剤、その他1成分
性状	白色～淡黄色の膏体を支持体に展延し、膏体表面をライナーで被覆したパップ剤で、ハッカ油の芳香を有する。
※※ 大きさ（質量）	ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」 10×14cm（膏体10g/140cm ² ） ロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」 14×20cm（膏体20g/280cm ² ）
※※ 識別コード	ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」  308 ロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」  309

【効能・効果】

下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛
 変形性関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛

【用法・用量】

1日1回、患部に貼付する。

【使用上の注意】

- 慎重投与（次の患者には慎重に使用すること）
 気管支喘息の患者〔病態を悪化させることがある。〕
- 重要な基本的注意
 (1) 消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。

- 皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるので、感染による炎症に対して用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に使用すること。
- 慢性疾患（変形性関節症等）に対し本剤を用いる場合には薬物療法以外の療法も考慮すること。また、患者の状態を十分に観察し、副作用の発現に留意すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) **重大な副作用**（頻度不明）

ショック、アナフィラキシー：ショック、アナフィラキシー（血圧低下、蕁麻疹、喉頭浮腫、呼吸困難等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) **その他の副作用**

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

頻度不明	
皮膚	そう痒、紅斑、接触性皮膚炎、皮疹、皮下出血、皮膚刺激、色素沈着、水疱、腫脹
消化器	胃不快感、上腹部痛、下痢・軟便
肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇
その他	浮腫

4. 高齢者への使用

他社が実施したロキソプロフェンナトリウムパップ剤及びテープ剤の製造販売後調査の結果、65歳以上の高齢者での副作用の発現率（3.7%、1,738例中65例）は、65歳未満（1.7%、1,300例中22例）と比較して有意に高かった。主な副作用が貼付部の皮膚症状であったことから、特に65歳以上の高齢者に使用する場合は、貼付部の皮膚の状態に注意すること。

※ **5. 妊婦、産婦、授乳婦等への使用**

- 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。〔妊娠中の使用に関する安全性は確立していない。〕
 シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。
- 他の非ステロイド性消炎鎮痛剤の外皮用剤を妊娠後期の女性に使用し、胎児動脈管収縮が起きたとの報告がある。

6. 小児等への使用

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない（使用経験が少ない）。

7. 適用上の注意

使用部位：

- (1) 損傷皮膚及び粘膜に使用しないこと。
- (2) 湿疹又は発疹の部位に使用しないこと。

【薬物動態】

生物学的同等性試験¹⁾

ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」と標準製剤について、健康成人男性の背部皮膚に貼付したときのロキソプロフェンの皮膚への移行量を、角層内ロキソプロフェン回収量を指標として生物学的同等性を検証した。得られた両製剤のロキソプロフェン回収量の平均値の差の90%信頼区間は、生物学的同等性の判定基準 [$\log(0.7\sim 1.43)$] を満たしていたことから、両製剤の生物学的同等性が確認された。

【薬効薬理】^{2),3)}

ロキソプロフェンナトリウム水和物は急性炎症・慢性炎症、疼痛に対して、優れた抗炎症・鎮痛作用を示す。本剤は皮膚から吸収された後、活性代謝物trans-OH体に変換されて作用する。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ロキソプロフェンナトリウム水和物


(Loxoprofen Sodium Hydrate)

化学名：Monosodium 2-[4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoate dihydrate

分子式：C₁₅H₁₇NaO₃ · 2H₂O

分子量：304.31

構造式：



性状：白色～帯黄白色の結晶又は結晶性の粉末である。水又はメタノールに極めて溶けやすく、エタノール(95)に溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。水溶液(1→20)は旋光性を示さない。

【取扱い上の注意】

※※ 1. 安定性試験^{4),5)}

最終包装製品を用いた長期保存試験(温度25℃、相対湿度60%、3年間)の結果、ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」及びロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」は、通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

2. 開封後は開封口のファスナーをきちんとしめること。

※※【包装】

ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」

35枚(7枚×5)、350枚(7枚×50)

ロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」

140枚(7枚×20)

※※【主要文献】

- 1) 東光薬品工業株式会社 社内資料(生物学的同等性試験)
- 2) 松田啓一ほか：炎症 1982;2(3):263-266
- 3) 松澤孝泰ほか：臨床医薬 2006;22(3):187-203
- 4) 東光薬品工業株式会社 社内資料(安定性試験)
- 5) 東光薬品工業株式会社 社内資料(安定性試験)

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

ラクール薬品販売株式会社 D I 室

〒123-0864 東京都足立区鹿浜1-9-14

TEL：03-3899-8881 FAX：03-3853-9641

発売元
 ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元
 東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号