

## 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2013 に準拠して作成

抗アレルギー点眼剤

# エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「杏林」

EPINASTINE HYDROCHLORIDE Ophthalmic Solution

(エピナスチン塩酸塩点眼液)

剤形	水性点眼剤
製剤の規制区分	該当しない
規格・含量	1mL中、エピナスチン塩酸塩 0.5mg 含有
一般名	和名：エピナスチン塩酸塩 (JAN) 洋名：Epinastine Hydrochloride (JAN)
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2021年2月15日 薬価基準収載年月日：2021年6月18日 発売年月日：2021年6月18日
開発・製造販売(輸入)・ 提携・販売会社名	製造販売元：キョーリンリメディオ株式会社 販売元：杏林製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	キョーリンリメディオ株式会社 学術部 TEL：0120-960189 FAX：0120-189099 受付時間：8時～22時（日、祝日、その他当社の休業日を除く） 医療関係者向けホームページ <a href="https://med.kyorin-rmd.com/">https://med.kyorin-rmd.com/</a>

本 IF は 2021 年 3 月作成の添付文書の記載に基づき作成した。

最新の添付文書情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ <https://www.pmda.go.jp/>にてご確認下さい。

# IF利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

## 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、I F と略す）の位置付け並びに I F 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において I F 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において新たな I F 記載要領 2008 が策定された。

I F 記載要領 2008 では、I F を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること（e-I F）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-I F が提供されることとなった。

最新版の e-I F は、（独）医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-I F を掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-I F の情報を検討する組織を設置して、個々の I F が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、I F 記載要領の一部改訂を行い I F 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

## 2. I F とは

I F は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は I F の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された I F は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

### 【I F の様式】

- ①規格は A 4 判、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ② I F 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「I F 利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2 頁にまとめる。

### 【I Fの作成】

- ① I Fは原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ② I Fに記載する項目及び配列は日病薬が策定したI F記載要領に準拠する。
- ③ 添付文書の内容を補完するとのI Fの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「I F記載要領 2013」と略す）により作成されたI Fは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

### 【I Fの発行】

- ① 「I F記載要領 2013」は、平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ② 上記以外の医薬品については、「I F記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはI Fが改訂される。

## 3. I Fの利用にあたって

「I F記載要領 2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体のI Fについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、I Fの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やI F作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、I Fの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、I Fが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、I Fの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

## 4. 利用に際しての留意点

I Fを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。I Fは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、I Fがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013年4月改訂)

# 目次

I. 概要に関する項目	1	VII. 薬物動態に関する項目	10
1. 開発の経緯	1	1. 血中濃度の推移・測定法	10
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	2. 薬物速度論的パラメータ	10
II. 名称に関する項目	2	3. 吸収	11
1. 販売名	2	4. 分布	11
2. 一般名	2	5. 代謝	11
3. 構造式又は示性式	2	6. 排泄	11
4. 分子式及び分子量	2	7. トランスポーターに関する情報	12
5. 化学名（命名法）	2	8. 透析等による除去率	12
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2	VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	13
7. CAS登録番号	2	1. 警告内容とその理由	13
III. 有効成分に関する項目	3	2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）	13
1. 物理化学的性質	3	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	13
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	13
3. 有効成分の確認試験法	3	5. 慎重投与内容とその理由	13
4. 有効成分の定量法	3	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	13
IV. 製剤に関する項目	4	7. 相互作用	13
1. 剤形	4	8. 副作用	13
2. 製剤の組成	4	9. 高齢者への投与	14
3. 用時溶解して使用する製剤の調製法	4	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	14
4. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	4	11. 小児等への投与	14
5. 製剤の各種条件下における安定性	4	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	14
6. 溶解後の安定性	6	13. 過量投与	14
7. 他剤との配合変化（物理化学的変化）	6	14. 適用上の注意	15
8. 溶出性	6	15. その他の注意	15
9. 生物学的試験法	6	16. その他	15
10. 製剤中の有効成分の確認試験法	6	IX. 非臨床試験に関する項目	16
11. 製剤中の有効成分の定量法	6	1. 薬理試験	16
12. 力価	6	2. 毒性試験	16
13. 混入する可能性のある夾雑物	6	X. 管理的事項に関する項目	17
14. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	6	1. 規制区分	17
15. 刺激性	6	2. 有効期間又は使用期限	17
16. その他	7	3. 貯法・保存条件	17
V. 治療に関する項目	8	4. 薬剤取扱い上の注意点	17
1. 効能又は効果	8	5. 承認条件等	17
2. 用法及び用量	8	6. 包装	17
3. 臨床成績	8	7. 容器の材質	17
VI. 薬効薬理に関する項目	9	8. 同一成分・同効薬	17
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	9	9. 国際誕生年月日	17
2. 薬理作用	9	10. 製造販売承認年月日及び承認番号	18
		11. 薬価基準収載年月日	18

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	18
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	18
14. 再審査期間	18
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	18
16. 各種コード	18
17. 保険給付上の注意	18
X. 文献	19
1. 引用文献	19
2. その他の参考文献	19
XI. 参考資料	20
1. 主な外国での発売状況	20
2. 海外における臨床支援情報	20
XII. 備考	21
1. その他の関連資料	21

# I. 概要に関する項目

## 1. 開発の経緯

本剤は、後発医薬品として薬食発 1121 第 2 号(平成 26 年 11 月 21 日)に基づき、規格及び試験方法を設定、安定性試験を行い承認申請し、2021 年 2 月に承認、2021 年 6 月に発売に至った。また、本剤は標準製剤の分析結果に基づき、添加剤の種類及び含量(濃度)が標準製剤と同一となるよう処方設計を行ったものであり、pH、粘度、浸透圧などの物理化学的性質が近似することから、生物学的に同等とみなされた。

なお、本剤は、後発医薬品として、キョーリン リメディオ株式会社、東和薬品株式会社の 2 社で共同開発を実施し、共同開発グループとして実施したデータを共有し、承認を得た。


## 2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- 1) 本剤はエピナスチン塩酸塩を有効成分とする抗アレルギー点眼剤であり、アレルギー性結膜炎の適応を有している。
- 2) 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

副作用として、眼瞼炎、眼痛、流涙、点状角膜炎、そう痒感、結膜充血、眼脂、刺激感、異物感、羞明が報告されている。

(Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、8. 副作用(3)その他の副作用の項を参照)

## II. 名称に関する項目

1. 販売名	
(1) 和名	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「杏林」
(2) 洋名	EPINASTINE HYDROCHLORIDE Ophthalmic Solution
(3) 名称の由来	一般名+剤形+規格(含量)+「杏林」
2. 一般名	
(1) 和名(命名法)	エピナスチン塩酸塩 (JAN)
(2) 洋名(命名法)	Epinastine Hydrochloride (JAN) Epinastine (INN)
(3) ステム	抗ヒスタミン剤: -astine
3. 構造式又は示性式	
4. 分子式及び分子量	分子式: $C_{16}H_{15}N_3 \cdot HCl$ 分子量: 285.77
5. 化学名(命名法)	( <i>R, S</i> )-3-Amino-9,13b-dihydro-1 <i>H</i> -dibenz[ <i>c, f</i> ]imidazo[1,5- <i>a</i> ]azepine hydrochloride (IUPAC)
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	特になし
7. CAS 登録番号	108929-04-0 (Epinastine Hydrochloride) 80012-43-7 (Epinastine)

### Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質	
(1) 外観・性状	白色～微黄色の結晶性の粉末である。
(2) 溶解性	水、メタノール、エタノール(95)又は酢酸(100)に溶けやすく、アセトニトリルにやや溶けにくい。
(3) 吸湿性	該当資料なし
(4) 融点(分解点)、沸点、凝固点	融点：約 270°C (分解)
(5) 酸塩基解離定数	該当資料なし
(6) 分配係数	該当資料なし
(7) その他の主な示性値	メタノール溶液(1→20)は旋光性を示さない。
2. 有効成分の各種条件下における安定性	該当資料なし
3. 有効成分の確認試験法	(1) 沈殿反応 (2) 紫外可視吸光度測定法 (3) 赤外吸収スペクトル測定法 (臭化カリウム錠剤法) (4) 塩化物の定性反応(2)
4. 有効成分の定量法	電位差滴定法 (0.1mol/L 過塩素酸で滴定)



## IV. 製剤に関する項目

1. 剤形	
(1) 投与経路	点眼
(2) 剤形の区別、外観及び性状	剤形：水性点眼剤 性状：無色澄明、無菌製剤
(3) 製剤の物性	該当資料なし
(4) 識別コード	KRM013
(5) pH、浸透圧比、粘度、比重、安定なpH域等	pH：6.7～7.3 浸透圧比：0.9～1.1（生理食塩液に対する比）
(6) 無菌の有無	本剤は無菌製剤である。
2. 製剤の組成	
(1) 有効成分(活性成分)の含量	1mL 中、エピナスチン塩酸塩 0.5mg 含有
(2) 添加物	リン酸二水素ナトリウム水和物、リン酸水素ナトリウム水和物、ホウ酸、塩化ナトリウム、エデト酸ナトリウム水和物、pH調節剤
(3) 添付溶解液の組成及び容量	該当しない
3. 用時溶解して使用する製剤の調製法	該当しない
4. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	該当しない
5. 製剤の各種条件下における安定性	<b>【加速試験】<sup>1)</sup></b> ＜保存条件＞ 40±2℃、75±5%RH ＜試験検体＞ ポリプロピレン製の容量 5mL のプラスチック容器、ポリエチレン製の中栓、ポリプロピレン製のキャップ、紙箱

## IV. 製剤に関する項目

### <試験項目及び規格>

試験項目	規 格
性状	無色澄明の液
確認試験	液体クロマトグラフィーにより試験を行うとき、試料溶液及び標準溶液から得たエピナスチンのピークの保持時間は一致する。また、保持時間の一致したそれぞれのピークの紫外吸収スペクトルを比較するとき、両者のスペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。
純度試験※	個々の類縁物質：1.0%以下 類縁物質の合計：2.0%以下
浸透圧比	0.9~1.1（生理食塩液に対する比）
pH	6.7~7.3
不溶性異物	澄明で、たやすく検出される不溶性異物を認めない。
不溶性微粒子	300 $\mu$ m以上の不溶性微粒子が1個/mL以下
無菌	微生物の増殖が観察されない。
ホウ酸含量	95~110%
定量法	95.0~107.0%

※承認規格には設定されていないが、弊社評価項目として実施した。

### <試験結果>

(3ロット、各ロット n=3)

試験項目	開始時	1 ヶ月	3 ヶ月	6 ヶ月
性状	適	適	適	適
確認試験	適	適	適	適
純度試験	適	適	適	適
浸透圧比※	0.96	0.97	0.98	0.98
pH※	6.99	6.97	6.99	7.00
不溶性異物	適	適	適	適
不溶性微粒子	適	適	適	適
無菌	(-)			(-)
ホウ酸含量※	98.63%	99.66%	102.51%	100.86%
定量法(含量)※	100.45%	100.77%	100.65%	101.84%

(-)：菌の発育を認めず

※1ロット n=3 の3ロットの平均値

## IV. 製剤に関する項目

6. 溶解後の安定性	該当しない
7. 他剤との配合変化 (物理化学的変化)	該当資料なし
8. 溶出性	該当しない
9. 生物学的試験法	該当しない
10. 製剤中の有効成分 の確認試験法	液体クロマトグラフィー
11. 製剤中の有効成分 の定量法	液体クロマトグラフィー
12. 力価	該当しない
13. 混入する可能性の ある夾雑物	該当資料なし
14. 注意が必要な容 器・外観が特殊な 容器に関する情報	特になし
15. 刺激性	<b>【眼粘膜刺激性試験】<sup>2)</sup></b> 雄性ウサギ(n=6)の右眼にエピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%「杏林」を、左眼に陰性対照物質として生理食塩液を各々1回につき 50 $\mu$ L ずつ、1時間間隔で 8回、7日間、投与を行った。投与1日の1回目の投与前、各投与日(投与1~7日)の最終投与後1時間、投与7日の最終投与後 24、48、72、96 及び 168 時間に角膜、虹彩及び結膜について左眼と比較し、肉眼的に観察し、発現した反応の程度を Draize の判定基準により判定した。その結果、エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%「杏林」は無刺激物であると評価された。

## IV. 製剤に関する項目

### 16. その他

滴下数及び1滴質量について試験した結果、以下のとおりであった。<sup>3)</sup>

試験回数	滴下可能回数	1滴質量※
1回目	103回	49.60mg
2回目	104回	48.01mg
3回目	103回	48.43mg

※10滴の平均値

本資料は参考資料であり、1滴質量及び滴下可能回数を保証するものではありません。

## V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果	アレルギー性結膜炎
2. 用法及び用量	通常、1回1滴、1日4回（朝、昼、夕方及び就寝前）点眼する。
3. 臨床成績	
(1) 臨床データパッケージ	該当資料なし
ジ	
(2) 臨床効果	該当資料なし
(3) 臨床薬理試験	該当資料なし
(4) 探索的試験	該当資料なし
(5) 検証的試験	
1) 無作為化並行用量	該当資料なし
反応試験	
2) 比較試験	該当資料なし
3) 安全性試験	該当資料なし
4) 患者・病態別試験	該当資料なし
(6) 治療的使用	
1) 使用成績調査・特	該当資料なし
定使用成績調査	
（特別調査）・製造	
販売後臨床試験	
（市販後臨床試験）	
2) 承認条件として実施	該当しない
予定の内容又は実施	
した試験の概要	

## VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	ヒスタミン H <sub>1</sub> 受容体拮抗薬： エバスチン、オロパタジン塩酸塩、ケトチフェンフマル酸塩、セチリジン塩酸塩、デスロラタジン、ビラスチン、フェキソフェナジン塩酸塩、ベタボスチンベシル酸塩、レボセチリジン塩酸塩、ロラタジン など
2. 薬理作用	
(1) 作用部位・作用機序	抗ヒスタミン薬（ヒスタミン H <sub>1</sub> 受容体拮抗薬）であり、抗アレルギー作用を示す。抗ヒスタミン薬は第一世代と第二世代に分類され、エピナスチンは第二世代の非鎮静性 H <sub>1</sub> 受容体拮抗薬であり、第一世代に多い中枢抑制作用や自律神経への効果などの副作用は少なく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎及び花粉症など慢性的な症状の治療薬として汎用されている。 <sup>4)</sup>
(2) 薬効を裏付ける試験成績	該当資料なし
(3) 作用発現時間・持続時間	該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法	
(1) 治療上有効な血中濃度	該当資料なし
(2) 最高血中濃度到達時間	該当資料なし
(3) 臨床試験で確認された血中濃度	該当資料なし
(4) 中毒域	該当資料なし
(5) 食事・併用薬の影響	該当資料なし
(6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因	該当資料なし
2. 薬物速度論的パラメータ	
(1) 解析方法	該当資料なし
(2) 吸収速度定数	該当資料なし
(3) バイオアベイラビリティ	該当資料なし
(4) 消失速度定数	該当資料なし
(5) クリアランス	該当資料なし
(6) 分布容積	該当資料なし
(7) 血漿蛋白結合率	該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

3. 吸収	該当資料なし
4. 分布	
(1) 血液－脳関門通過性	該当資料なし
(2) 血液－胎盤関門通過性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与の項(1)を参照
(3) 乳汁への移行性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与の項(2)を参照
(4) 髄液への移行性	該当資料なし
(5) その他の組織への移行性	該当資料なし
5. 代謝	
(1) 代謝部位及び代謝経路	該当資料なし
(2) 代謝に関与する酵素(CYP450等)の分子種	該当資料なし
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	該当資料なし
(4) 代謝物の活性の有無及び比率	該当資料なし
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	該当資料なし
6. 排泄	
(1) 排泄部位及び経路	該当資料なし
(2) 排泄率	該当資料なし



## VII. 薬物動態に関する項目

---

(3) 排泄速度	該当資料なし
7. トランスポーターに関する情報	該当資料なし
8. 透析等による除去率	該当資料なし

## Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由	該当しない
2. 禁忌内容とその理由 (原則禁忌を含む)	<b>【禁忌(次の患者には投与しないこと)】</b> 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	該当しない
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	該当しない
5. 慎重投与内容とその理由	該当しない
6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	<b>重要な基本的注意</b> 本剤の使用により効果が認められない場合には、漫然と長期にわたり投与しないよう注意すること。
7. 相互作用	
(1) 併用禁忌とその理由	該当しない
(2) 併用注意とその理由	該当しない
8. 副作用	
(1) 副作用の概要	本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
(2) 重大な副作用と初期症状	該当しない

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

(3) その他の副作用	<p>副作用が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</p> <table border="1" data-bbox="496 322 1422 470"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 322 708 371">分類</th> <th data-bbox="708 322 1422 371">副作用 (頻度不明)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 371 708 470">眼</td> <td data-bbox="708 371 1422 470">眼瞼炎、眼痛、流涙、点状角膜炎、そう痒感、結膜充血、眼脂、刺激感、異物感、羞明</td> </tr> </tbody> </table>	分類	副作用 (頻度不明)	眼	眼瞼炎、眼痛、流涙、点状角膜炎、そう痒感、結膜充血、眼脂、刺激感、異物感、羞明
分類	副作用 (頻度不明)				
眼	眼瞼炎、眼痛、流涙、点状角膜炎、そう痒感、結膜充血、眼脂、刺激感、異物感、羞明				
(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧	該当資料なし				
(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度	該当資料なし				
(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法	<p>禁忌 (次の患者には投与しないこと) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p>				
9. 高齢者への投与	該当資料なし				
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	<p>(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。なお、妊娠前及び妊娠初期試験(ラット：経口)では受胎率の低下が、器官形成期試験(ウサギ：経口)では胎児致死作用が、いずれも高用量で認められている。]</p> <p>(2) 授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。[動物実験(ラット：経口)で乳汁中へ移行することが報告されている。]</p>				
11. 小児等への投与	<p>低出生体重児、新生児、乳児、幼児に対する安全性は確立していない(低出生体重児、新生児に対しては使用経験がない。乳児、幼児に対しては使用経験が少ない)。</p>				
12. 臨床検査結果に及ぼす影響	該当資料なし				
13. 過量投与	該当資料なし				

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

### 14. 適用上の注意

- (1) 投与経路：点眼用にのみ使用すること。
- (2) 投与時：
  - 1) 薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意するよう指導すること。
  - 2) 点眼したときに液が眼瞼皮膚等についた場合には、すぐにふき取るよう指導すること。
  - 3) 他の点眼剤と併用する場合には、少なくとも5分間以上の間隔をあけて点眼するよう指導すること。

### 15. その他の注意

該当しない

### 16. その他

特になし

## Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

---

### 1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験  
(「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照)

(2) 副次的薬理試験

該当資料なし

(3) 安全性薬理試験

該当資料なし

(4) その他の薬理試験

該当資料なし

### 2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(4) その他の特殊毒性

該当資料なし

## X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分	製 剤：エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%「杏林」 有効成分：エピナスチン塩酸塩	該当しない 劇薬
2. 有効期間又は使用期限	使用期限：3年（安定性試験結果に基づく <sup>1)</sup> ）	
3. 貯法・保存条件	気密容器、室温保存	
4. 薬剤取扱い上の注意点		
(1) 薬局での取り扱い上の留意点について	特になし	
(2) 薬剤交付時の取り扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）	VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目、14. 適用上の注意の項を参照 くすりのしおり：有り	
(3) 調剤時の留意点について	特になし	
5. 承認条件等	該当しない	
6. 包装	5mL×10本	
7. 容器の材質	本体：ポリプロピレン（PP） 中栓：ポリエチレン（PE） キャップ：ポリプロピレン（PP） シュリンクラベル：ポリエチレンテレフタレート（PET）	
8. 同一成分・同効薬	同一成分薬：アレジオン点眼液 0.05%、アレジオン LX 点眼液 0.1% 同 効 薬：アシタザノラスト水和物、アンレキサノクス、イブジラスト、オロパタジン塩酸塩、クロモグリク酸ナトリウム、ケトチフェンフマル酸塩、トラニラスト、ペミロラストカリウム、レボカバスチン塩酸塩	
9. 国際誕生年月日	1994年4月1日	

## X. 管理的事項に関する項目

10. 製造販売承認年月日及び承認番号	製造販売承認年月日：2021年2月15日 承認番号：30300AMX00142000						
11. 薬価基準収載年月日	2021年6月18日						
12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	該当しない						
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	該当しない						
14. 再審査期間	該当しない						
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。						
16. 各種コード	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 1211 794 1301">HOT(9桁)番号</th> <th data-bbox="794 1211 1109 1301">厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード</th> <th data-bbox="1109 1211 1423 1301">レセプト 電算コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 1301 794 1402">128609001</td> <td data-bbox="794 1301 1109 1402">1319762Q1060</td> <td data-bbox="1109 1301 1423 1402">622860901</td> </tr> </tbody> </table>	HOT(9桁)番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト 電算コード	128609001	1319762Q1060	622860901
HOT(9桁)番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト 電算コード					
128609001	1319762Q1060	622860901					
17. 保険給付上の注意	本剤は診療報酬上の後発医薬品である。						

## XI. 文献

### 1. 引用文献

- 1) キョーリンリメディオ株式会社社内資料：  
エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%「杏林」の安定性試験に関する資料
- 2) キョーリンリメディオ株式会社社内資料：  
エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%「杏林」の眼粘膜刺激性試験に関する資料
- 3) キョーリンリメディオ株式会社社内資料：  
エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%「杏林」の滴下数及び滴下質量に関する資料
- 4) 田中千賀子 他編：NEW 薬理学 改訂第7版，南江堂，160，2017

### 2. その他の参考文献

該当資料なし



## XII. 参考資料

---

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 1. 主な外国での発売状況   | 該当しない  |
| 2. 海外における臨床支援情報 | 該当資料なし |

### XIII. 備考

---

1. その他の関連資料

該当資料なし