

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2013に準拠して作成

慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トアラセット[®] 配合錠「杏林」

TOARASET[®] Combination Tablets “KYORIN”

（トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配合錠）

剤形	フィルムコーティング錠
製剤の規制区分	劇薬 処方箋医薬品 ^{注)} 注) 注意－医師等の処方箋により使用すること
規格・含量	1錠中、日局トラマドール塩酸塩 37.5mg 及び日局アセトアミノフェン 325mg を含有
一般名	和名：トラマドール塩酸塩 (JAN)/アセトアミノフェン (JAN) 洋名：Tramadol Hydrochloride (JAN)/Acetaminophen (JAN)
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2018年 8月15日 薬価基準収載年月日：2018年12月14日 発売年月日：2018年12月14日
開発・製造販売(輸入)・ 提携・販売会社名	製造販売元：キョーリンリメディオ株式会社 販売元：杏林製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	キョーリンリメディオ株式会社 学術部 TEL：0120-960189 FAX：0120-189099 受付時間：8時～22時（日、祝日、その他当社の休業日を除く） 医療関係者向けホームページ https://www.kyorin-rmd.co.jp/

本IFは2020年4月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ <https://www.pmda.go.jp/>にてご確認下さい。

I F 利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、I F と略す）の位置付け並びに I F 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において I F 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において新たな I F 記載要領 2008 が策定された。

I F 記載要領 2008 では、I F を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること（e-I F）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-I F が提供されることとなった。

最新版の e-I F は、(独) 医薬品医療機器総合機構のホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-I F を掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-I F の情報を検討する組織を設置して、個々の I F が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、I F 記載要領の一部改訂を行い I F 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

2. I F とは

I F は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は I F の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された I F は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

【I F の様式】

- ①規格は A 4 判、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ② I F 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「I F 利用の手引きの概要」の全文を記載するも

のとし、2頁にまとめる。

【I Fの作成】

- ① I Fは原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ② I Fに記載する項目及び配列は日病薬が策定したI F記載要領に準拠する。
- ③ 添付文書の内容を補完するとのI Fの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「I F記載要領 2013」と略す）により作成されたI Fは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

【I Fの発行】

- ① 「I F記載要領 2013」は、平成25年10月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ② 上記以外の医薬品については、「I F記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはI Fが改訂される。

3. I Fの利用にあたって

「I F記載要領 2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体のI Fについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、I Fの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やI F作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、I Fの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、I Fが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、I Fの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

I Fを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。I Fは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、I Fがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013年4月改訂)

目次



I. 概要に関する項目	1	VII. 薬物動態に関する項目	16
1. 開発の経緯	1	1. 血中濃度の推移・測定法	16
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	2. 薬物速度論的パラメータ	17
II. 名称に関する項目	2	3. 吸収	18
1. 販売名	2	4. 分布	18
2. 一般名	2	5. 代謝	18
3. 構造式又は示性式	2	6. 排泄	19
4. 分子式及び分子量	2	7. トランスポーターに関する情報	19
5. 化学名(命名法)	2	8. 透析等による除去率	19
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	3	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	20
7. CAS登録番号	3	1. 警告内容とその理由	20
III. 有効成分に関する項目	4	2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)	20
1. 物理化学的性質	4	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	20
2. 有効成分の各種条件下における安定性	4	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	21
3. 有効成分の確認試験法	4	5. 慎重投与内容とその理由	21
4. 有効成分の定量法	5	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	21
IV. 製剤に関する項目	6	7. 相互作用	23
1. 剤形	6	8. 副作用	25
2. 製剤の組成	6	9. 高齢者への投与	28
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	6	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	28
4. 製剤の各種条件下における安定性	7	11. 小児等への投与	28
5. 調製法及び溶解後の安定性	9	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	29
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	9	13. 過量投与	29
7. 溶出性	10	14. 適用上の注意	29
8. 生物学的試験法	12	15. その他の注意	29
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	12	16. その他	30
10. 製剤中の有効成分の定量法	12	IX. 非臨床試験に関する項目	31
11. 力価	12	1. 薬理試験	31
12. 混入する可能性のある夾雑物	12	2. 毒性試験	31
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	12	X. 管理的事項に関する項目	32
14. その他	12	1. 規制区分	32
V. 治療に関する項目	13	2. 有効期間又は使用期限	32
1. 効能又は効果	13	3. 貯法・保存条件	32
2. 用法及び用量	13	4. 薬剤取扱い上の注意点	32
3. 臨床成績	13	5. 承認条件等	33
VI. 薬効薬理に関する項目	15	6. 包装	33
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	15	7. 容器の材質	33
2. 薬理作用	15	8. 同一成分・同効薬	33
		9. 国際誕生年月日	34
		10. 製造販売承認年月日及び承認番号	34
		11. 薬価基準収載年月日	34

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	34
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	34
14. 再審査期間	34
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	34
16. 各種コード	34
17. 保険給付上の注意	34
XI. 文献	35
1. 引用文献	35
2. その他の参考文献	35
XII. 参考資料	36
1. 主な外国での発売状況	36
2. 海外における臨床支援情報	36
XIII. 備考	37
1. その他の関連資料	37

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯	本剤は、後発医薬品として薬生審査発 0311 第 3 号（平成 28 年 3 月 11 日）に基づき、規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を行い承認申請し、2018 年 8 月に承認を取得、2018 年 12 月に発売に至った。
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、痙攣、意識消失、依存性、中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症、間質性肺炎、間質性腎炎、急性腎障害、喘息発作の誘発、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、顆粒球減少症、呼吸抑制が報告されている。 （本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。）

II. 名称に関する項目

1. 販売名		
(1) 和名	トアラセット®配合錠「杏林」	
(2) 洋名	TOARASET® Combination Tablets “KYORIN”	
(3) 名称の由来	トアラセット：配合剤の統一ブランド名 (日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会の登録商標)	
2. 一般名		
(1) 和名（命名法）	トラマドール塩酸塩(JAN) アセトアミノフェン(JAN)	
(2) 洋名（命名法）	〔トラマドール塩酸塩〕 Tramadol Hydrochloride(JAN)、Tramadol(INN) 〔アセトアミノフェン〕 Acetaminophen(JAN)、Paracetamol(INN)	
(3) ステム	〔トラマドール塩酸塩〕 鎮静剤:-adol 〔アセトアミノフェン〕 不明	
3. 構造式又は示性式	〔トラマドール塩酸塩〕  及び鏡像異性体	〔アセトアミノフェン〕 
4. 分子式及び分子量	〔トラマドール塩酸塩〕 分子式：C ₁₆ H ₂₅ NO ₂ ·HCl 分子量：299.84	〔アセトアミノフェン〕 分子式：C ₈ H ₉ NO ₂ 分子量：151.16
5. 化学名（命名法）	〔トラマドール塩酸塩〕 (1 <i>RS</i> , 2 <i>RS</i>)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexanol monohydrochloride (IUPAC) 〔アセトアミノフェン〕 <i>N</i> -(4-Hydroxyphenyl)acetamide	

Ⅱ. 名称に関する項目

6. 慣用名、別名、略号、 記号番号	特になし
7. CAS 登録番号	〔トラマドール塩酸塩〕 36282-47-0 〔アセトアミノフェン〕 103-90-2

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質	
(1) 外観・性状	<p>〔トラマドール塩酸塩〕 白色の結晶性の粉末である。結晶多形が認められる。</p> <p>〔アセトアミノフェン〕 白色の結晶又は結晶性の粉末である。</p>
(2) 溶解性	<p>〔トラマドール塩酸塩〕 水に極めて溶けやすく、メタノール、エタノール(95)又は酢酸(100)に溶けやすい。</p> <p>〔アセトアミノフェン〕 メタノール又はエタノール(95)に溶けやすく、水にやや溶けにくく、ジエチルエーテルに極めて溶けにくい。 水酸化ナトリウム試液に溶ける。</p>
(3) 吸湿性	該当資料なし
(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点	<p>〔トラマドール塩酸塩〕 融点：180～184℃</p> <p>〔アセトアミノフェン〕 融点：169～172℃</p>
(5) 酸塩基解離定数	該当資料なし
(6) 分配係数	該当資料なし
(7) その他の主な示性値	<p>〔トラマドール塩酸塩〕 水溶液（1→20）は旋光性を示さない。</p> <p>〔アセトアミノフェン〕 該当資料なし</p>
2. 有効成分の各種条件下における安定性	該当資料なし
3. 有効成分の確認試験法	<p>〔トラマドール塩酸塩〕 日本薬局方「トラマドール塩酸塩」の確認試験による。</p> <p>(1) 紫外可視吸光度測定法 (2) 赤外吸収スペクトル測定法（塩化カリウム錠剤法） (3) 塩化物の定性反応(2)</p>

Ⅲ. 有効成分に関する項目

4. 有効成分の定量法

〔アセトアミノフェン〕

日本薬局方「アセトアミノフェン」の確認試験による。
赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）


〔トラマドール塩酸塩〕

日本薬局方「トラマドール塩酸塩」の定量法による。
電位差滴定法（0.1mol/L 過塩素酸で滴定）

〔アセトアミノフェン〕

日本薬局方「アセトアミノフェン」の定量法による。
紫外可視吸光度測定法

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形 (1) 剤形の区別、外観及び性状	剤形	フィルムコーティング錠
	色調	淡黄色
	外観	
	本体表示	トアラセット 杏林
	直径 (mm)	長径：15.6 短径：6.4
	厚さ (mm)	5.1
	重量 (mg)	441
	(2) 製剤の物性	該当資料なし
(3) 識別コード	なし	
(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等	該当資料なし	
2. 製剤の組成		
(1) 有効成分（活性成分）の含量	1 錠中、日局トラマドール塩酸塩 37.5mg 及び日局アセトアミノフェン 325mg 含有	
(2) 添加物	粉末セルロース、アルファー化デンプン、デンプングリコール酸ナトリウム、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール 400、黄色三二酸化鉄、ポリソルベート 80、カルナウバロウ	
(3) その他	特になし	
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	該当しない	

IV. 製剤に関する項目

4. 製剤の各種条件下における安定性^{1),2)}

【加速試験】¹⁾

< 保存条件 >

40±2℃、75±5%RH

< 試験検体 >

PTP 包装：PTP（ポリ塩化ビニルフィルム、アルミニウム箔）、紙箱

バラ包装：ポリエチレン容器、ポリプロピレン製の蓋、紙箱

< 試験項目及び規格 >

試験項目	規 格
性状	淡黄色のフィルムコーティング錠
確認試験 (HPLC)	試料溶液から得たトラマドールとアセトアミノフェンの保持時間と標準溶液のトラマドールとアセトアミノフェンの保持時間は一致し、それぞれのそのピークの紫外吸収スペクトル(波長：200～400nm)を比較するとき、両者のトラマドールのスペクトルは波長 272nm 付近に吸収の極大を、両者のアセトアミノフェンのスペクトルは波長 245nm 付近に吸収の極大を認める。
純度試験 1 (HPLC)	[トラマドール塩酸塩]
	① トラマドール由来の個々の類縁物質：0.1%以下 トラマドール由来の類縁物質の総量：0.6%以下
	② RRT 約 0.61 の類縁物質：0.1%以下
純度試験 2 (HPLC)	[アセトアミノフェン] RRT 約 0.5 の類縁物質：0.01%以下 RRT 約 4.9 の類縁物質：0.1%以下 上記以外の個々の類縁物質：0.1%以下 類縁物質の総量：0.5%以下
製剤均一性	含量均一性試験を行うとき、適合する。 [トラマドール塩酸塩] 判定値：15.0%以下 [アセトアミノフェン] 判定値：15.0%以下
溶出性	[トラマドール塩酸塩] 水/900mL/パドル法/毎分 50 回転/15 分間/80%以上 [アセトアミノフェン] 水/900mL/パドル法/毎分 50 回転/15 分間/85%以上
定量法	[トラマドール塩酸塩] 含量：95.0～105.0% [アセトアミノフェン] 含量：95.0～105.0%

RRT：相対保持時間

IV. 製剤に関する項目

< 試験結果 >

PTP 包装品

試験項目		開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状		適	適	適	適
確認試験		適	適	適	適
純度試験 1	①	適	適	適	適
	②	適	適	適	適
純度試験 2		適	適	適	適
製剤 均一性	(1)	適			適
	(2)	適			適
溶出性	(1)	適	適	適	適
	(2)	適	適	適	適
定量(含量)※	(1)	98.89%	101.32%	100.70%	100.42%
定量(含量)※	(2)	99.97%	100.71%	101.72%	101.02%

(1)トラマドール塩酸塩 (2)アセトアミノフェン

※1ロット n=3 の 3 ロットの平均値

バラ包装品

試験項目		開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状		適	適	適	適
確認試験		適	適	適	適
純度試験 1	①	適	適	適	適
	②	適	適	適	適
純度試験 2		適	適	適	適
製剤 均一性	(1)	適			適
	(2)	適			適
溶出性	(1)	適	適	適	適
	(2)	適	適	適	適
定量(含量)※	(1)	97.52%	101.17%	101.57%	100.36%
定量(含量)※	(2)	100.61%	100.72%	101.15%	99.97%

(1)トラマドール塩酸塩 (2)アセトアミノフェン

※1ロット n=3 の 3 ロットの平均値

IV. 製剤に関する項目

【無包装状態での安定性】²⁾

保存条件	結 果				
	性状	純度試験	溶出性	含量	硬度
温度 40℃、3 ヶ月、褐色 ガラス瓶(密栓)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
湿度 75%RH、25℃、3 ヶ 月、褐色ガラス瓶 (開放)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
光 曝光量 120 万 lx・ hr、成り行き温度・ 湿度、シャーレ(パ ラフィルムでシー ル)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

〔規格〕性状、純度試験、溶出性、含量の規格は加速試験の<試験項目及び規格>参照、
硬度：参考値

<参考>評価基準

分類	性状	溶出性 純度試験	定量法(含量)	硬度
変化なし	外観の変化を、ほと んど認めない場合	規格内 の場合	含量低下が 3%未満の場合	硬度変化が 30%未満の場合
変化あり (規格内)	わずかな色調変化 (退色等)等を認め るが、規格を満たし ている場合	/	含量低下が3% 以上で、規格値 内の場合	硬度変化が 30%以上で、 硬度が2.0kgf 以上の場合
変化あり (規格外)	形状変化や著しい色 調変化等を認め、規 格を逸脱している場 合		規格外 の場合	規格外 の場合

本試験は、「(社)日本病院薬剤師会：錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)、平成11年8月20日」を参考に評価しました。本資料は本剤の安定性に関する資料であり、無包装で保存した本剤を使用した場合の有効性・安全性についての評価は実施しておりません。

5. 調製法及び溶解後の
安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化
(物理化学的变化)

該当しない

IV. 製剤に関する項目

7. 溶出性³⁾

【溶出挙動における類似性】

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 24 年 2 月 29 日付 薬食審査発 0229 第 10 号）に従い、標準製剤との溶出挙動の比較を行った。

<試験方法>

試験法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法（パドル法）

試験液：以下の試験液 900mL

試験液の温度：37±0.5℃

試験液		回転数
pH1.2	溶出試験第 1 液	50 回転/分
pH5.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50 回転/分
pH6.8	溶出試験第 2 液	50 回転/分
水	水	50 回転/分

〔トラマドール塩酸塩〕

<判定基準>

○標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合

試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

(pH5.0/50rpm、pH6.8/50rpm、水/50rpm)

○標準製剤が 15～30 分に平均 85%以上溶出する場合：

標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近となる適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあるか、又は f2 関数の値が 42 以上である。


(pH1.2/50rpm)

<結 果>

溶出条件	判定 時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)			判定
		トアラセット 配合錠「杏林」	標準製剤 (配合錠)	差	
pH1.2/50rpm	10	63.3	51.2	12.1	適合
	15	92.7	83.6	9.1	
pH5.0/50rpm	15	99.1	90.6	—	適合
pH6.8/50rpm	15	100.5	93.1	—	適合
水/50rpm	15	95.0	93.8	—	適合

IV. 製剤に関する項目

2製剤の平均溶出率を比較した図（判定点及び範囲）



〔アセトアミノフェン〕

<判定基準>

標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合：


試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 \pm 15%の範囲にある。

<結 果>

溶出条件	判定 時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)			判定
		トアラセット 配合錠「杏林」	標準製剤 (配合錠)	差	
pH1.2/50rpm	15	94.1	89.0	—	適合
pH5.0/50rpm	15	98.9	92.8	—	適合
pH6.8/50rpm	15	99.7	94.1	—	適合
水/50rpm	15	99.6	97.0	—	適合

IV. 製剤に関する項目

2製剤の平均溶出率を比較した図（判定点及び範囲）



トラマドール塩酸塩及びアセトアミノフェンのいずれにおいても、すべての溶出試験条件において同等性試験ガイドラインの判定基準に適合しており、両製剤の溶出挙動は類似していると判断した。

8. 生物学的試験法

該当しない

9. 製剤中の有効成分の確認試験法

液体クロマトグラフィー
紫外可視吸光度測定法

10. 製剤中の有効成分の定量法

液体クロマトグラフィー

11. カ価

該当しない

12. 混入する可能性のある夾雑物

o-デスマチルトラマドール、p-アミノフェノール、ジアセチル-4-アミノフェノール

13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報

特になし

14. その他

特になし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛
 非がん性慢性疼痛
 抜歯後の疼痛

<効能・効果に関連する使用上の注意>

慢性疼痛患者においては、その原因となる器質的病変、心理的・社会的要因、依存リスクを含めた包括的な診断を行い、本剤の投与の適否を慎重に判断すること。

2. 用法及び用量

非がん性慢性疼痛：

通常、成人には、1回1錠、1日4回経口投与する。投与間隔は4時間以上空けること。

なお、症状に応じて適宜増減するが、1回2錠、1日8錠を超えて投与しないこと。また、空腹時の投与は避けることが望ましい。

抜歯後の疼痛：

通常、成人には、1回2錠を経口投与する。

なお、追加投与する場合には、投与間隔を4時間以上空け、1回2錠、1日8錠を超えて投与しないこと。また、空腹時の投与は避けることが望ましい。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

1. 投与の継続

慢性疼痛患者において、本剤投与開始後4週間を経過してもなお期待する効果が得られない場合は、他の適切な治療への変更を検討すること。また、定期的に症状及び効果を確認し、投与の継続の必要性について検討すること。

2. 投与の中止

慢性疼痛患者において、本剤の投与を必要としなくなった場合は、退薬症候の発現を防ぐために徐々に減量すること。

3. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

(2) 臨床効果

該当資料なし

(3) 臨床薬理試験

該当資料なし

(4) 探索的試験

該当資料なし

V. 治療に関する項目

(5) 検証的試験	
1) 無作為化並行用量 反応試験	該当資料なし
2) 比較試験	該当資料なし
3) 安全性試験	該当資料なし
4) 患者・病態別試験	該当資料なし
(6) 治療的使用	
1) 使用成績調査・特定 使用成績調査（特別 調査）・製造販売後 臨床試験（市販後臨 床試験）	該当資料なし
2) 承認条件として実 施予定の内容又は 実施した試験の概 要	該当しない

VI. 薬効薬理に関する項目

<p>1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群</p>	<p>[トラマドール塩酸塩] モルヒネ硫酸塩水和物、オキシコドン塩酸塩水和物、コデインリン酸塩水和物</p> <p>[アセトアミノフェン] アントラニル酸系：メフェナム酸、フルフェナム酸アルミニウム サリチル酸系：アスピリン、サリチルアミド、エテンザミド ピラゾロン系：スルピリン水和物 プロピオン酸系：イブプロフェン、ロキソプロフェンナトリウム水和物 塩基性消炎剤系：チアラミド塩酸塩</p>
<p>2. 薬理作用 (1) 作用部位・作用機序</p>	<p>[トラマドール塩酸塩]⁴⁾ 麻薬拮抗性、μ受容体の部分作動薬。各種癌や術後の鎮痛に用いる。依存性や精神作用が弱い。マウス及びラット(in vivo)における圧刺激法、熱板刺激法による鎮痛効果はモルヒネの1/5~1/7、ペチジンの約1/2、アミノピリンより数倍高く、ジヒドロコデインと同程度である。酢酸writting法ではペチジン群に位置する。 作用持続時間はペチジンよりはるかに長く、モルヒネとほぼ同等である(マウス・ラット in vivo)。</p> <p>[アセトアミノフェン]⁵⁾ シクロオキシゲナーゼ阻害作用は殆どなく、視床下部の体温調節中枢に作用して皮膚血管を拡張させて体温を下げる。鎮痛作用は視床と大脳皮質の痛覚閾値をたかめることによると推定される。</p>
<p>(2) 薬効を裏付ける試験成績</p>	<p>該当資料なし</p>
<p>(3) 作用発現時間・持続時間</p>	<p>該当資料なし</p>

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間

VII. 薬物動態に関する項目、1. 血中濃度の推移・測定法(3)臨床試験で確認された血中濃度の項を参照

(3) 臨床試験で確認された血中濃度^{6),7)}

【生物学的同等性試験】


トアラセット配合錠「杏林」は、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（平成24年2月29日付 薬食審査発0229第10号）」に従い、健康成人男子を対象に生物学的同等性試験を実施した。

トアラセット配合錠「杏林」と標準製剤をクロスオーバー法によりそれぞれ1錠（トラマドール塩酸塩37.5mg及びアセトアミノフェン325mg）健康成人男子（n=23）に絶食単回経口投与してトラマドール及びアセトアミノフェンの血漿中濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った。その結果、いずれも $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

【トラマドール塩酸塩】

	評価パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0→24} (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
トアラセット 配合錠「杏林」	918.7 ±317.7	112.1 ±29.7	1.72 ±0.82	5.7 ±1.1
標準製剤 (配合錠)	934.9 ±309.4	114.7 ±26.0	1.79 ±0.89	5.9 ±1.4

(Mean ± S. D., n=23)




VII. 薬物動態に関する項目

【アセトアミノフェン】

	評価パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0→12} (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
トアラセット 配合錠「杏林」	14972 ±2893	4552 ±1512	1.11 ±0.79	2.9 ±0.3
標準製剤 (配合錠)	14814 ±2752	4360 ±1431	1.18 ±0.72	2.8 ±0.4

(Mean ± S. D., n=23)



血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4) 中毒域

該当資料なし

(5) 食事・併用薬の影響

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、7. 相互作用の項を参照

(6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

(3) バイオアベイラビリティ	該当資料なし
(4) 消失速度定数	該当資料なし
(5) クリアランス	該当資料なし
(6) 分布容積	該当資料なし
(7) 血漿蛋白結合率	該当資料なし
3. 吸収	該当資料なし
4. 分布	
(1) 血液－脳関門通過性	該当資料なし
(2) 血液－胎盤関門通過性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(1), (2), (3)の項を参照
(3) 乳汁への移行性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(4)の項を参照
(4) 髄液への移行性	該当資料なし
(5) その他の組織への移行性	該当資料なし
5. 代謝	
(1) 代謝部位及び代謝経路	<p>〔トラマドール塩酸塩〕</p> <p>主な代謝経路は、<i>o</i>-及び <i>N</i>-脱メチル化（第一相反応）並びにそれらの代謝物のグルクロン酸又は硫酸抱合（第二相反応）であり、<i>o</i>-脱メチル化反応には CYP2D6 が、<i>N</i>-脱メチル化には CYP3A4 が主に関与する。⁴⁾</p> <p>〔アセトアミノフェン〕</p> <p>通常は、肝・腎の P450 によりごく少量が <i>N</i>-水酸化体を経て <i>N</i>-acetyl-<i>p</i>-benzoquinoneimine を生成し、グルタチオン抱合により消失するが、過量投与時にはこれが蓄積し、肝障害の原因となると考えられている。⁵⁾</p>

VII. 薬物動態に関する項目

(2) 代謝に関与する酵素 (CYP450 等) の分子種	<p>[トラマドール塩酸塩] 主に薬物代謝酵素 (CYP2D6 及び CYP3A4) によって代謝される。</p> <p>[アセトアミノフェン] 該当資料なし</p>
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	該当資料なし
(4) 代謝物の活性の有無及び比率	該当資料なし
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	該当資料なし
6. 排泄	
(1) 排泄部位及び経路	該当資料なし
(2) 排泄率	該当資料なし
(3) 排泄速度	該当資料なし
7. トランスポーターに関する情報	該当資料なし
8. 透析等による除去率	<p>[トラマドール塩酸塩] 透析によりほとんど除去されない</p> <p>[アセトアミノフェン] 該当資料なし</p>

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

【警告】

1. 本剤により重篤な肝障害が発現するおそれがあることに注意し、アセトアミノフェンの1日総量が1500mg（本剤4錠）を超過高用量で長期投与する場合には、定期的に肝機能等を確認するなど、慎重に投与すること（「重要な基本的注意」の項参照）。
2. 本剤とトラマドール又はアセトアミノフェンを含む他の薬剤（一般用医薬品を含む）との併用により、過量投与に至るおそれがあることから、これらの薬剤との併用を避けること（「過量投与」の項参照）。

2. 禁忌内容とその理由 （原則禁忌を含む）

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1. 12歳未満の小児〔「小児等への投与」の項参照〕
2. アルコール、睡眠剤、鎮痛剤、オピオイド鎮痛剤又は向精神薬による急性中毒患者〔中枢神経抑制及び呼吸抑制を悪化させるおそれがある。〕
3. モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤（セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩、サフィナミドメシル酸塩）を投与中の患者、又は投与中止後14日以内の患者（「相互作用」の項参照）
4. ナルメフェン塩酸塩を投与中の患者又は投与中止後1週間以内の患者（「相互作用」の項参照）
5. 治療により十分な管理がされていないてんかん患者〔症状が悪化するおそれがある。〕
6. 消化性潰瘍のある患者〔症状が悪化するおそれがある。〕
7. 重篤な血液の異常のある患者〔重篤な転帰をとるおそれがある。〕
8. 重篤な肝障害のある患者〔重篤な転帰をとるおそれがある（「過量投与」の項参照）。〕
9. 重篤な腎障害のある患者〔重篤な転帰をとるおそれがある。〕
10. 重篤な心機能不全のある患者〔循環系のバランスが損なわれ、心不全が増悪するおそれがある。〕
11. アスピリン喘息（非ステロイド製剤による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある患者〔アスピリン喘息の発症にプロスタグランジン合成阻害作用が関与していると考えられる。〕
12. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

V. 治療に関する項目、1. 効能又は効果＜効能・効果に関連する使用上の注意＞の項を参照

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

<p>4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由</p>	<p>V. 治療に関する項目、2. 用法及び用量＜用法・用量に関連する使用上の注意＞の項を参照</p>
<p>5. 慎重投与内容とその理由</p>	<p>慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）</p> <p>(1) オピオイド鎮痛剤を投与中の患者〔痙攣閾値の低下や呼吸抑制の増強を来すおそれがある（「相互作用」の項参照）。〕</p> <p>(2) てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者、あるいは痙攣発作の危険因子（頭部外傷、代謝異常、アルコール又は薬物の離脱症状、中枢性感染症等）を有する患者〔痙攣発作を誘発することがあるので、本剤投与中は観察を十分に行うこと。〕</p> <p>(3) 呼吸抑制状態にある患者〔呼吸抑制を増強するおそれがある。〕</p> <p>(4) 脳に器質的障害のある患者〔呼吸抑制や頭蓋内圧の上昇を来すおそれがある。〕</p> <p>(5) 薬物の乱用又は薬物依存傾向のある患者〔依存性を生じやすい。〕</p> <p>(6) オピオイド鎮痛剤に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>(7) ショック状態にある患者〔循環不全や呼吸抑制を増強するおそれがある。〕</p> <p>(8) 肝障害又は腎障害、あるいはそれらの既往歴のある患者〔肝機能又は腎機能が悪化するおそれがある。また、高い血中濃度が持続し、作用及び副作用が増強するおそれがある（「過量投与」の項参照）。〕</p> <p>(9) 消化性潰瘍の既往歴のある患者〔消化性潰瘍の再発を促進するおそれがある。〕</p> <p>(10) 血液の異常又はその既往歴のある患者〔血液障害を起こすおそれがある。〕</p> <p>(11) 出血傾向のある患者〔血小板機能異常が起こることがある。〕</p> <p>(12) 心機能異常のある患者〔症状が悪化するおそれがある。〕</p> <p>(13) 気管支喘息のある患者〔症状が悪化するおそれがある。〕</p> <p>(14) アルコール多量常飲者〔肝障害があらわれやすくなる（「相互作用」の項参照）。〕</p> <p>(15) 絶食・低栄養状態・摂食障害等によるグルタチオン欠乏、脱水症状のある患者〔肝障害があらわれやすくなる。〕</p> <p>(16) 高齢者〔「高齢者への投与」の項参照〕</p>
<p>6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法</p>	<p>重要な基本的注意</p> <p>(1) 本剤は、1錠中にトラマドール塩酸塩(37.5mg)及びアセトアミノフェン(325mg)を含む配合剤であり、トラマドールとアセトアミノフェン双</p>

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

方の副作用が発現するおそれがあるため、適切に本剤の使用を検討すること。

- (2) 連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、慎重に投与すること（「**重大な副作用**」の項参照）。
- (3) 悪心、嘔吐、便秘等の症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、悪心・嘔吐に対する対策として制吐剤の併用を、便秘に対する対策として緩下剤の併用を考慮するなど、適切な処置を行うこと。
- (4) 眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
- (5) 感染症を不顕性化するおそれがあるため、観察を十分に行うこと。
- (6) 重篤な肝障害が発現するおそれがあるため注意すること。アセトアミノフェンの1日総量が1500mg（本剤4錠）を越す高用量で長期投与する場合には定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。高用量でなくとも長期投与する場合にあっては定期的に肝機能検査を行うことが望ましい。また、高用量で投与する場合などは特に患者の状態を十分に観察するとともに、異常が認められた場合には、減量、休薬等の適切な措置を講じること。
- (7) 鎮痛剤による治療は原因療法ではなく、対症療法であることに留意すること。
- (8) 重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるため、18歳未満の肥満、閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与しないこと。

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

7. 相互作用

トラマドールは、主に薬物代謝酵素（CYP2D6 及び CYP3A4）によって代謝される。

(1) 併用禁忌とその理由

【併用禁忌】（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MAO 阻害剤 セレギリン塩酸塩 （エフピー） ラサギリンメシル酸塩 （アジレクト） サフィナミドメシル酸塩 （エクフィナ）	外国において、セロトニン症候群（錯乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射異常亢進、ミオクローヌス、下痢等）を含む中枢神経系（攻撃的行動、固縮、痙攣、昏睡、頭痛）、呼吸器系（呼吸抑制）及び心血管系（低血圧、高血圧）の重篤な副作用が報告されている。MAO 阻害剤を投与中の患者又は投与中止後 1 4 日以内の患者には投与しないこと。また、本剤投与中止後に MAO 阻害剤の投与を開始する場合には、2～3 日間の間隔を空けることが望ましい。	相加的に作用が増強され、また、中枢神経のセロトニンが蓄積すると考えられる。
ナルメフェン塩酸塩 セリンクロ	離脱症状を起こすおそれがある。また、鎮痛作用が减弱するおそれがある。ナルメフェン塩酸塩を投与中の患者又は投与中止後 1 週間以内の患者には投与しないこと。	μ オピオイド受容体への競合的阻害による。

(2) 併用注意とその理由

【併用注意】（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
オピオイド鎮痛剤 中枢神経抑制剤 フェノチアジン系薬	痙攣閾値の低下や呼吸抑制の増強を来すおそれがある。	中枢神経抑制作用が相加的に増強されると考えられる。

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

<p>剤 催眠鎮静剤等</p>		
<p>三環系抗うつ剤 セロトニン作用薬 選択的セロトニン再 取り込み阻害剤 (SSRI)等</p>	<p>セロトニン症候群（錯乱、 激越、発熱、発汗、運動失 調、反射異常亢進、ミオク ローヌス、下痢等）があら われるおそれがある。ま た、痙攣発作の危険性を増 大させるおそれがある。</p>	<p>相加的に作用が増強さ れ、また、中枢神経の セロトニンが蓄積する と考えられる。</p>
<p>リネゾリド</p>		<p>リネゾリドの非選択 的、可逆的 MAO 阻害作 用により、相加的に作 用が増強され、また、 中枢神経のセロトニン が蓄積すると考えられ る。</p>
<p>カルバマゼピン フェノバルビタール フェニトイン プリミドン リファンピシン イソニアジド</p>	<p>トラマドールの血中濃度 が低下し作用が減弱する 可能性がある。 また、これらの薬剤の長期 連用者では肝代謝酵素が 誘導され、アセトアミノフ エン代謝物による肝障害 を生じやすくなるとの報 告がある。</p>	<p>これらの薬剤の肝代謝 酵素誘導作用により、 トラマドールの代謝が 促進される。また、ア セトアミノフェンから 肝毒性を持つ <i>N</i>-アセ チル-<i>p</i>-ベンゾキノ ンイミンへの代謝が促進 される。</p>
<p>アルコール（飲酒）</p>	<p>呼吸抑制が生じるおそれ がある。 また、アルコール多量常飲 者がアセトアミノフェン を服用したところ肝不全 を起こしたとの報告があ る。</p>	<p>相加的に作用が増強さ れると考えられる。 アルコール常飲による CYP2E1 の誘導により、 アセトアミノフェンか ら肝毒性を持つ <i>N</i>-ア セチル-<i>p</i>-ベンゾキノ ンイミンへの代謝が促 進される。</p>
<p>キニジン</p>	<p>相互に作用が増強するお それがある。</p>	<p>機序不明</p>
<p>クマリン系抗凝血剤 ワルファリン</p>	<p>出血を伴うプロトロンビ ン時間の延長等のクマリ ン系抗凝血剤の作用を増</p>	

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

	強することがある。	
ジゴキシン	ジゴキシン中毒が発現したとの報告がある。	
オンダンセトロン塩酸塩水和物	本剤の鎮痛作用を減弱させるおそれがある。	本剤の中枢におけるセロトニン作用が抑制されると考えられる。
ブプレノルフィン ペンタゾシン等	本剤の鎮痛作用を減弱させるおそれがある。また、退薬症候を起こすおそれがある。	本剤が作用する μ -オピオイド受容体の部分アゴニストであるため。
エチニルエストラジオール含有製剤	アセトアミノフェンの血中濃度が低下するおそれがある。	エチニルエストラジオールは肝におけるアセトアミノフェンのグルクロン酸抱合を促進すると考えられる。
	エチニルエストラジオールの血中濃度が上昇するおそれがある。	アセトアミノフェンはエチニルエストラジオールの硫酸抱合を阻害すると考えられる。

8. 副作用

(1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(2) 重大な副作用と初期症状

重大な副作用（頻度不明）

- 1) **ショック、アナフィラキシー**：ショック、アナフィラキシー（呼吸困難、喘鳴、血管浮腫、蕁麻疹等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) **痙攣**：痙攣があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3) **意識消失**：意識消失があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 4) **依存性**：長期使用時に、耐性、精神的依存及び身体的依存が生じることがあるため、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。本剤の中止又は減量時において、激越、不安、神経過

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

敏、不眠症、運動過多、振戦、胃腸症状、パニック発作、幻覚、錯感覚、耳鳴等の退薬症候が生じることがあるので、適切な処置を行うこと。また、薬物乱用又は薬物依存傾向のある患者では、厳重な医師の管理下に、短期間に限って投与すること。

- 5) **中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症：**中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、急性汎発性発疹性膿疱症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 6) **間質性肺炎：**間質性肺炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等が認められた場合には、速やかに胸部 X 線、胸部 CT、血清マーカー等の検査を実施すること。異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 7) **間質性腎炎、急性腎障害：**間質性腎炎、急性腎障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 8) **喘息発作の誘発：**喘息発作を誘発することがある。
- 9) **劇症肝炎、肝機能障害、黄疸：**劇症肝炎、AST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GTP の上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 10) **顆粒球減少症：**顆粒球減少症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 11) **呼吸抑制：**呼吸抑制があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと（「過量投与」の項参照）。

(3) その他の副作用

その他の副作用

分類	副作用（頻度不明）
感染症および寄生虫症	腎盂腎炎
血液およびリンパ系障害	貧血
代謝および栄養障害	食欲不振、高脂血症、低血糖症

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

精神障害	不眠症、不安、幻覚、錯乱 ^{注1)} 、多幸症 ^{注1)} 、神経過敏 ^{注1)} 、健忘 ^{注1)} 、離人症 ^{注1)} 、うつ病 ^{注1)} 、薬物乱用 ^{注1)} 、インポテンズ ^{注1)} 、悪夢 ^{注1)} 、異常思考 ^{注1)} 、せん妄 ^{注1)}
神経系障害	傾眠、浮動性めまい、頭痛、味覚異常、筋緊張亢進、感覚鈍麻、錯感覚、注意力障害、振戦、筋不随意運動、第4脳神経麻痺、片頭痛、運動失調 ^{注1)} 、昏迷 ^{注1)} 、会話障害 ^{注1)} 、運動障害 ^{注1)}
眼障害	視覚異常、縮瞳 ^{注1)} 、散瞳 ^{注1)}
耳および迷路障害	耳不快感、耳鳴、回転性めまい
心臓障害	動悸、不整脈 ^{注1)} 、頻脈 ^{注1)}
血管障害	高血圧、ほてり、低血圧 ^{注1)} 、起立性低血圧 ^{注1)}
呼吸器、胸郭および縦隔障害	呼吸困難、嘔声
胃腸障害	悪心、嘔吐、便秘、胃不快感、腹痛、下痢、口内炎、口内乾燥、消化不良、胃炎、逆流性食道炎、口唇炎、胃腸障害、腹部膨満、胃潰瘍、鼓腸、メレナ、上部消化管出血、嚥下障害 ^{注1)} 、舌浮腫 ^{注1)}
肝胆道系障害	肝機能検査異常
皮膚および皮下組織障害	そう痒症、発疹、多汗症、冷汗
腎および尿路障害	排尿困難、アルブミン尿、尿閉、乏尿 ^{注1)}
全身障害および投与局所様態	異常感、口渇、倦怠感、発熱、浮腫、胸部不快感、無力症、悪寒、疲労 ^{注1)} 、胸痛 ^{注1)} 、失神 ^{注1)} 、離脱症候群 ^{注1)}
臨床検査	体重減少、血中CPK増加、血中尿素増加、血中トリグリセリド増加、血中ビリルビン増加、尿中血陽性、尿中ブドウ糖陽性、好酸球数増加、白血球数増加、ヘモグロビン減少、尿中蛋白陽性、血中クレアチニン増加、血中ブドウ糖増加、血小板数増加、血中クレアチニン減少、血中尿酸増加、好中球百分率増加
傷害、中毒および処置合併症	転倒・転落

注1) 外国で報告されており、国内でも発生が予測される副作用

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧	該当資料なし
(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度	該当資料なし
(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法	<p>(1) 禁忌（次の患者には投与しないこと） 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>(2) 重大な副作用（頻度不明） ショック、アナフィラキシー：ショック、アナフィラキシー（呼吸困難、喘鳴、血管浮腫、蕁麻疹等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>
9. 高齢者への投与	<p>一般的に高齢者では生理機能が低下していることが多く、代謝・排泄が遅延し副作用があらわれやすいので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。</p>
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	<p>(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。トラマドールは胎盤関門を通過し、新生児に痙攣発作、身体的依存及び退薬症候、並びに胎児死亡及び死産が報告されている。また、動物実験で、トラマドールは器官形成、骨化及び出生児の生存に影響を及ぼすことが報告されている。]</p> <p>(2) 妊娠後期の婦人へのアセトアミノフェンの投与により胎児に動脈管収縮を起こすことがある。</p> <p>(3) アセトアミノフェンは妊娠後期のラットで胎児に軽度の動脈管収縮を起こすことが報告されている。</p> <p>(4) 授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には、授乳を中止すること。[トラマドールは、乳汁中へ移行することが報告されている。]</p>
11. 小児等への投与	<p>12歳未満の小児には投与しないこと。[海外において、12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高いとの報告がある。]</p>

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

12. 臨床検査結果に及ぼす影響	1 2 歳以上の小児における安全性は確立していない。
13. 過量投与	該当資料なし
13. 過量投与	<p>徴候、症状：</p> <p>トラマドールの過量投与による重篤な症状は、呼吸抑制、嗜眠、昏睡、痙攣発作、心停止である。</p> <p>アセトアミノフェンの大量投与により、肝毒性のおそれがある。また、アセトアミノフェンの過量投与時に肝臓・腎臓・心筋の壊死が起こったとの報告がある。過量投与による主な症状は、胃腸過敏症、食欲不振、悪心、嘔吐、倦怠感、蒼白、発汗等である。</p> <p>処置：</p> <p>緊急処置として、気道を確保し、症状に応じた呼吸管理と循環の管理を行うこと。必要に応じて活性炭の投与等適切な処置を行う。</p> <p>トラマドールの過量投与による呼吸抑制等の症状が疑われる場合には、ナロキソンが有効な場合があるが、痙攣発作を誘発するおそれがある。また、トラマドールは透析によりほとんど除去されない。</p> <p>アセトアミノフェンの過量投与による症状が疑われる場合には、アセチルシステインの投与を考慮すること。</p>
14. 適用上の注意	<p>薬剤交付時</p> <p>(1) PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。[PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管するよう指導すること。</p>
15. その他の注意	<p>(1) アセトアミノフェンの類似化合物（フェナセチン）の長期投与により、血色素異常を起こすことがある。</p> <p>(2) 腎盂及び膀胱腫瘍の患者を調査したところ、類似化合物（フェナセチン）製剤を長期・大量に使用（例：総服用量 1.5～27kg、服用期間 4～30 年）していた人が多いとの報告がある。また、類似化合物（フェナセチン）の長期・大量投与した動物実験で、腫瘍発生が認められたとの報告がある。</p> <p>(3) 非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期投与されている女性において、一時</p>

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

16. その他	<p>的な不妊が認められたとの報告がある。</p> <p>(4) 遺伝的に CYP2D6 の活性が過剰であることが判明している患者 (Ultra-rapid Metabolizer) では、トラマドールの活性代謝物の血中濃度が上昇し、呼吸抑制等の副作用が発現しやすくなるおそれがある。</p>
	特になし

Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験	
(1) 薬効薬理試験（「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照）	
(2) 副次的薬理試験	該当資料なし
(3) 安全性薬理試験	該当資料なし
(4) その他の薬理試験	該当資料なし
2. 毒性試験	
(1) 単回投与毒性試験	該当資料なし
(2) 反復投与毒性試験	該当資料なし
(3) 生殖発生毒性試験	該当資料なし
(4) その他の特殊毒性	該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製剤	トアラセット配合錠「杏林」	劇薬、処方箋医薬品 ^{注)}
有効成分	トラマドール塩酸塩	劇薬
	アセトアミノフェン	劇薬、処方箋医薬品 ^{注)}

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

2. 有効期間又は使用期限

使用期限：3年（安定性試験結果に基づく¹⁾）

3. 貯法・保存条件

気密容器、室温保存

4. 薬剤取扱い上の注意点

(1) 薬局での取り扱い上の留意点について

特になし

(2) 薬剤交付時の取り扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、14. 適用上の注意の項を参照
くすりのしおり：有り

患者用指導箋：

[慢性疼痛]

慢性疼痛の治療で
トアラセット配合錠「杏林」を服用される患者さまへ

トアラセット配合錠「杏林」は、慢性疼痛のお薬です。

 このお薬には、鎮痛作用のあるトラマドール、アセトアミノフェンが配合されています。トラマドールまたはアセトアミノフェンを含む他のお薬（市販のかぜ薬、解熱鎮痛薬などにも含まれていることがあります。）と一緒に服用しないでください。他のかぜ薬や解熱鎮痛薬を使用している場合は医師・薬剤師にお伝えください。

服用にあたってのご注意

- このお薬は、1回1錠、1日4回が基本ですが、医師の指示通りに服用してください。
- 症状に応じて適宜増減されることもありますが、1回2錠、1日8錠を超えて服用してはいけません。
服用間隔：4時間以上空けてください。
※重篤な肝障害がおこることがあるので、1日4錠を超える高用量で長期間服用する場合には、定期的に肝機能検査が行われます。
- 誤って多く服用した場合には、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
..... 飲み忘れた場合の対応
- 飲み忘れに気づいた場合は、できるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れ分は服用せず、1回とばして次回から服用するようにしてください。
絶対に2回分をまとめて一度に服用しないでください。
- 医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。
- 飲酒は避けてください。飲酒により薬の作用や副作用が強まる場合があります。

トアラセット配合錠「杏林」
を服用される患者さまへ

保管について

- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避けて保管してください。
- 他人には絶対に渡さないでください。
- 余ったお薬は廃棄してください。

副作用について

吐き気・嘔吐 飲み始めのころにあらわれることがあります。3～7日程度で症状がやわらぎ、制吐剤の投与が必要でなくなることが多いです。なかなか症状が治まらない場合は、医師にご相談ください。

眠気 飲み始めのころにあらわれることがあります。3～5日程度で症状が無くなることも多いですが、眠気がとれない場合は医師にご相談ください。服用中は自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。

便秘 便秘が認められる場合は、医師にご相談ください。便秘の対策として、下剤と一緒に服用していただくことがあります。

お薬についてわからないこと、服用中に気になることがあれば、医師または薬剤師にご相談ください。

キョーリンフジメディオ株式会社

X. 管理的事項に関する項目

[抜歯後疼痛]

抜歯後疼痛の治療に トアラセット配合錠「杏林」を服用される患者さまへ

トアラセット配合錠「杏林」は、抜歯後の疼痛治療のお薬です。



このお薬には、鎮痛作用のあるトラマドール、アセトアミノフェンが配合されています。他のトラマドールまたはアセトアミノフェンを含むお薬（他のかぜ薬、解熱鎮痛薬などにも含まれていることがあります。）と一緒に服用しないでください。他のかぜ薬や解熱鎮痛薬を使用している場合は医師・薬剤師にお伝えください。

服用にあたってのご注意

- 抜歯後疼痛の治療には、1回2錠が基本ですが、医師の指示通りに服用してください。
 - 1回2錠、1日8錠を超えて服用してはいけません。
服用間隔：追加で服用する場合は、4時間以上空けてください。
 - 誤って多く服用した場合には、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- ***** 飲み忘れた場合の対応 *****
- 飲み忘れに気づいた場合は、できるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れた分は服用せず、1回とばして次回から服用するようにしてください。絶対に2回分をまとめて一度に服用しないでください。
- 医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。
 - 飲酒は避けてください。飲酒により薬の作用や副作用が強まる場合があります。

トアラセット配合錠「杏林」 を服用される患者さまへ

保管について

- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避けて保管してください。
- 他の人には絶対に渡さないでください。
- 余ったお薬は廃棄してください。

副作用について

- 吐き気・嘔吐** 飲み始めのころにあらわれることがあります。3～7日程度で耐性が形成され、制吐剤の投与が必要でなくなることが多いです。なかなか症状が治まらない場合は、医師にご相談ください。
- 眠気** 飲み始めのころにあらわれることがあります。3～5日程度で耐性が形成され、なくなることが多いですが、眠気がとれない場合は医師にご相談ください。
服用中は自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。
- 便秘** 便秘が認められる場合は、医師にご相談ください。便秘の対策として、下剤と一緒に服用していただくことがあります。

お薬についてわからないこと、服用中に気になることがあれば、医師または薬剤師にご相談ください。

キョーリンメディオ株式会社

(3) 調剤時の留意点について

特になし

5. 承認条件等

該当しない

6. 包装

PTP : 100錠、500錠

バラ : 300錠

7. 容器の材質

[PTP包装品]

PTP包装：ポリ塩化ビニルフィルム及びアルミニウム箔

箱：紙

[バラ包装品]

容器：ポリエチレン

蓋：ポリプロピレン

箱：紙

8. 同一成分・同効薬

[トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠]

同一成分薬：トラムセット配合錠

[トラマドール塩酸塩]

同一成分薬：トラマールOD錠 25mg/50mg、ワントラム錠 100mg

同効薬：フェンタニル、モルヒネ硫酸塩水和物、オキシコドン塩酸塩水和物、コデインリン酸塩水和物

X. 管理的事項に関する項目

	<p>[アセトアミノフェン]</p> <p>同一成分薬：カロナール錠 200/300/500、カロナール細粒 20%/50%、カロナール原末、カロナールシロップ 2% 等</p> <p>同 効 薬：アスピリン、イブプロフェン、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸 等</p>								
9. 国際誕生年月日	2001 年 8 月 15 日（米国）								
10. 製造販売承認年月日及び承認番号	製造販売承認年月日：2018 年 8 月 15 日 承認番号：23000AMX00739000								
11. 薬価基準収載年月日	2018 年 12 月 14 日								
12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	該当しない								
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	該当しない								
14. 再審査期間	該当しない								
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。								
16. 各種コード	<table border="1"> <thead> <tr> <th>HOT(9 桁)番号</th> <th>厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード</th> <th>レセプト 電算コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>126617701</td> <td>1149117F1012</td> <td>622661701</td> </tr> </tbody> </table>			HOT(9 桁)番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト 電算コード	126617701	1149117F1012	622661701
HOT(9 桁)番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト 電算コード							
126617701	1149117F1012	622661701							
17. 保険給付上の注意	本剤は診療報酬上の後発医薬品である。								

XI. 文献

1. 引用文献	<ol style="list-style-type: none">1) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： トアラセット配合錠「杏林」の安定性試験に関する資料2) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： トアラセット配合錠「杏林」の安定性試験に関する資料（無包装状態での安定性試験(熱、湿度及び光による影響)）3) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： トアラセット配合錠「杏林」の溶出性に関する資料4) 第十七改正日本薬局方第一追補解説書，G-105（廣川書店 2017）5) 第十七改正日本薬局方解説書，G-126（廣川書店 2016）6) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： トアラセット配合錠「杏林」の生物学的同等性試験に関する資料7) 高野和彦ほか：診療と新薬 55(10)755～764(2018)
2. その他の参考文献	該当資料なし

XII. 参考資料

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. 主な外国での発売状況 | 該当しない |
| 2. 海外における臨床支援情報 | 該当資料なし |

XIII. 備考

1. その他の関連資料

該当資料なし