

TRADE



MARK

*2015年 9月改訂(第2版)
2008年 6月作成

日本標準商品分類番号	8 7 2 6 1 9
承認番号	22000AMX00775
薬価収載	2008年 6月
販売開始	2008年 7月
再評価結果	1983年 4月

外用殺菌消毒剤

アクリノール消毒液0.2% 「タイセイ」

Acrinol Solution

0.2%

500mL

貯法：遮光した気密容器

製造販売元

大成薬品工業株式会社

福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

アクリノール消毒液0.2%「タイセイ」

0.2%

[組成]

アクリノール水和物 0.18~0.22 w/v %を含む。

[性状]

本品は黄色澄明の液である。

[効能・効果]

化膿局所の消毒

泌尿器・産婦人科術中術後

化膿性疾患(せつ、よう、扁桃炎、副鼻腔炎、中耳炎)

[用法・用量]

0.05~0.2%の液として使用する。

[使用上の注意]

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(その他の副作用)

	頻度不明
皮膚 ^(注)	塗布部の疼痛、発赤、腫脹、潰瘍、壊死
過敏症 ^(注)	過敏症状

注) このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

*2. 適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用し、内服しないこと。

[薬効薬理]

各種化膿菌、特にれんさ球菌、ウェルシュ菌、ブドウ球菌、淋菌に対し、静菌及び殺菌作用がある。作用機序は、生体でアクリジニウムイオンとなり細胞の呼吸酵素を阻害するといわれている。生体組織にほとんど刺激を与えず、血清たん白質の存在下でも殺菌力は低下しない。

[取扱い上の注意]

配合変化：アクリノール水和物は水にやや溶けにくい乳酸塩であるが、塩酸塩は溶けにくい。

したがってCl⁻が共存する場合は、濃度により塩酸塩を析出することがある。

注意：本品で着色すると脱色しにくいので、必要以外のものに付着しないように注意すること。



キャップ:PP

本体:ガラス

〈調剤包装単位用コード〉



(01)04987297214937

〈販売包装単位用コード〉



(01)14987297204935

使用期限

製造番号

L150910 8028