



外用殺菌消毒剤

イソプロパノール消毒液70%「メタル」

Isopropanol Disinfectant Solution 70%

500mL

GS1 (調剤包装単位)
01304987333021741

GS1 (販売包装単位)

火気厳禁

第四類アルコール類
水溶性・危険等級Ⅱ



キャップ：PP
ボトル：PE
外装フィルム：PP

製造番号
使用期限

製造販売元
中北薬品株式会社

愛知県津島市白浜町字番場52-1

2008年12月作成(第1版)

日本標準商品分類番号
872615

承認番号	22000AMX01960
薬価収載	2008年12月
販売開始	2009年1月

貯 法：火気を避けて室温保存
使用期限：ラベルに表示

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有する。]

【組成・性状】

組成

本品は1 mL中に日局イソプロパノール0.7mLを含む。

製剤の性状

本品は無色澄明の液で、特異なおいがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

通常イソプロパノールとして、50～70%液を用いる。

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
[イソプロパノール蒸気に大量に又は

繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

2. 副作用

本品は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症	発疹等
皮膚	刺激症状

このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4. 適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用すること。
使用時：

- (1) 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (2) 血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用い

る場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

- (3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、鏡器具、塗装カテーテル、光学器具等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- (4) 引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。

【薬効薬理】

微生物の蛋白質を変性凝固させて殺菌作用を示す。栄養型細菌に対して短時間で強い殺菌力を示すが、エンテロウイルス、破傷風菌、炭疽菌、その他細菌芽胞には無効である。一部のウイルス(単純ヘルペス、インフルエンザ、AIDSウイルスなど)、リケッチア、結核菌に対しても不活化、殺菌作用を示すといわれる。

【文献請求先】

中北薬品株式会社 製薬工場事業部
〒496-0016 愛知県津島市白浜町字番場52-1
TEL 0567-32-1431
FAX 0567-32-2961