

外皮用殺菌消毒剤

# イソプロパノール消毒液

## 50%「東豊」

50<sup>V</sup>/<sub>V</sub>% Isopropanol Solution

開封日 年 月 日

製造販売元  
**東豊薬品株式会社**  
東京都葛飾区西新小岩4-15-3

2020年6月作成(第1版)

日本標準商品分類番号 872615

承認番号	30200AMX00035
薬価収載	2020年6月
販売開始	2020年8月
再評価結果	1983年4月

【貯 法】 気密容器、室温保存  
【使用期限】 製造の翌月から3年

【禁 忌】 (次の部位には使用しないこと)  
損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有するので]

#### 【組成・性状】

組 成：1mL中 イソプロパノール 500 $\mu$ L  
性 状：本剤は無色澄明の液で、特異なおいがあり、  
味はわずかに甘い。

【効能又は効果】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒。  
【用法及び用量】 通常イソプロパノールとして50～70%液を用い  
る。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にま  
で浸透しないことがあるので、これらが付着している  
医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落として  
から使用すること。

##### 2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確  
となる調査を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹等
皮膚 <sup>注)</sup>	刺激症状

注) このような症状があらわれた場  
合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響  
注射部位に発赤をおこすこと  
があるのでアレルギーテストの  
判断を妨害することがある。

#### 4. 適用上の注意

##### (1) 人体

- 1) 外用にのみ使用すること。
- 2) 眼に入らないように注意すること。入った  
場合には水でよく洗い流すこと。
- 3) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸  
入に注意すること。
- 4) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等によ  
る皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

調剤

販売

火気に注意



容 器:PE 製造番号  
キャップ:PP  
パッキン:PE 使用期限