

貯法：1. 室温保存，遮光保存 2. 開封後は袋の口を閉じて保管
使用期限：外箱等に表示の使用期限内に使用すること

承認番号	22000AMX00473000
薬価収載	2008年6月
販売開始	2008年6月

経皮鎮痛消炎剤

インドメタシンパップ70mg「日医工」

Indometacin

インドメタシン貼付剤

【禁忌（次の患者には使用しないこと）】

1. 本剤又は他のインドメタシン製剤に対して過敏症の既往歴のある患者
2. アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある患者〔重症喘息発作を誘発するおそれがある。〕

【組成・性状】

1. 組成

インドメタシンパップ70mg「日医工」は1枚（膏体14g）中インドメタシン70mgを含有する。
添加物としてモノオレイン酸ソルビタン，モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン，ヒマシ油，クロタミトン，ゼラチン，カオリン，*l*-メントール，メタリン酸ナトリウム，1,3-ブチレンジグリコール，アクリル酸デンプン，ポリアクリル酸ナトリウム，メタクリル酸・アクリル酸 n -ブチルコポリマー，D-ソルビトール，酸化チタン，水酸化アルミナ，マグネシウム，ジブチルヒドロキシトルエン，pH調節剤を含有する。

2. 製剤の性状

本品は白色～淡黄色の膏体を不織布に展延したものであり，わずかに芳香がある。

1枚の大きさ	1枚の膏体重量	包装コード
10cm×14cm	14g	ASD

【効能・効果】

下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎
変形性関節症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛

【用法・用量】

1日2回患部に貼付する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に使用すること）

気管支喘息のある患者〔重症喘息発作を誘発するおそれがある。〕

2. 重要な基本的注意

- (1) 消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。
- (2) 皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるため，感染を伴う炎症に対して用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真菌剤を併用し，観察を十分行い慎重に使用すること。
- (3) 慢性疾患（変形性関節症等）に対し本剤を用いる場合には薬物療法以外の療法も考慮すること。また患者の状態を十分観察し，副作用の発現に留意すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
次のような副作用が認められた場合には，必要に応じ，減量，使用中止等の適切な処置を行うこと。

	頻度不明
皮膚	発赤，瘙癢，発疹，かぶれ，ヒリヒリ感，腫脹

4. 妊婦，産婦，授乳婦等への使用

- ** (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。〔妊婦に対する安全性は確立していない。〕シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤，坐剤）を妊婦に使用し，胎児の腎機能障害及び尿量減少，それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。
- * (2) 他の非ステロイド性消炎鎮痛剤の外皮用剤を妊娠後期の女性に使用し，胎児動脈管収縮が起きたとの報告がある。

5. 小児等への使用

小児に対する安全性は確立していない。

6. 適用上の注意


使用時

- (1) 損傷皮膚及び粘膜に使用しないこと。
- (2) 湿疹又は発疹の部位に使用しないこと。
- (3) 必要に応じ，テープ等で保定することが望ましい。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：インドメタシン（Indometacin）

化学名：[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1*H*-indol-3-yl]acetic acid



分子式：C₁₉H₁₆ClNO₄

分子量：357.79

性状：白色～淡黄色の微細な結晶性の粉末である。

メタノール，エタノール（95）又はジエチルエーテルにやや溶けにくく，水にほとんど溶けない。
本品は水酸化ナトリウム試液に溶ける。
本品は光によって着色する。

融点：155～162℃

【取扱い上の注意】

安定性試験

長期保存試験の結果より，インドメタシンパップ70mg「日医工」は通常の市場流通下において2年間安定であることが確認された。¹⁾

【包装】

インドメタシンパップ70mg「日医工」
560枚（7枚×80；アルミ袋）

【主要文献】

1) 日医工株式会社 社内資料：安定性試験

【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
☎ (0120)517-215
Fax (076)442-8948

