

貯 法：保存条件 30℃以下で保存
容 器 遮光した気密容器
使用期限：容器底部に記載

日本標準商品分類番号
872614

承認番号	16000AMZ05365000
薬価収載	1985年12月
販売開始	2013年6月

外用殺菌消毒剤
日本薬局方 オキシドール
オキシドール「ヤクハン」
OXYDOL

【禁忌】（次の部位には使用しないこと）

瘻孔、挫創等本剤を使用した際に体腔にしみ込むおそれのある部位

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：過酸化水素
分子式：H₂O₂
分子量：34.01

【組成・性状】

1. 組成

本品は過酸化水素（H₂O₂）2.5～3.5w/v%を含む。添加物としてフェナセチンを含む。

2. 性状

本品は無色澄明の液で、においはないか、又はオゾンのようにおいがある。本品を放置するか、又は強く振り動かすとき、徐々に分解する。本品は酸化剤又は還元剤と接触するとき、速やかに分解する。本品はアルカリ性にすると、激しく泡立って分解する。本品は光によって変化する。

【包装】

500mL

【文献請求先及びお問い合わせ先】

岩城製薬株式会社
〒103-8434 東京都中央区日本橋小網町19-8
TEL：03-3668-1573

【効能・効果】 【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
創傷・潰瘍の殺菌・消毒	原液のままあるいは2～3倍希釈して塗布・洗浄する。
外耳・中耳の炎症、鼻炎、咽喉頭炎、扁桃炎などの粘膜の炎症	原液のまま塗布、滴下あるいは2～10倍（耳科の場合、時にグリセリン、アルコールで希釈する）希釈して洗浄、噴霧、含嗽に用いる。
口腔粘膜の消毒、齶窩及び根管の清掃・消毒、歯の清掃	原液又は2倍希釈して洗浄・拭掃する。
口内炎の洗口	10倍希釈して洗口する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

長期間又は広範囲に使用しないこと。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用

空気塞栓（頻度不明）

空気塞栓を起こすことがあるので、循環動態に異常を認めた場合など空気塞栓が疑われる症状がみられた場合は、速やかに本剤の使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	頻度不明
口 腔	連用により口腔粘膜を刺激することがある

3. 適用上の注意

(1)外用にのみ使用し、内服しないこと。

(2)眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

(3)易刺激性の部位に使用する場合、正常の部位に使用する場合よりも低濃度とすることが望ましい。

(4)深い創傷に使用する場合の希釈液としては注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

4. その他の注意

長期大量経口投与によりマウスの十二指腸に腫瘍の発生が認められたとの報告がある。

【薬効薬理】

殺菌消毒作用

発売元
 岩城製薬株式会社
東京都中央区日本橋本町4-8-2

製造販売元

ヤクハン製薬株式会社
北海道北広島市北の里27番地