

**2022年10月改訂(第8版)

*2016年9月改訂

貯法: 室温保存

注意: 本剤は滅菌製剤のため、開封後は速やかに使用すること。

日本標準商品分類番号	872616		
承認番号	22100AMX00751		
薬価収載	2009年5月	販売開始	1998年4月

[効能・効果及び用法・用量]

効能・効果	用法・用量
手術部位(手術野)の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01~0.025%溶液を用いる。
感染皮膚面の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
腔洗浄	ベンザルコニウム塩化物0.02~0.025%溶液を用いる。
結膜囊の洗浄・消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01~0.025%溶液を用いる。

0.025w/v%

滅菌製剤

500mL

外用殺菌消毒剤

日本薬局方

ベンザルコニウム塩化物液

オスバン® 消毒液 0.025%

OSVAN® 0.025%

0.025%

[組成] ベンザルコニウム塩化物、0.025w/v%水溶液

[性状] 無色～淡黄色澄明の液で、特異なにおいがある。

** 製造販売元 富士製薬工業株式会社

富山県富山市水橋辻ヶ堂1515番地

[使用上の注意]

1. 重要な基本的注意

- 1) 本剤は、濃度に注意して使用すること。
- 2) 炎症又は易刺激性の部位(粘膜、陰股部等)に使用する場合には、通常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
- 3) 本剤を希釈して使用する場合は、調製後滅菌処理すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
過敏症: 発疹、掻痒感等の過敏症状(頻度不明)があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

3. 適用上の注意

(1) 人体

1) 投与経路: 経口投与しないこと。浣腸には使用しないこと。

2) 使用時:

- ア. 皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。
イ. 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋脱力を起こすおそれがある)。
ウ. 密封包帯、ギプス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。

(2) その他

1) 調製方法:

繊維、布(綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等)は本剤の成分であるベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。

2) 使用時:

- ア. 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合は、十分に洗い落してから使用すること。
イ. 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落してから使用すること。
ウ. 皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。

[薬効薬理]

(1) 本剤は芽胞のない細菌、カビ類、すなわちグラム陽性・陰性菌のみならず、真菌類にも有効であるが、結核菌及び大部分のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。(2) アルキル側鎖がC₁₂H₂₅のベンザルコニウム塩化物は有機物存在下での殺菌力が優れている。(ベンザルコニウム塩化物の分子式は[C₆H₅CH₂N(CH₃)₂R]Clで、本剤の場合、RはC₁₂H₂₅が80~85%、C₁₂H₂₅+C₁₄H₂₉が98%以上である。)



瓶: PP
キャップ: PP
外装フィルム: PP

12210