

## 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2013に準拠して作成

入眠剤

日本薬局方 ゾルピデム酒石酸塩錠

**ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」****ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」**

ZOLPIDEM TARTRATE Tablets “KYORIN”

剤形	フィルムコーティング錠
製剤の規制区分	向精神薬 習慣性医薬品 <sup>注1)</sup> 処方箋医薬品 <sup>注2)</sup> 注1) 注意－習慣性あり 注2) 注意－医師等の処方箋により使用すること
規格・含量	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」： 1錠中、日局ゾルピデム酒石酸塩 5mg 含有 ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」： 1錠中、日局ゾルピデム酒石酸塩 10mg 含有
一般名	和名：ゾルピデム酒石酸塩 (JAN) 洋名：Zolpidem Tartrate (JAN)
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2012年2月15日 薬価基準収載年月日：2012年6月22日 発売年月日：2012年6月22日
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	製造販売元：キョーリンリメディオ株式会社 販売元：杏林製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	キョーリンリメディオ株式会社 学術部 TEL：0120-960189 FAX：0120-189099 受付時間：8時～22時（日、祝日、その他当社の休業日を除く） 医療関係者向けホームページ <a href="https://med.kyorin-rmd.com/">https://med.kyorin-rmd.com/</a>

本IFは2022年7月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ <https://www.pmda.go.jp/>にてご確認下さい。

# I F 利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

## 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、I F と略す）の位置付け並びに I F 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において I F 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において新たな I F 記載要領 2008 が策定された。

I F 記載要領 2008 では、I F を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること（e-I F）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-I F が提供されることとなった。

最新版の e-I F は、(独) 医薬品医療機器総合機構のホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-I F を掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-I F の情報を検討する組織を設置して、個々の I F が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、I F 記載要領の一部改訂を行い I F 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

## 2. I F とは

I F は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は I F の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された I F は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

### 【I F の様式】

- ①規格は A 4 判、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ② I F 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「I F 利用の手引きの概要」の全文を記載するも

のとし、2頁にまとめる。

### 【I Fの作成】

- ① I Fは原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ② I Fに記載する項目及び配列は日病薬が策定したI F記載要領に準拠する。
- ③ 添付文書の内容を補完するとのI Fの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「I F記載要領 2013」と略す）により作成されたI Fは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

### 【I Fの発行】

- ① 「I F記載要領 2013」は、平成25年10月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ② 上記以外の医薬品については、「I F記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはI Fが改訂される。

## 3. I Fの利用にあたって

「I F記載要領 2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体のI Fについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、I Fの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やI F作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、I Fの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、I Fが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、I Fの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

## 4. 利用に際しての留意点

I Fを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。I Fは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、I Fがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013年4月改訂)

# 目 次


I. 概要に関する項目	1	VII. 薬物動態に関する項目	16
1. 開発の経緯	1	1. 血中濃度の推移・測定法	16
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	2. 薬物速度論的パラメータ	17
II. 名称に関する項目	2	3. 吸収	18
1. 販売名	2	4. 分布	18
2. 一般名	2	5. 代謝	18
3. 構造式又は示性式	2	6. 排泄	19
4. 分子式及び分子量	2	7. トランスポーターに関する情報	19
5. 化学名(命名法)	2	8. 透析等による除去率	19
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	20
7. CAS登録番号	2	1. 警告内容とその理由	20
III. 有効成分に関する項目	3	2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)	20
1. 物理化学的性質	3	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	20
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	20
3. 有効成分の確認試験法	3	5. 慎重投与内容とその理由	20
4. 有効成分の定量法	3	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	21
IV. 製剤に関する項目	4	7. 相互作用	21
1. 剤形	4	8. 副作用	22
2. 製剤の組成	4	9. 高齢者への投与	23
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	4	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	24
4. 製剤の各種条件下における安定性	5	11. 小児等への投与	24
5. 調製法及び溶解後の安定性	8	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	24
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	8	13. 過量投与	24
7. 溶出性	8	14. 適用上の注意	24
8. 生物学的試験法	11	15. その他の注意	24
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	12	16. その他	25
10. 製剤中の有効成分の定量法	12	IX. 非臨床試験に関する項目	26
11. 力価	12	1. 薬理試験	26
12. 混入する可能性のある夾雑物	12	2. 毒性試験	26
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	12	X. 管理的事項に関する項目	27
14. その他	12	1. 規制区分	27
V. 治療に関する項目	13	2. 有効期間又は使用期限	27
1. 効能又は効果	13	3. 貯法・保存条件	27
2. 用法及び用量	13	4. 薬剤取扱い上の注意点	27
3. 臨床成績	13	5. 承認条件等	28
VI. 薬効薬理に関する項目	15	6. 包装	28
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	15	7. 容器の材質	28
2. 薬理作用	15	8. 同一成分・同効薬	28
		9. 国際誕生年月日	28
		10. 製造販売承認年月日及び承認番号	28
		11. 薬価基準収載年月日	28

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	28
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	29
14. 再審査期間	29
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	29
16. 各種コード	29
17. 保険給付上の注意	29
<b>XI. 文献</b>	<b>30</b>
1. 引用文献	30
2. その他の参考文献	30
<b>XII. 参考資料</b>	<b>31</b>
1. 主な外国での発売状況	31
2. 海外における臨床支援情報	31
<b>XIII. 備考</b>	<b>32</b>
1. その他の関連資料	32

# I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」及びゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」は、後発医薬品として薬食発第 0331015 号(平成 17 年 3 月 31 日)に基づき、規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を行い承認申請し、2012 年 2 月に承認を取得、2012 年 6 月に発売に至った。
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1) ベンゾジアゼピン系化合物ではないが、ベンゾジアゼピン結合部位に選択的に結合し、同様の作用を示す。ベンゾジアゼピン結合部位は抑制性神経伝達物質 GABAA 受容体のサブユニットに存在し、ここに結合することにより GABAA 受容体への GABA の親和性を高め、GABAA 系の神経抑制機構を増強して催眠鎮静作用を示す。 <sup>1)</sup> 2) 重大な副作用として、依存性、離脱症状、精神症状、意識障害、一過性前向き健忘、もうろう状態、睡眠随伴症状(夢遊症状等)、呼吸抑制、肝機能障害、黄疸が報告されている。 (本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。)

## II. 名称に関する項目

1. 販売名	
(1) 和名	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」 ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」
(2) 洋名	ZOLPIDEM TARTRATE Tablets 5mg “KYORIN” ZOLPIDEM TARTRATE Tablets 10mg “KYORIN”
(3) 名称の由来	成分の一般名に由来する。
2. 一般名	
(1) 和名（命名法）	ゾルピデム酒石酸塩(JAN)
(2) 洋名（命名法）	Zolpidem Tartrate(JAN) Zolpidem(INN)
(3) ステム	催眠鎮静剤、ゾルピデム誘導体：-pidem
3. 構造式又は示性式	
4. 分子式及び分子量	分子式：(C <sub>19</sub> H <sub>21</sub> N <sub>3</sub> O) <sub>2</sub> ・C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub> 分子量：764.87
5. 化学名（命名法）	<i>N,N</i> ,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2- <i>a</i> ]pyridine-3-acetamide hemi-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> )-tartrate(IUPAC)
6. 慣用名、別名、略号、 記号番号	特になし
7. CAS 登録番号	99294-93-6(Zolpidem Tartrate) 82626-48-0(Zolpidem)


### Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質	
(1) 外観・性状	白色の結晶性の粉末である。 光によって徐々に黄色となる。
(2) 溶解性	酢酸（100）に溶けやすく、 <i>N,N</i> -ジメチルホルムアミド又はメタノールにやや溶けやすく、水にやや溶けにくく、エタノール（99.5）又は無水酢酸に溶けにくい。0.1mol/L 塩酸試液に溶ける。
(3) 吸湿性	該当資料なし
(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点	該当資料なし
(5) 酸塩基解離定数	該当資料なし
(6) 分配係数	該当資料なし
(7) その他の主な示性値	旋光度 $[\alpha]_D^{20}$ : 約+1.8°（1g、 <i>N,N</i> -ジメチルホルムアミド、20mL、100mm） 比吸光度： $E_{1cm}^{1\%}(237nm) = 676$ 、 $E_{1cm}^{1\%}(294nm) = 375$
2. 有効成分の各種条件下における安定性	該当資料なし
3. 有効成分の確認試験法	日本薬局方「ゾルピデム酒石酸塩」の確認試験による。 (1) 沈殿反応 (2) 紫外可視吸光度測定法 (3) 赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法） (4) 酒石酸塩の定性反応(3)
4. 有効成分の定量法	日本薬局方「ゾルピデム酒石酸塩」の定量法による。 電位差滴定法（0.1mol/L 過塩素酸で滴定）

## IV. 製剤に関する項目

### 1. 剤形

#### (1) 剤形の区別、外観及び性状

販売名	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「杏林」	ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「杏林」
剤形	割線入り フィルムコーティング錠	割線入り フィルムコーティング錠
色調	淡いだいだい色	淡いだいだい色
外観		
直径(mm)	6.6	8.6
厚さ(mm)	2.7	3.4
重量(mg)	94	188

#### (2) 製剤の物性

該当資料なし

#### (3) 識別コード

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」 : KRM137

ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」 : KRM138

#### (4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等

該当資料なし

### 2. 製剤の組成

#### (1) 有効成分（活性成分）の含量

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」 :

1 錠中、日局ゾルピデム酒石酸塩 5mg 含有

ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」 :

1 錠中、日局ゾルピデム酒石酸塩 10mg 含有

#### (2) 添加物

乳糖水和物、結晶セルロース、デンプングリコール酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄

#### (3) その他

特になし

### 3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

## IV. 製剤に関する項目

### 4. 製剤の各種条件下における安定性<sup>2)~5)</sup>

#### 【長期保存試験】<sup>2)</sup>

< 保存条件 >

25±2℃、60±5%RH

< 試験検体 >

PTP 包装(ポリ塩化ビニルフィルム及びアルミニウム箔)、ピロー包装(ポリ塩化ビニリデンコートポリプロピレンフィルム)、紙箱

< 試験項目及び規格 >

試験項目	規 格
性状	本品は淡いだいたい色の片面割線入りのフィルムコーティング錠である。
確認試験	波長 235~239nm 及び 292~296nm に吸収の極大を示す。
製剤均一性	判定値：15.0%以下
溶出性	水/900mL/パドル法/毎分 50 回転/15 分間/80%以上
定量(含量)	95.0~105.0%

< 試験結果 >

#### 〔ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」〕

試験項目	開始時	0.5 年後	1 年後	1.5 年後	2 年後	3 年後
性状	適	適	適	適	適	適
確認試験	適					適
製剤均一性	適					適
溶出性	適	適	適	適	適	適
定量(含量) <sup>※</sup>	102.7%	99.4%	100.0%	99.8%	101.1%	100.4%

※1 ロット n=3 の 3 ロットの平均値

#### 〔ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」〕

試験項目	開始時	0.5 年後	1 年後	1.5 年後	2 年後	3 年後
性状	適	適	適	適	適	適
確認試験	適					適
製剤均一性	適					適
溶出性	適	適	適	適	適	適
定量(含量) <sup>※</sup>	102.4%	100.2%	99.9%	99.0%	99.7%	100.1%

※1 ロット n=3 の 3 ロットの平均値

## IV. 製剤に関する項目

### 【加速試験】<sup>3)</sup>

< 保存条件 >

25±2°C、60±5%RH

< 試験検体 >

PTP 包装(ポリ塩化ビニルフィルム及びアルミニウム箔)、ピロー包装(ポリ塩化ビニリデンコートポリプロピレンフィルム)、紙箱

< 試験項目及び規格 >

長期保存試験の項を参照

< 試験結果 >

#### 〔ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」〕

試験項目	開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	適	適	適	適
確認試験	適	適	適	適
製剤均一性	適			適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量) <sup>*</sup>	100.9%	100.6%	100.6%	100.4%

※1 ロット n=3 の 3 ロットの平均値

#### 〔ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」〕

試験項目	開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	適	適	適	適
確認試験	適	適	適	適
製剤均一性	適			適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量) <sup>*</sup>	100.7%	99.3%	99.2%	98.9%

※1 ロット n=3 の 3 ロットの平均値

## IV. 製剤に関する項目

### 【無包装状態での安定性】

#### 〔ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」〕<sup>4)</sup>

保存条件	結 果			
	性状	溶出性	含量	硬度
温度 (40℃、3 ヶ月、 褐色ガラス瓶に入れ、密栓)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
湿度 (75%RH、25℃、3 ヶ月、 褐色ガラス瓶に入れ、開放)	変化なし	変化なし	変化なし	変化あり (規格内) <sup>※</sup>
光 (曝光量120万lx・hr、 25℃、白色透明ガラス瓶にいれ、密栓)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

[規格] 性状：淡いだいだい色の片面割線入りのフィルムコーティング錠、溶出性：15分間80%以上、含量：95.0～105.0%、硬度：参考値

※ 7.2kgf(開始時)→4.5kgf(1 ヶ月)、4.9kgf(2 ヶ月)、4.9kgf(3 ヶ月)

#### 〔ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」〕<sup>5)</sup>

保存条件	結 果			
	性状	溶出性	含量	硬度
温度 (40℃、3 ヶ月、 褐色ガラス瓶に入れ、密栓)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
湿度 (75%RH、25℃、3 ヶ月、 褐色ガラス瓶に入れ、開放)	変化なし	変化なし	変化なし	変化あり (規格内) <sup>※</sup>
光 (曝光量120万lx・hr、 25℃、白色透明ガラス瓶にいれ、密栓)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

[規格] 性状：淡いだいだい色の片面割線入りのフィルムコーティング錠、溶出性：15分間80%以上、含量：95.0～105.0%、硬度：参考値

※ 7.5gf(開始時)→4.8kgf(1 ヶ月)、5.0kgf(2 ヶ月)、5.4kgf(3 ヶ月)

## IV. 製剤に関する項目

<参考>評価基準

分類	性状	溶出性	定量法(含量)	硬度
変化なし	外観上の変化を、ほとんど認めない場合	規格値内の場合	含量低下が3%未満の場合	硬度変化が30%未満の場合
変化あり (規格内)	わずかな色調変化(退色等)等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている場合		含量低下が3%以上で、規格値内の場合	硬度変化が30%以上で、硬度が2.0kg重以上の場合
変化あり (規格外)	形状変化や著しい色調変化等を認め、規格を逸脱している場合	規格値外の場合	規格値外の場合	硬度変化が30%以上で、硬度が2.0kg重未満の場合

本試験は、「(社)日本病院薬剤師会：錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)、平成11年8月20日」を参考に評価しました。本資料は本剤の安定性に関する資料であり、無包装で保存した本剤を使用した場合の有効性・安全性についての評価は実施しておりません。

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化(物理化学的变化)

該当しない

7. 溶出性<sup>6)</sup>

### 【溶出挙動における類似性】

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(医薬審発第786号 平成13年5月31日)に従い、標準製剤との溶出挙動の比較を行った。

〔ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」〕

<試験方法>

試験法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法(パドル法)

試験液：以下の試験液 900mL

試験液の温度：37.0±0.5℃

試験液		回転数
pH1.2	日本薬局方 崩壊試験の第1液	50回転/分
pH3.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50回転/分
pH6.8	日本薬局方 崩壊試験の第2液	50回転/分
水	日本薬局方 精製水	50回転/分
pH1.2	日本薬局方 崩壊試験の第1液	100回転/分

## IV. 製剤に関する項目

### < 判定基準 >


標準製剤の溶出に明確なラグ時間がなく、標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合：

試験製剤は 15 分以内に平均 85%以上溶出する。又は、15 分において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。


### < 結 果 >

溶出条件	判定 時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率 (%)		平均 溶出率 の差 (%)
		標準製剤	ゾルピデム酒石酸 塩錠 5mg「杏林」	
pH1.2/50rpm	15	100.7	101.7	+1.0
pH3.0/50rpm	15	100.2	101.5	+1.3
pH6.8/50rpm	15	98.0	98.7	+0.7
水/50rpm	15	99.8	99.0	-0.8
pH1.2/100rpm	15	100.1	101.7	+1.6

全ての溶出条件において試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出し、標準製剤と試験製剤の溶出挙動は同等であると判定された。



## IV. 製剤に関する項目



### 〔ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」〕

#### < 試験方法 >

試験法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法（パドル法）

試験液：以下の試験液 900mL

試験液の温度：37.0 ± 0.5°C

試験液		回転数
pH1.2	日本薬局方 崩壊試験の第1液	50 回転/分
pH3.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50 回転/分
pH6.8	日本薬局方 崩壊試験の第2液	50 回転/分
水	日本薬局方 精製水	50 回転/分
pH6.8	日本薬局方 崩壊試験の第2液	100 回転/分

#### < 判定基準 >

標準製剤の溶出に明確なラグ時間がなく、標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合：


試験製剤は 15 分以内に平均 85%以上溶出する。又は、15 分において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率 ± 15% の範囲にある。

#### < 結果 >

溶出条件	判定時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率 (%)		平均溶出率の差 (%)
		標準製剤	ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」	
pH1.2/50rpm	15	99.7	102.8	+3.1
pH3.0/50rpm	15	99.9	101.4	+1.5
pH6.8/50rpm	15	94.4	100.0	+5.6
水/50rpm	15	99.1	99.0	-0.1
pH6.8/100rpm	15	101.6	101.6	0

全ての溶出条件において試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出し、標準製剤と試験製剤の溶出挙動は同等であると判定された。

## IV. 製剤に関する項目



### 【公的溶出規格への適合性】

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」及びゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」は、日本薬局方医薬品各条に定められたゾルピデム酒石酸塩錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

試験条件：水 900mL、パドル法、毎分 50 回転


溶出規格：15 分間 80%以上

15 分間の溶出率 (3 ロットの最小値～最大値)	
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」	95%～99%
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」	89%～98%

### 8. 生物学的試験法

該当しない

## IV. 製剤に関する項目

9. 製剤中の有効成分の確認試験法	日本薬局方「ゾルピデム酒石酸塩錠」の確認試験による。 紫外可視吸光度測定法
10. 製剤中の有効成分の定量法	日本薬局方「ゾルピデム酒石酸塩錠」の定量法による。 液体クロマトグラフィー
11. カ価	該当しない
12. 混入する可能性のある夾雑物	7-メチル体  The image shows the chemical structure of 7-methyl zolpidem. It consists of a benzimidazole ring system. At position 7 of the benzimidazole, there is a methyl group (H3C). At position 5, there is a 4-methylphenyl group (a benzene ring with a methyl group at the para position). At position 2, there is a propyl chain ending in a dimethylamino group (N(CH3)2).
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	特になし
14. その他	特になし

## V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果	不眠症（統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症は除く）
	<p><b>&lt;効能・効果に関連する使用上の注意&gt;</b></p> <p>本剤の投与は、不眠症の原疾患を確定してから行うこと。なお、統合失調症あるいは躁うつ病に伴う不眠症には本剤の有効性は期待できない。</p>
2. 用法及び用量	<p>通常、成人にはゾルピデム酒石酸塩として1回5～10mgを就寝直前に経口投与する。なお、高齢者には1回5mgから投与を開始する。年齢、症状、疾患により適宜増減するが、1日10mgを超えないこととする。</p>
	<p><b>&lt;用法・用量に関連する使用上の注意&gt;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本剤に対する反応には個人差があり、また、もうろう状態、睡眠随伴症状（夢遊症状等）は用量依存的にあらわれるので、本剤を投与する場合には少量（1回5mg）から投与を開始すること。やむを得ず増量する場合は観察を十分に行いながら慎重に投与すること。ただし、10mgを超えないこととし、症状の改善に伴って減量に努めること。</li> <li>2. 本剤を投与する場合、就寝の直前に服用させること。また、服用して就寝した後、患者が起床して活動を開始するまでに十分な睡眠時間がとれなかった場合、又は睡眠途中において一時的に起床して仕事等を行った場合などにおいて健忘があらわれたとの報告があるので、薬効が消失する前に活動を開始する可能性があるときは服用させないこと。</li> </ol>
3. 臨床成績	
(1) 臨床データパッケージ	該当資料なし
(2) 臨床効果	該当資料なし
(3) 臨床薬理試験	該当資料なし
(4) 探索的試験	該当資料なし
(5) 検証的試験	
1) 無作為化並行用量反応試験	該当資料なし
2) 比較試験	該当資料なし

## V. 治療に関する項目

---

3) 安全性試験	該当資料なし
4) 患者・病態別試験	該当資料なし
(6) 治療的使用	
1) 使用成績調査・特定 使用成績調査（特別 調査）・製造販売後 臨床試験（市販後臨 床試験）	該当資料なし
2) 承認条件として実 施予定の内容又は 実施した試験の概 要	該当しない

## VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬：ゾピクロン、エスゾピクロン
2. 薬理作用	
(1) 作用部位・作用機序 <sup>1)</sup>	ベンゾジアゼピン系化合物ではないが、ベンゾジアゼピン結合部位に選択的に結合し、同様の作用を示す。ベンゾジアゼピン結合部位は抑制性神経伝達物質 GABA <sub>A</sub> 受容体のサブユニットに存在し、ここに結合することにより GABA <sub>A</sub> 受容体への GABA の親和性を高め、GABA <sub>A</sub> 系の神経抑制機構を増強して催眠鎮静作用を示す。
(2) 薬効を裏付ける試験成績	該当資料なし
(3) 作用発現時間・持続時間	該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

### 1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間

VII. 薬物動態に関する項目、1. 血中濃度の推移・測定法(3)臨床試験で確認された血中濃度の項を参照

(3) 臨床試験で確認された血中濃度<sup>7),8)</sup>

#### 【生物学的同等性試験】


後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(医薬審発第786号 平成13年5月31日)に従い、健康成人男子を対象に生物学的同等性試験を実施した。

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」又はゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」と各標準製剤をクロスオーバー法によりそれぞれ1錠(ゾルピデム酒石酸塩として5mg又は10mg)を健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

#### 【ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」】

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0→12</sub> (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」	272.8±118.2	85.9±31.5	0.87±0.44	2.04±0.49
標準製剤 (錠剤、5mg)	300.7±136.5	89.5±35.3	1.09±0.77	2.10±0.54

(Mean±S.D., n=22)




## VII. 薬物動態に関する項目

### [ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」]

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0→12</sub> (ng・hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」	693.8 ± 240.7	196.0 ± 58.5	1.10 ± 0.81	2.13 ± 0.46
標準製剤 (錠剤、10mg)	768.6 ± 262.2	207.2 ± 62.8	0.97 ± 0.89	2.22 ± 0.38

(Mean ± S. D., n=22)



血漿中濃度並びに AUC、C<sub>max</sub> 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4) 中毒域

該当資料なし

(5) 食事・併用薬の影響

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、7. 相互作用の項を参照

(6) 母集団 (ポピュレーション) 解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

(3) バイオアベイラビリティ	該当資料なし
(4) 消失速度定数 <sup>6)</sup>	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」 : 0.3612±0.0980 (hr <sup>-1</sup> ) (n=22) ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」 : 0.3412±0.0824 (hr <sup>-1</sup> ) (n=22)
(5) クリアランス	該当資料なし
(6) 分布容積	該当資料なし
(7) 血漿蛋白結合率	約 96% <sup>1)</sup>
3. 吸収	該当資料なし
4. 分布	
(1) 血液－脳関門通過性	該当資料なし
(2) 血液－胎盤関門通過性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(1)の項を参照
(3) 乳汁への移行性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(2)の項を参照
(4) 髄液への移行性	該当資料なし
(5) その他の組織への移行性	該当資料なし
5. 代謝	
(1) 代謝部位及び代謝経路 <sup>1)</sup>	大部分は肝で代謝され、その主なものは芳香環のメチル基が酸化されてカルボン酸となった薬理活性のない代謝物である。
(2) 代謝に関与する酵素 (CYP450 等) の分子種	主として肝薬物代謝酵素 CYP3A4 及び一部 CYP2C9、CYP1A2 で代謝される。

## VII. 薬物動態に関する項目

(3) 初回通過効果の有無及びその割合	該当資料なし
(4) 代謝物の活性の有無及び比率	VII. 薬物動態に関する項目、5. 代謝(1)代謝部位及び代謝経路の項を参照
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	該当資料なし
6. 排泄	
(1) 排泄部位及び経路	該当資料なし
(2) 排泄率 <sup>1)</sup>	24時間までの尿中排泄率は0.5%以下
(3) 排泄速度	該当資料なし
7. トランスポーターに関する情報	該当資料なし
8. 透析等による除去率	血液透析では除去されない。

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由	<p><b>【警告】</b></p> <p>本剤の服用後に、もうろう状態、睡眠随伴症状（夢遊症状等）があらわれることがある。また、入眠までの、あるいは中途覚醒時の出来事を記憶していないことがあるので注意すること。</p>
2. 禁忌内容とその理由 （原則禁忌を含む）	<p><b>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</li> <li>2. 重篤な肝障害のある患者 [代謝機能の低下により血中濃度が上昇し、作用が強くあらわれるおそれがある。]</li> <li>3. 重症筋無力症の患者 [筋弛緩作用により症状を悪化させるおそれがある。]</li> <li>4. 急性閉塞隅角緑内障の患者 [眼圧が上昇し、症状を悪化させるおそれがある。]</li> <li>5. 本剤により睡眠随伴症状（夢遊症状等）として異常行動を発現したことがある患者 [重篤な自傷・他傷行為、事故等に至る睡眠随伴症状を発現するおそれがある。]</li> </ol>
	<p><b>【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】</b></p> <p>肺性心、肺気腫、気管支喘息及び脳血管障害の急性期などで呼吸機能が高度に低下している場合 [呼吸抑制により炭酸ガスナルコーシスを起こしやすい。]</p>
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	V. 治療に関する項目、1. 効能又は効果<効能・効果に関連する使用上の注意>の項を参照
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	V. 治療に関する項目、2. 用法及び用量<用法・用量に関連する使用上の注意>の項を参照
5. 慎重投与内容とその理由	<p><b>慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 衰弱患者 [薬物の作用が強くあらわれ、副作用が発現しやすい。]</li> <li>(2) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）</li> <li>(3) 心障害のある患者 [血圧低下があらわれるおそれがあり、心障害のある患者では症状の悪化につながるおそれがある。]</li> <li>(4) 肝障害のある患者（【禁忌】の項参照）</li> </ol>

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	<p>(5) 腎障害のある患者 [排泄が遅延し、作用が強くあらわれるおそれがある。]</p> <p>(6) 脳に器質的障害のある患者 [作用が強くあらわれるおそれがある。]</p>															
7. 相互作用	<p><b>重要な基本的注意</b></p> <p>(1) 連用により薬物依存を生じることがあるので、漫然とした継続投与による長期使用を避けること。本剤の投与を継続する場合には、治療上の必要性を十分に検討すること。（「<b>重大な副作用</b>」の項参照）</p> <p>(2) 本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。</p>															
(1) 併用禁忌とその理由	<p>本剤は、主として肝薬物代謝酵素 CYP3A4 及び一部 CYP2C9、CYP1A2 で代謝される。</p>															
(2) 併用注意とその理由	<p>該当しない</p> <p><b>【併用注意】（併用に注意すること）</b></p> <table border="1" data-bbox="486 1243 1428 2072"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>麻酔剤</td> <td>呼吸抑制があらわれることがあるので、慎重に投与すること。</td> <td>相加的に呼吸が抑制される可能性がある。</td> </tr> <tr> <td>中枢神経抑制剤 フェノチアジン誘導体 バルビツール酸誘導体等</td> <td>相互に中枢神経抑制作用が増強することがあるので、慎重に投与すること。</td> <td>本剤及びこれらの薬剤は中枢神経抑制作用を有する。</td> </tr> <tr> <td>アルコール（飲酒）</td> <td>精神機能・知覚・運動機能等の低下が増強することがあるので、できるだけ飲酒を控えさせること。</td> <td>アルコールは GABA<sub>A</sub> 受容体に作用すること等により中枢神経抑制作用を示すため、併用により相互に中枢神経抑制作用を増強することがある。</td> </tr> <tr> <td>リファンピシン</td> <td>本剤の血中濃度が低下</td> <td>薬物代謝酵素 CYP3A4 が</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	麻酔剤	呼吸抑制があらわれることがあるので、慎重に投与すること。	相加的に呼吸が抑制される可能性がある。	中枢神経抑制剤 フェノチアジン誘導体 バルビツール酸誘導体等	相互に中枢神経抑制作用が増強することがあるので、慎重に投与すること。	本剤及びこれらの薬剤は中枢神経抑制作用を有する。	アルコール（飲酒）	精神機能・知覚・運動機能等の低下が増強することがあるので、できるだけ飲酒を控えさせること。	アルコールは GABA <sub>A</sub> 受容体に作用すること等により中枢神経抑制作用を示すため、併用により相互に中枢神経抑制作用を増強することがある。	リファンピシン	本剤の血中濃度が低下	薬物代謝酵素 CYP3A4 が
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子														
麻酔剤	呼吸抑制があらわれることがあるので、慎重に投与すること。	相加的に呼吸が抑制される可能性がある。														
中枢神経抑制剤 フェノチアジン誘導体 バルビツール酸誘導体等	相互に中枢神経抑制作用が増強することがあるので、慎重に投与すること。	本剤及びこれらの薬剤は中枢神経抑制作用を有する。														
アルコール（飲酒）	精神機能・知覚・運動機能等の低下が増強することがあるので、できるだけ飲酒を控えさせること。	アルコールは GABA <sub>A</sub> 受容体に作用すること等により中枢神経抑制作用を示すため、併用により相互に中枢神経抑制作用を増強することがある。														
リファンピシン	本剤の血中濃度が低下	薬物代謝酵素 CYP3A4 が														

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

### 8. 副作用

#### (1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

#### (2) 重大な副作用と初期症状

##### 重大な副作用

- 1) **依存性、離脱症状**（頻度不明）：連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び使用期間に注意し慎重に投与すること。また、連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、反跳性不眠、いらいら感等の離脱症状があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。
- 2) **精神症状、意識障害**（頻度不明）：せん妄、錯乱、幻覚、興奮、脱抑制、意識レベルの低下等の精神症状及び意識障害があらわれることがあるので、患者の状態を十分観察し、異常が認められた場合には投与を中止すること。
- 3) **一過性前向性健忘、もうろう状態、睡眠随伴症状（夢遊症状等）**（頻度不明）：一過性前向性健忘（服薬後入眠までの出来事を覚えていない、途中覚醒時の出来事を覚えていない）、もうろう状態、睡眠随伴症状（夢遊症状等）があらわれることがあるので、服薬後は直ぐ就寝させ、睡眠中に起こさないように注意すること。なお、十分に覚醒しないまま、車の運転、食事等を行い、その出来事を記憶していないとの報告がある。また、死亡を含む重篤な自傷・他傷行為、事故等の報告もある。異常が認められた場合には投与を中止すること。
- 4) **呼吸抑制**（頻度不明）：呼吸抑制があらわれることがある。また、呼吸機能が高度に低下している患者に投与した場合、炭酸ガスナルコーシスを起こすことがあるので、このような場合には気道を確保し、換気をはかるなど適切な処置を行うこと。
- 5) **肝機能障害、黄疸**（頻度不明）：AST(GOT)、ALT(GPT)、 $\gamma$ -GTP、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

### (3) その他の副作用

その他の副作用	
分類	副作用（頻度不明）
精神神経系	ふらつき、眠気、頭痛、残眠感、頭重感、めまい、不安、悪夢、気分高揚、錯視、しびれ感、振戦
血液	白血球増多、白血球減少
肝臓	ALT (GPT) 上昇、 $\gamma$ -GTP 上昇、AST (GOT) 上昇、LDH 上昇
腎臓	蛋白尿
消化器	悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、下痢、口の錯感覚、食欲亢進
循環器	動悸
過敏症 <sup>註1)</sup>	発疹、痒痒感
骨格筋	倦怠感、疲労、下肢脱力感、筋痙攣
眼	複視、視力障害、霧視
その他	口渇、不快感、転倒 <sup>註2)</sup> 、味覚異常

註1) 発現した場合には、投与を中止すること。

註2) 転倒により高齢者が骨折する例が報告されている。

### (4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

### (5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

### (6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法

- (1) 禁忌（次の患者には投与しないこと）  
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2) その他の副作用（頻度不明）  
過敏症：発疹、痒痒感  
発現した場合には、投与を中止すること。

### 9. 高齢者への投与

運動失調が起こりやすい。また、副作用が発現しやすいので、少量（1回5mg）から投与を開始し、1回10mgを超えないこと。

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

### 10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) **妊婦等**：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。本薬はヒトで胎盤を通過することが報告されており、妊娠後期に本剤を投与された患者より出生した児に呼吸抑制、痙攣、振戦、易刺激性、哺乳困難等の離脱症状があらわれることがある。なお、これらの症状は、新生児仮死として報告される場合もある。]
- (2) **授乳婦**：授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。[母乳中へ移行することが報告されており、新生児に嗜眠を起こすおそれがある。]

### 11. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。（使用経験が少ない。）

### 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当資料なし

### 13. 過量投与

**症状**：本剤単独の過量投与では、傾眠から昏睡までの意識障害が報告されているが、さらに中枢神経抑制症状、血圧低下、呼吸抑制、無呼吸等の重度な症状があらわれるおそれがある。

**処置**：呼吸、脈拍、血圧の監視を行うとともに、催吐、胃洗浄、吸着剤・下剤の投与、輸液、気道の確保等の適切な処置を行うこと。また、本剤の過量投与が明白又は疑われた場合の処置としてフルマゼニル（ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤）を投与する場合には、使用前にフルマゼニルの使用上の注意（禁忌、慎重投与、相互作用等）を必ず読むこと。なお、本剤は血液透析では除去されない。

### 14. 適用上の注意

**薬剤交付時**：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]

### 15. その他の注意

投与した薬剤が特定されないままにフルマゼニル（ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤）を投与された患者で、新たに本剤を投与する場合、本剤の鎮静、抗痙攣作用が変化、遅延するおそれがある。

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

---

16. その他

特になし

## Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

---

1. 薬理試験	
(1) 薬効薬理試験（「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照）	
(2) 副次的薬理試験	該当資料なし
(3) 安全性薬理試験	該当資料なし
(4) その他の薬理試験	該当資料なし
2. 毒性試験	
(1) 単回投与毒性試験	該当資料なし
(2) 反復投与毒性試験	該当資料なし
(3) 生殖発生毒性試験	該当資料なし
(4) その他の特殊毒性	該当資料なし

---

## X. 管理的事項に関する項目

### 1. 規制区分

製剤	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」 ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」	向精神薬、習慣性医薬品 <sup>注1)</sup> 、 処方箋医薬品 <sup>注2)</sup>
有効成分	ゾルピデム酒石酸塩	向精神薬、習慣性医薬品 <sup>注1)</sup> 、

注1) 注意－習慣性あり

注2) 注意－医師等の処方箋により使用すること

### 2. 有効期間又は使用期限

使用期限：3年(安定性試験結果に基づく<sup>2)</sup>)

### 3. 貯法・保存条件

室温保存、ただし錠剤分割後は遮光保存

### 4. 薬剤取扱い上の注意点

#### (1) 薬局での取り扱い上の留意点について

特になし

#### (2) 薬剤交付時の取り扱いについて(患者等に留意すべき必須事項等)

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、14. 適用上の注意の項を参照  
くすりのしおり：有り  
患者者用指導箋：

**ゾルピデム酒石酸塩錠「杏林」を  
服用される患者様へ**

.....

このお薬は**不眠症治療剤**です。

**5mg**



**10mg**



- 必ず主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 就寝直前に服用してください。
- このお薬を服用する前後に、アルコール類を飲まないでください。
- 就寝してから短時間後に起きて作業を行う予定がある場合は服用しないでください。
- 自分の判断でお薬の量を変えたり、服用するのをやめたりしないでください。
- このお薬はあなたに処方されたお薬です。自分のお薬を他の人にあげたり、もらったりしないでください。

ご不明な点がありましたら、医師または薬剤師にご相談ください

販売元 杏林製薬株式会社 製造販売元 キョーリンリメディオ株式会社  
東京都千代田区神田新河2丁目5番地 岡山県岡山市東区津島4-1-1

## X. 管理的事項に関する項目

(3) 調剤時の留意点について	特になし											
5. 承認条件等	該当しない											
6. 包装	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="480 499 959 562">ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」</td> <td colspan="2" data-bbox="959 499 1433 562">PTP：100錠、700錠、1000錠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 562 959 629">ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」</td> <td colspan="2" data-bbox="959 562 1433 629">PTP：100錠、700錠、1000錠</td> </tr> </table>			ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」	PTP：100錠、700錠、1000錠		ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」	PTP：100錠、700錠、1000錠				
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」	PTP：100錠、700錠、1000錠											
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」	PTP：100錠、700錠、1000錠											
7. 容器の材質	<p>[PTP 包装品]</p> <p>PTP 包装：ポリ塩化ビニルフィルム、アルミニウム箔</p> <p>ピロー包装：ポリ塩化ビニリデンコートポリプロピレンフィルム</p> <p>箱：紙</p>											
8. 同一成分・同効薬	<p>同一成分薬：マイスリー錠 5mg、マイスリー錠 10mg</p> <p>同効薬：ゾピクロン、エスゾピクロン</p>											
9. 国際誕生年月日	1987年6月9日											
10. 製造販売承認年月日及び承認番号	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 1149 799 1193">販売名</th> <th data-bbox="799 1149 1114 1193">製造販売承認年月日</th> <th data-bbox="1114 1149 1433 1193">承認番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 1193 799 1290">ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」</td> <td data-bbox="799 1193 1114 1290">2012年2月15日</td> <td data-bbox="1114 1193 1433 1290">22400AMX00274000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1290 799 1391">ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」</td> <td data-bbox="799 1290 1114 1391">2012年2月15日</td> <td data-bbox="1114 1290 1433 1391">22400AMX00275000</td> </tr> </tbody> </table>			販売名	製造販売承認年月日	承認番号	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」	2012年2月15日	22400AMX00274000	ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」	2012年2月15日	22400AMX00275000
販売名	製造販売承認年月日	承認番号										
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」	2012年2月15日	22400AMX00274000										
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」	2012年2月15日	22400AMX00275000										
11. 薬価基準収載年月日	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 1440 799 1485">販売名</th> <th data-bbox="799 1440 1114 1485">薬価基準収載年月日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 1485 799 1581">ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」</td> <td data-bbox="799 1485 1114 1581">2012年6月22日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1581 799 1682">ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」</td> <td data-bbox="799 1581 1114 1682">2012年6月22日</td> </tr> </tbody> </table>			販売名	薬価基準収載年月日	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」	2012年6月22日	ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」	2012年6月22日			
販売名	薬価基準収載年月日											
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」	2012年6月22日											
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」	2012年6月22日											
12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	該当しない											

## X. 管理的事項に関する項目

13. 再審査結果、再評価  
結果公表年月日及び  
その内容

該当しない

14. 再審査期間

該当しない

15. 投薬期間制限医薬品  
に関する情報

本剤は厚生労働省告示第 97 号（平成 20 年 3 月 19 日付、平成 18 年厚生労働省告示第 107 号 一部改正）に基づき、1 回 30 日分を超える投薬は認められていない。

16. 各種コード

販売名	HOT(9桁)番号	厚生労働省薬価 基準収載医薬品 コード	レセプト 電算コード
ゾルピデム酒石酸 塩錠 5mg「杏林」	121758201	1129009F1017	622175801
ゾルピデム酒石酸 塩錠 10mg「杏林」	121759901	1129009F2013	622175901

17. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

## XI. 文献

1. 引用文献	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 第十七改正日本薬局方解説書 C-2897(廣川書店 2016)</li><li>2) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」・10mg「杏林」の安定性試験（長期保存試験）に関する資料</li><li>3) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」・10mg「杏林」の安定性試験（加速試験）に関する資料</li><li>4) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」の無包装状態での安定性に関する資料</li><li>5) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「杏林」の無包装状態での安定性に関する資料</li><li>6) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」・10mg「杏林」の溶出性に関する資料</li><li>7) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」・10mg「杏林」の生物学的同等性試験に関する資料</li><li>8) 水山和之ほか：診療と新薬 49(5)683～695(2012)</li></ol>
2. その他の参考文献	該当資料なし

## XII. 参考資料

---

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 1. 主な外国での発売状況   | 該当しない  |
| 2. 海外における臨床支援情報 | 該当資料なし |

## XII. 備考

---

1. その他の関連資料

該当資料なし