

貯 法：気密容器に入れ、室温保存

使用期限：外箱等に表示（2年）

注 意：取扱上の注意の項参照

経皮吸収型・気管支拡張剤

	0.5mg	1mg	2mg
承認番号	22500AMX00962	22500AMX00963	22500AMX00964
薬価収載	2013年12月	2013年12月	2013年12月
販売開始	2006年7月	2006年7月	2006年7月

処方箋医薬品

（注意－医師等の処方箋により使用すること）

# ツロブテロールテープ0.5mg 「タカタ」

# ツロブテロールテープ1mg 「タカタ」

# ツロブテロールテープ2mg 「タカタ」

\* 日本薬局方 ツロブテロール経皮吸収型テープ

TULOBUTEROL



前回改訂⇒

### 【禁忌(次の患者には使用しないこと)】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

### 【組成・性状】

#### 1. 組成

品 名	ツロブテロールテープ0.5mg 「タカタ」	ツロブテロールテープ1mg 「タカタ」	ツロブテロールテープ2mg 「タカタ」
成分・分量	1枚中 ツロブテロール 0.5mg	1枚中 ツロブテロール 1mg	1枚中 ツロブテロール 2mg
添 加 物	ミリスチン酸イソプロピル、アクリル酸 2-エチルヘキシル・ジアセトンアクリルアミド・メタクリル酸アセトアセトキシエチル・メタクリル酸メチル共重合体溶液		

#### 2. 製剤の性状

品 名	ツロブテロールテープ0.5mg 「タカタ」	ツロブテロールテープ1mg 「タカタ」	ツロブテロールテープ2mg 「タカタ」
性 状	ほとんど無色～微白色の四隅が丸い四角形の粘着テープ剤で、膏体面は無色透明のライナーで覆われている。		
外 形 (大きさ)	16.0mm 16.0mm (2.5cm <sup>2</sup> )	22.5mm 22.5mm (5cm <sup>2</sup> )	32.0mm 32.0mm (10cm <sup>2</sup> )

### 【効能・効果】

下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解

気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫

### 【用法・用量】

通常、成人にはツロブテロールとして2mg、小児にはツロブテロールとして0.5～3歳未満には0.5mg、3～9歳未満には1mg、9歳以上には2mgを1日1回、胸部、背部又は上腕部のいずれかに貼付する。

### 【使用上の注意】\*\*

- 慎重投与(次の患者には慎重に使用すること)
  - 甲状腺機能亢進症の患者[症状が増悪するおそれがある。]
  - 高血圧症の患者[血圧が上昇することがある。]
  - 心疾患のある患者[心悸亢進、不整脈等があらわれることがある。]
  - 糖尿病の患者[糖代謝が亢進し、血中グルコースが増加するおそれがある。]
  - アトピー性皮膚炎の患者[貼付部位に癢痒感、発赤等があらわれやすい。]
  - 高齢者(「5. 高齢者への投与」の項参照)
- 重要な基本的注意
  - 気管支喘息治療における長期管理の基本は、吸入ステロイド剤等の抗炎症剤の使用であり、吸入ステロイド剤等により症状の改善が得られない場合、あるいは患者の重症度から吸入ステロイド剤等との併用による治療が適切と判断された場合にのみ、本剤と吸入ステロイド剤等を併用して使用すること。  
本剤は吸入ステロイド剤等の抗炎症剤の代替薬ではないため、患者が本剤の使用により症状改善を感じた場合であっても、医師の指示なく吸入ステロイド剤等を減量又は中止し、本剤を単独で用いることのないよう、患者、保護者又はそれに代わり得る適切な者に注意を与えること。
  - 気管支喘息、慢性気管支炎又は肺気腫治療の長期管理において、本剤の投与期間中に発現する急性発作に対しては、短時間作動型吸入β<sub>2</sub>刺激薬等の他の適切な薬剤を使用するよう患者、保護者又はそれに代わり得る適切な者に注意を与えること。

今回改訂⇒

また、その薬剤の使用量が増加したり、効果が十分でなくなってきた場合には、疾患の管理が十分でないことが考えられるので、可及的速やかに医療機関を受診し治療を受けるよう患者、保護者又はそれに代わり得る適切な者に注意を与えること。

(3) 気管支喘息治療において、短時間作動型β<sub>2</sub>刺激薬等、急性発作を緩和するための薬剤の使用量が増加したり、効果が十分でなくなってきた場合には、生命を脅かす可能性があるので、吸入ステロイド剤等の増量等の抗炎症療法の強化を行うこと。

(4) 用法・用量通り正しく使用しても効果が認められない場合(目安は1～2週間程度)は、本剤が適当でないと考えられるので、使用を中止すること。

なお、小児に使用する場合には、使用法を正しく指導し、経過の観察を十分に行うこと。

(5) 用法・用量を超えて使用を続けた場合、不整脈、場合によっては心停止を起こすおそれがあるので、用法・用量を超えて使用しないように注意すること。

### 3. 相互作用

併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カテコールアミン製剤 アドレナリン、イソプロテレノール等	不整脈、場合によっては心停止を起こすおそれがある。	本剤及びカテコールアミン製剤はともに交感神経刺激作用を持つ。
キサンチン誘導体 テオフィリン、アミノフィリン水和物、ジプロフィリン等	低カリウム血症による不整脈を起こすおそれがある。	本剤及びキサンチン誘導体はともに細胞内へのカリウム移行作用を持つ。
ステロイド剤 プレドニゾン、ベタメタゾン、ヒドロコルチゾン等		ステロイド剤及び利尿剤は尿中へのカリウム排泄を増加させる。
利尿剤 トリクロルメチアジド、フロセミド、アセタゾラミド等		

### 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

#### (1) 重大な副作用(頻度不明)

1) アナフィラキシー アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等の症状が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2) 重篤な血清カリウム値の低下 β<sub>2</sub>刺激薬により重篤な血清カリウム値の低下が報告されている。また、β<sub>2</sub>刺激薬による血清カリウム値の低下作用は、キサンチン誘導体、ステロイド剤及び利尿剤の併用により増強することがあるので、重症喘息患者では特に注意すること。さらに、低酸素血症は血清カリウム値の低下が心リズムに及ぼす作用を増強することがある。このような場合には、血清カリウム値をモニターすることが望ましい。

#### (2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>(注)</sup>	発疹、痒痒症、蕁麻疹
循環器	心悸亢進、顔面紅潮、不整脈、頻脈
精神神経系	振戦、頭痛、不眠、全身倦怠感、めまい、興奮、しびれ感、筋痙縮、熱感、こわばり感
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、胃部不快感
肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇
血液	好酸球数増加
皮膚	適用部位痒痒感、適用部位紅斑、接触性皮膚炎、適用部位疼痛、適用部位変色
その他	CK(CPK)上昇、血清カリウム値の低下、胸痛、浮腫、口渇、筋肉痛

(注)症状が認められた場合には、使用を中止すること。(太字)

### 5. 高齢者への投与

一般に高齢者では、生理機能が低下しているため、低用量から使用を開始するなど慎重に使用すること。

### 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。[妊娠中の使用に関する安全性は確立していない。]

(2) 授乳中の婦人には、本剤使用中は授乳を避けさせること。[動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている。]

### 7. 小児等への投与

(1) 6ヵ月未満の乳児に対する安全性は確立していない。(使用経験が少ない。)

(2) 小児等における長期投与時の安全性は確立していない。(使用経験が少ない。)

### 8. 適用上の注意

#### 貼付部位

(1) 貼付部位の皮膚を拭い、清潔にしてから本剤を貼付すること。

(2) 皮膚刺激を避けるため、毎回貼付部位を変えることが望ましい。

(3) 本剤をはがす可能性がある小児には、手の届かない部位に貼付することが望ましい。


(4) 動物実験(ラット)で損傷皮膚に貼付した場合、血中濃度の上昇が認められたので、創傷面に使用しないこと。

## 【薬物動態】

### 生物学的同等性試験<sup>1)</sup>

#### 1. ツロブテロールテープ0.5mg「タカタ」

本剤と標準製剤(貼付剤、0.5mg)をクロスオーバー法により、健康成人男子24名にそれぞれ4枚(ツロブテロールとして2mg)を10時間以上絶食した空腹時、前胸部に貼付し(24時間後に除去)、貼付前、貼付後4、6、8、10、12、14、24、28、32、36及び48時間に前腕静脈から採血した。LC/MS/MSにより測定したツロブテロールの血漿中濃度の推移及びパラメータは次のとおりであり、統計解析にて90%信頼区間を求めた結果、判定パラメータの対数値の平均値の差は $\log 0.8 \sim \log 1.25$ の範囲にあり、両剤の生物学的同等性が確認された。




	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUCt (pg·hr/mL)	Cmax (pg/mL)	tmax (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
ツロブテロールテープ0.5mg「タカタ」	24777.7±13948.4	1066.7±623.5	11.9±5.0	9.3±1.3
標準製剤(貼付剤、0.5mg)	24217.1±13901.1	1119.5±619.3	12.6±4.2	9.9±1.9

(mean±S.D.)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

#### 2. ツロブテロールテープ1mg「タカタ」

本剤と標準製剤(貼付剤、1mg)をクロスオーバー法により、健康成人男子12名にそれぞれ2枚(ツロブテロールとして2mg)を10時間以上絶食した空腹時、前胸部に貼付し(24時間後に除去)、貼付前、貼付後4、6、8、10、12、14、24、28、32、36及び48時間に前腕静脈から採血した。LC/MS/MSにより測定したツロブテロールの血漿中濃度の推移及びパラメータは次のとおりであり、統計解析にて90%信頼区間を求めた結果、判定パラメータの対数値の平均値の差は $\log 0.8 \sim \log 1.25$ の範囲にあり、両剤の生物学的同等性が確認された。




	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUCt (pg·hr/mL)	Cmax (pg/mL)	tmax (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
ツロブテロールテープ1mg「タカタ」	31276.5±24809.7	1311.0±971.5	10.2±3.0	12.1±1.6
標準製剤(貼付剤、1mg)	31226.4±22444.5	1284.3±758.7	13.2±5.6	12.1±3.1

(mean±S.D.)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

#### 3. ツロブテロールテープ2mg「タカタ」

本剤と標準製剤(貼付剤、2mg)をクロスオーバー法により、健康成人男子48名にそれぞれ1枚(ツロブテロールとして2mg)を10時間以上絶食した空腹時、前胸部に貼付し(24時間後に除去)、貼付前、貼付後4、6、8、10、12、14、24、28、32、36及び48時間に前腕静脈から採血した。LC/MS/MSにより測定したツロブテロールの血漿中濃度の推移及びパラメータは次のとおりであり、統計解析にて90%信頼区間を求めた結果、判定パラメータの対数値の平均値の差は $\log 0.8 \sim \log 1.25$ の範囲にあり、両剤の生物学的同等性が確認された。



	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUCt (pg·hr/mL)	Cmax (pg/mL)	tmax (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
ツロブテロールテープ2mg「タカタ」	27655.0±13053.1	1121.2±433.2	14.4±7.3	9.9±2.8
標準製剤(貼付剤、2mg)	28951.8±15659.6	1243.8±477.3	13.5±5.6	10.6±3.0

(mean±S.D.)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

## 【薬効薬理】

ツロブテロールは、気管支平滑筋の $\beta_2$ 受容体を刺激し、adenyl cyclaseを活性化し、細胞内のATPをcAMPに変換し、気管支を拡張させる。


## 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ツロブテロール [日局]

Tulobuterol

化学名：(1*RS*)-1-(2-Chlorophenyl)-2-(1,1-dimethylethyl)aminoethanol

構造式：



及び鏡像異性体

分子式：C<sub>12</sub>H<sub>18</sub>ClNO

分子量：227.73

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末である。

メタノールに極めて溶けやすく、エタノール(99.5)  
又は酢酸(100)に溶けやすく、水にほとんど溶けな  
い。

0.1mol/L塩酸試液に溶ける。

40℃で徐々に昇華する。

メタノール溶液(1→20)は旋光性を示さない。

融点：90～93℃

### 【取扱い上の注意】

1. 使用時及び保管についての注意：患者には本剤を内袋のまま渡し、本剤を使用するときに内袋から取り出すように指示すること。

2. 安定性試験<sup>2)</sup>

最終包装製品を用いた長期保存試験(25℃、60%RH、24ヵ月)の結果、2年間安定であることが確認された。

### 【包装】

ツロブテロールテープ0.5mg「タカタ」

70枚(1枚×70)

350枚(1枚×350)

ツロブテロールテープ1mg「タカタ」

70枚(1枚×70)

350枚(1枚×350)

ツロブテロールテープ2mg「タカタ」

70枚(1枚×70)

350枚(1枚×350)

### 【主要文献】

- 1) 本田耕一他：医学と薬学, 55(5)：727, 2006.
- 2) 高田製薬株式会社内資料(安定性)

### 【文献請求先】\*

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

高田製薬株式会社 文献請求窓口

〒336-8666 さいたま市南区沼影1丁目11番1号

電話 0120-989-813

FAX 048-816-4183

前  
回  
改  
訂  
⇒

製造販売

**高田製薬株式会社**

さいたま市西区宮前町203番地1