

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2013に準拠して作成

<p>HMG-CoA還元酵素阻害剤</p> <p>日本薬局方 ロスバスタチンカルシウム錠</p> <p>ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」</p> <p>ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」</p> <p>Rosuvastatin Tablets 2.5mg「ZERIA」</p> <p>Rosuvastatin Tablets 5mg「ZERIA」</p>
--

剤形	錠剤（フィルムコーティング錠）
製剤の規制区分	処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）
規格・含量	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」： 1錠中に日局ロスバスタチンカルシウム2.60mg（ロスバスタチンとして2.50mg）含有 ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」： 1錠中に日局ロスバスタチンカルシウム5.20mg（ロスバスタチンとして5.00mg）含有
一般名	和名：ロスバスタチンカルシウム（JAN） 洋名：Rosuvastatin Calcium（JAN、INN）
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 発売年月日	製造販売承認年月日：2017年8月15日 薬価基準収載年月日：2017年12月8日 発売年月日：2017年12月8日
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	製造販売元：日本薬品工業株式会社 発売元：ゼリア新薬工業株式会社
医薬情報担当者の 連絡先	
問い合わせ窓口	ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 TEL (03) 3661-0277 FAX (03) 3663-2352 受付時間 9：00～17：50（土日祝日・弊社休業日を除く） 医療関係者向けホームページ https://medical.zeria.co.jp/

本IFは、2022年3月改訂（第8版）の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> にてご確認ください。

IF利用の手引きの概要 —日本病院薬剤師会—

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和63年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、IFと略す）の位置付け並びにIF記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成10年9月に日病薬学術第3小委員会においてIF記載要領の改訂が行われた。

更に10年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成20年9月に日病薬医薬情報委員会においてIF記載要領2008が策定された。

IF記載要領2008では、IFを紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF等の電磁的データとして提供すること（e-IF）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版のe-IFが提供されることとなった。

最新版のe-IFは、（独）医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページ（<https://www.pmda.go.jp/>）から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IFを掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせてe-IFの情報を検討する組織を設置して、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008年より年4回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF記載要領の一部改訂を行いIF記載要領2013として公表する運びとなった。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

[IFの様式]

- ①規格はA4版、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体（図表を除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁にまとめる。

[I F の作成]

- ① I F は原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ② I F に記載する項目及び配列は日病薬が策定した I F 記載要領に準拠する。
- ③ 添付文書の内容を補完するとの I F の主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領2013」（以下、「I F 記載要領2013」と略す）により作成された I F は、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[I F の発行]

- ① 「I F 記載要領2013」は、平成25年10月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ② 上記以外の医薬品については、「I F 記載要領2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合には I F が改訂される。

3. I F の利用にあたって

「I F 記載要領2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体の I F については、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、I F の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や I F 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の MR 等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、I F の利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、I F が改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、I F の使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

I F を薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。I F は日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、I F があくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意して作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。
(2013年4月改訂)

目 次

I. 概要に関する項目	1	VI. 薬効薬理に関する項目	13
1. 開発の経緯	1	1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	13
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	2. 薬理作用	13
II. 名称に関する項目	2	VII. 薬物動態に関する項目	14
1. 販売名	2	1. 血中濃度の推移・測定法	14
2. 一般名	2	2. 薬物速度論的パラメータ	15
3. 構造式又は示性式	2	3. 吸 収	15
4. 分子式及び分子量	2	4. 分 布	16
5. 化学名（命名法）	2	5. 代 謝	16
6. 慣用名、別名、略名、記号番号	2	6. 排 泄	16
7. CAS登録番号	2	7. トランスポーターに関する情報	16
III. 有効成分に関する項目	3	8. 透析等による除去率	16
1. 物理化学的性質	3	VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	17
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3	1. 警告内容とその理由	17
3. 有効成分の確認試験法	3	2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）	17
4. 有効成分の定量法	3	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	17
IV. 製剤に関する項目	4	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	17
1. 剤 形	4	5. 慎重投与内容とその理由	17
2. 製剤の組成	4	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	18
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	4	7. 相互作用	18
4. 製剤の各種条件下における安定性	5	8. 副作用	20
5. 調製法及び溶解後の安定性	6	9. 高齢者への投与	21
6. 他剤との配合変化（物理化学的変化）	6	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	21
7. 溶出性	6	11. 小児等への投与	22
8. 生物学的試験法	10	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	22
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	10	13. 過量投与	22
10. 製剤中の有効成分の定量法	10	14. 適用上の注意	22
11. 力 価	10	15. その他の注意	22
12. 混入する可能性のある夾雑物	10	16. その他	22
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	10	IX. 非臨床試験に関する項目	23
14. その他	10	1. 薬理試験	23
V. 治療に関する項目	11	2. 毒性試験	23
1. 効能又は効果	11		
2. 用法及び用量	11		
3. 臨床成績	11		

X. 管理的事項に関する項目	24
1. 規制区分	24
2. 有効期間又は使用期限	24
3. 貯法・保存条件	24
4. 薬剤取扱い上の注意点	24
5. 承認条件等	24
6. 包装	24
7. 容器の材質	24
8. 同一成分・同効薬	24
9. 国際誕生年月日	25
10. 製造販売承認年月日及び承認番号	25
11. 薬価基準収載年月日	25
12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更 追加等の年月日及びその内容	25
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及び その内容	25
14. 再審査期間	25
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	25
16. 各種コード	25
17. 保険給付上の注意	25
X I. 文 献	26
1. 引用文献	26
2. その他の参考文献	26
X II. 参考資料	27
1. 主な外国での発売状況	27
2. 海外における臨床支援情報	27
X III. 備 考	28
その他の関連資料	28

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

ロスバスタチンカルシウム製剤は、HMG-CoA還元酵素阻害剤であり、本邦では2005年4月に上市されている。


ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」・5mg「ゼリア」は、薬食審査発0229第10号（平成24年2月29日）に基づき規格及び試験方法を設定、生物学的同等性試験、加速試験を実施し、2017年8月に製造販売承認を取得した。

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

1. コレステロール生合成の律速段階となる反応を触媒するHMG-CoA還元酵素を競合的に阻害する¹⁾。

2. 本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないのでいずれも頻度は不明であるが、ロスバスタチンカルシウム製剤の重大な副作用として、横紋筋融解症、ミオパチー、免疫介在性壊死性ミオパチー、肝炎、肝機能障害、黄疸、血小板減少、過敏症状、間質性肺炎、末梢神経障害、多形紅斑が報告されている。

Ⅱ. 名称に関する項目

1. 販売名	
(1) 和名	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」 ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」
(2) 洋名	Rosuvastatin Tablets 2.5mg「ZERIA」 Rosuvastatin Tablets 5mg「ZERIA」
(3) 名称の由来	「一般名」+「剤形」+「含量」+「屋号」より命名した。
2. 一般名	
(1) 和名（命名法）	ロスバスタチンカルシウム（JAN）
(2) 洋名（命名法）	Rosuvastatin Calcium（JAN、INN）
(3) ステム	脂質異常症治療剤、HMG-CoA還元酵素阻害剤；-vastatin
3. 構造式又は示性式	
4. 分子式及び分子量	分子式：(C ₂₂ H ₂₇ FN ₃ O ₆ S) ₂ Ca 分子量：1001.14
5. 化学名（命名法）	Monocalcium bis[(3 <i>R</i> , 5 <i>S</i> , 6 <i>E</i>)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3, 5-dihydroxyhept-6-enoate]（IUPAC）
6. 慣用名、別名、略名、記号番号	該当しない
7. CAS登録番号	147098-20-2（rosuvastatin calcium） 287714-41-4（rosuvastatin）

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色の粉末である。

(2) 溶解性

本品はアセトニトリルに溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、水又はエタノール（99.5）に溶けにくい。

各種pH溶媒に対する溶解性（37℃）

条件（試験液）	溶解度（mg/mL）
pH1.2	0.9
pH3.0	1.2
pH4.0	1.8
pH5.0	3.7
pH6.8	8.8
水	7.7

(3) 吸湿性

吸湿性である。

(4) 融点（分解点）、 沸点、凝固点

該当資料なし

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

該当資料なし

2. 有効成分の各種条件下 における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法

該当資料なし







4. 有効成分の定量法

該当資料なし

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別、 外観及び性状

販売名	外形			性状
	表面	裏面	側面	
ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」				うすい赤みの黄色からくすんだ赤みの黄色のフィルムコーティング錠
直径：5.6mm / 厚さ：3.1mm / 重量：77.5mg				
ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」				うすい赤みの黄色からくすんだ赤みの黄色のフィルムコーティング錠
直径：7.1mm / 厚さ：3.8mm / 重量：154.1mg				

(2) 製剤の物性

該当資料なし

(3) 識別コード

ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」：ZP-2.5R（PTPに記載）

ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」：ZP-5R（PTPに記載）

(4) pH、浸透圧比、粘度、 比重、無菌の旨及び 安定なpH域等

該当しない

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成分）の含量

ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」：

1錠中に日局ロスバスタチンカルシウム2.60mg（ロスバスタチンとして2.50mg）含有する。

ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」：

1錠中に日局ロスバスタチンカルシウム5.20mg（ロスバスタチンとして5.00mg）含有する。

(2) 添加物

乳糖水和物、セルロース、クロスポビドン、乳酸カルシウム水和物、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、トリアセチン、カルナウバロウ、その他2成分

(3) その他

該当しない

3. 懸濁剤、乳剤の分散性 に対する注意

該当しない

IV. 製剤に関する項目

4. 製剤の各種条件下における安定性

加速試験（ $40\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、 $75\pm 5\%\text{RH}$ 、6ヵ月）の結果、ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」[PTP包装及び瓶包装（ポリエチレン瓶（乾燥剤入り））]及びロスバスタチン錠5mg「ゼリア」（PTP包装）は、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された²⁾。

販売名	保存条件	保存形態	保存期間	結果
ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」	$40\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $75\pm 5\%\text{RH}$	PTP包装 (両面アルミニウム)	6ヵ月	変化なし
		ポリエチレン瓶包装 (乾燥剤入り) 瓶: ポリエチレン キャップ: ポリプロピレン		
ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」	$40\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $75\pm 5\%\text{RH}$	PTP包装 (両面アルミニウム)	6ヵ月	変化なし

試験項目〔規格〕:

性状、確認試験、製剤均一性（含量均一性試験）、溶出性、定量法、純度試験 類縁物質、質量試験、錠剤物性（硬度、錠厚及び錠径）

無包装状態における安定性試験を実施した結果、ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」及びロスバスタチン錠5mg「ゼリア」は、温度及び光条件下ではいずれの項目も問題となる変化は認められなかった。一方、湿度条件では硬度の低下（規格内）が認められた³⁾。

販売名	保存条件	保存形態	保存期間	結果
ロスバスタチン錠2.5mg及び5mg「ゼリア」	温度 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$	遮光 気密容器 (ガラス瓶)	3ヵ月	変化なし
	湿度 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $75\pm 5\%\text{RH}$	遮光 開放	3ヵ月	変化なし
	光 120万lx・hr	シャーレ+ ラップ	1000lx 50日	変化なし

試験項目〔規格〕:

性状、純度試験 類縁物質、定量法、製剤物性（硬度）

IV. 製剤に関する項目

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化
(物理化学的变化)

該当資料なし

7. 溶出性⁴⁾

ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」:

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」と標準製剤の溶出挙動の類似性を検討した。


- ・試験方法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法 パドル法による。
回転数（試験液）：50rpm (pH1.2、pH3.0、pH6.8、水)
100rpm (pH1.2)
- ・試験回数：各12ベッセル
- ・判定基準：試験製剤（ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」）が15分以内に平均85%以上溶出する
- ・試験結果：ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」と標準製剤（錠剤、5mg）の溶出挙動の類似性が確認された。

溶出挙動における類似性（平均溶出率の比較）

試験条件			平均溶出率 (%)		判定
回転数	試験液	比較時点 (分)	標準製剤 (錠剤、5mg)	ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」	
50rpm	pH1.2	15	84.7	92.4	適合
	pH3.0		87.0	95.8	適合
	pH6.8		95.1	99.2	適合
	水		91.4	99.6	適合
100rpm	pH1.2		96.7	96.7	適合

(n=12)

平均溶出曲線（各12ベッセル）




IV. 製剤に関する項目

7. 溶出性⁴⁾ (つづき)

ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」:

・試験結果

平均溶出曲線 (各12ベッセル) (つづき)



・溶出挙動

ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」は、日本薬局方医薬品各条に定められたロスバスタチンカルシウム錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」:

「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」を標準製剤とし、ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」と標準製剤の溶出挙動の同等性を検討した。

・試験方法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法 パドル法による。

回転数 (試験液)：50rpm (pH1.2、pH3.0、pH6.8、水)
100rpm (pH1.2)

・試験回数：各12ベッセル

・判定基準：

【平均溶出率による同等性の判定】

試験製剤 (ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」) が15分以内に平均85%以上溶出する

【個々の溶出率による同等性の判定】

平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない

・試験結果：ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」と標準製剤 (ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」) の溶出挙動の同等性が確認された。

IV. 製剤に関する項目

7. 溶出性⁴⁾ (つづき)

ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」:

・試験結果 (つづき)

溶出挙動における同等性 (平均溶出率の比較)

試験条件			平均溶出率 (%)		判定
回転数	試験液	比較時点 (分)	標準製剤 (ロスバスタチン 錠5mg「ゼリア」)	ロスバスタ チン錠2.5mg 「ゼリア」	
50rpm	pH1.2	15	92.4	93.4	適合
	pH3.0		95.8	101.9	適合
	pH6.8		99.2	101.4	適合
	水		99.6	99.0	適合
100rpm	pH1.2		96.7	99.9	適合

(n=12)

ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」の個々の溶出率

(pH1.2/50rpm)

ベッセル	溶出率 (%)	平均溶出率 (%)	溶出率差 (%)	判定
1	93.1	93.4	-0.3	適合
2	92.4		-1.0	
3	95.6		2.2	
4	92.7		-0.7	
5	92.0		-1.4	
6	94.6		1.2	
7	94.3		0.9	
8	94.4		1.0	
9	90.9		-2.5	
10	95.4		2.0	
11	92.9		-0.5	
12	92.6		-0.8	

(pH3.0/50rpm)

ベッセル	溶出率 (%)	平均溶出率 (%)	溶出率差 (%)	判定
1	100.3	101.9	-1.6	適合
2	103.3		1.4	
3	102.8		0.9	
4	101.6		-0.3	
5	102.0		0.1	
6	101.2		-0.7	
7	101.1		-0.8	
8	103.4		1.5	
9	103.0		1.1	
10	101.3		-0.6	
11	99.4		-2.5	
12	103.6		1.7	

(pH6.8/50rpm)

ベッセル	溶出率 (%)	平均溶出率 (%)	溶出率差 (%)	判定
1	100.7	101.4	-0.7	適合
2	102.3		0.9	
3	102.0		0.6	
4	100.1		-1.3	
5	101.6		0.2	
6	101.6		0.2	
7	101.1		-0.3	
8	101.5		0.1	
9	102.2		0.8	
10	100.9		-0.5	
11	101.0		-0.4	
12	101.9		0.5	

IV. 製剤に関する項目

7. 溶出性⁴⁾ (つづき)

ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」:

・試験結果

ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」の個々の溶出率 (つづき)






(水/50rpm)

ベッセル	溶出率 (%)	平均溶出率 (%)	溶出率差 (%)	判定
1	98.9	99.0	-0.1	適合
2	99.0		0.0	
3	99.8		0.8	
4	101.0		2.0	
5	98.3		-0.7	
6	97.1		-1.9	
7	100.3		1.3	
8	98.5		-0.5	
9	99.9		0.9	
10	100.3		1.3	
11	97.8		-1.2	
12	97.1		-1.9	

(pH1.2/100rpm)

ベッセル	溶出率 (%)	平均溶出率 (%)	溶出率差 (%)	判定
1	99.5	99.9	-0.4	適合
2	100.6		0.7	
3	99.9		0.0	
4	100.5		0.6	
5	99.4		-0.5	
6	99.1		-0.8	
7	100.9		1.0	
8	100.5		0.6	
9	102.1		2.2	
10	97.0		-2.9	
11	99.8		-0.1	
12	99.0		-0.9	

平均溶出曲線 (各12ベッセル)



IV. 製剤に関する項目

7. 溶出性 ⁴⁾ (つづき)	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」: ・溶出挙動 ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」は、日本薬局方医薬品各条に定められたロスバスタチンカルシウム錠の溶出規格に適合していることが確認されている。
8. 生物学的試験法	該当しない
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	日本薬局方「ロスバスタチンカルシウム錠」の確認試験法に準拠する。 紫外可視吸光度測定法
10. 製剤中の有効成分の定量法	日本薬局方「ロスバスタチンカルシウム錠」の定量法に準拠する。 液体クロマトグラフィー
11. カ 価	該当しない
12. 混入する可能性のある夾雑物	原薬由来の主な類縁物質：ケト誘導体、ラクトン体
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	該当しない
14. その他	該当資料なし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"><p><効能・効果に関連する使用上の注意></p><p>(1) 適用の前に十分な検査を実施し、高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。</p><p>(2) 家族性高コレステロール血症ホモ接合体については、LDL-アフェレーシス等の非薬物療法の補助として、あるいはそれらの治療法が実施不能な場合に本剤の適用を考慮すること。</p></div>
2. 用法及び用量	通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで増量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない、家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限り、さらに増量できるが、1日最大20mgまでとする。 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"><p><用法・用量に関連する使用上の注意></p><p>(1) クレアチニンクリアランスが30mL/min/1.73m²未満の患者に投与する場合には、2.5mgより投与を開始し、1日最大投与量は5mgとする。（「慎重投与」の項参照）</p><p>(2) 特に20mg投与時においては腎機能に影響があらわれるおそれがある。20mg投与開始後12週までの間は原則、月に1回、それ以降は定期的（半年に1回等）に腎機能検査を行うなど、観察を十分に行うこと。</p></div>
3. 臨床成績	
(1) 臨床データパッケージ	該当資料なし
(2) 臨床効果	該当資料なし
(3) 臨床薬理試験	該当資料なし
(4) 探索的試験	該当資料なし
(5) 検証的試験	該当資料なし
1) 無作為化並行用量反応試験	該当資料なし
2) 比較試験	該当資料なし
3) 安全性試験	該当資料なし
4) 患者・病態別試験	該当資料なし

V. 治療に関する項目

(6) 治療的使用

- | | |
|---|--------|
| 1) 使用成績調査・特定
使用成績調査（特別
調査）・製造販売後臨
床試験（市販後臨床
試験） | 該当資料なし |
| 2) 承認条件として実施
予定の内容又は実施
した試験の概要 | 該当しない |

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	HMG-CoA還元酵素阻害剤 (アトルバスタチンカルシウム、シンバスタチン、ピタバスタチンカルシウム、プラバスタチンナトリウム、フルバスタチンナトリウム)
2. 薬理作用	
(1) 作用部位・作用機序 ¹⁾	コレステロール生合成の律速段階となる反応を触媒するHMG-CoA還元酵素を競合的に阻害する。
(2) 薬効を裏付ける試験成績	該当資料なし
(3) 作用発現時間・持続時間	該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間

VII. 薬物動態に関する項目、「1. 血中濃度の推移・測定法 (3) 臨床試験で確認された血中濃度」の項を参照

(3) 臨床試験で確認された血中濃度⁵⁾


生物学的同等性試験

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に準拠して、標準製剤との比較を行った。

ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」：

ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」と標準製剤（錠剤、5mg）を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（ロスバスタチンとして5mg）健康成人男子24例に、絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

血漿中未変化体濃度推移



薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0→72} (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」	60.958 ±17.007	6.2358 ±2.1834	3.9 ± 1.1	6.85 ± 3.09
標準製剤 (錠剤、5mg)	55.705 ±17.985	5.8899 ±2.4300	4.0 ± 1.0	5.99 ± 2.98

(Mean ± S. D., n=24)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

VII. 薬物動態に関する項目

(3) 臨床試験で確認された血中濃度 ⁵⁾ (つづき)	生物学的同等性試験 (つづき) ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」： ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。
(4) 中毒域	該当資料なし
(5) 食事・併用薬の影響	該当資料なし
(6) 母集団 (ポピュレーション) 解析により判明した薬物体内動態変動要因	該当資料なし
2. 薬物速度論的パラメータ	
(1) 解析方法	該当資料なし
(2) 吸収速度定数	該当資料なし
(3) バイオアベイラビリティ	該当資料なし
(4) 消失速度定数	該当資料なし
(5) クリアランス	該当資料なし
(6) 分布容積	該当資料なし
(7) 血漿蛋白結合率	該当資料なし
3. 吸収	該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

4. 分 布	
(1) 血液－脳関門通過性	該当資料なし
(2) 血液－胎盤関門通過性	該当資料なし
(3) 乳汁への移行性	該当資料なし <参考> (ラット) 乳汁中への移行が報告されている。
(4) 髄液への移行性	該当資料なし
(5) その他の組織への 移行性	該当資料なし
5. 代 謝	
(1) 代謝部位及び 代謝経路	該当資料なし
(2) 代謝に関与する 酵素 (CYP450等) の分子種	該当資料なし
(3) 初回通過効果の有無 及びその割合	該当資料なし
(4) 代謝物の活性の有無 及び比率	該当資料なし
(5) 活性代謝物の速度論 的パラメータ	該当資料なし
6. 排 泄	
(1) 排泄部位及び経路	該当資料なし
(2) 排泄率	該当資料なし
(3) 排泄速度	該当資料なし
7. トランスポーターに 関する情報	本剤は、OATP1B1及びBCRPの基質である。
8. 透析等による除去率	該当資料なし

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由

該当しない

2. 禁忌内容とその理由 (原則禁忌を含む)

禁忌 (次の患者には投与しないこと)

- (1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2) 肝機能が低下していると考えられる以下のような患者
急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸
[これらの患者では、本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。また、本剤は主に肝臓に分布して作用するので、肝障害を悪化させるおそれがある。]
- (3) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳婦 (「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照)
- (4) シクロスポリンを投与中の患者 (「相互作用」の項参照)

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

V. 治療に関する項目、「1. 効能又は効果」の項を参照

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

V. 治療に関する項目、「2. 用法及び用量」の項を参照

5. 慎重投与内容とその理由

慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)

- (1) 腎障害又はその既往歴のある患者
[重度の腎障害のある患者では、本剤の血中濃度が高くなるおそれがある。一般に、HMG-CoA還元酵素阻害剤投与時にみられる横紋筋融解症の多くが腎機能障害を有する患者であり、また、横紋筋融解症に伴って急激な腎機能悪化があらわれることがある。] (「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照)
- (2) アルコール中毒患者、肝障害又はその既往歴のある患者
[本剤は主に肝臓に分布して作用するので、肝障害を悪化させるおそれがある。また、アルコール中毒患者では、横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。] (「禁忌」の項参照)
- (3) フィブラート系薬剤 (ベザフィブラート等)、ニコチン酸、アゾール系抗真菌薬 (イトラコナゾール等)、マクロライド系抗生物質 (エリスロマイシン等) を投与中の患者
[一般にHMG-CoA還元酵素阻害剤との併用で横紋筋融解症があらわれやすい。] (「相互作用」の項参照)
- (4) 甲状腺機能低下症の患者、遺伝性の筋疾患 (筋ジストロフィー等) 又はその家族歴のある患者、薬剤性の筋障害の既往歴のある患者
[横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。]
- (5) 高齢者 (「高齢者への投与」の項参照)

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

重要な基本的注意

- (1) あらかじめ高コレステロール血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法や高血圧、喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクターの軽減等も十分考慮すること。
- (2) 腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブレート系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。
- (3) 投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与を中止すること。
- (4) 近位筋脱力、CK（CPK）高値、炎症を伴わない筋線維の壊死、抗HMG-CoA還元酵素（HMGCR）抗体陽性等を特徴とする免疫介在性壊死性ミオパチーがあらわれ、投与中止後も持続する例が報告されているので、患者の状態を十分に観察すること。なお、免疫抑制剤投与により改善がみられたとの報告例がある。（「重大な副作用」の項参照）
- (5) 投与開始又は増量後12週までの間は原則、月に1回、それ以降は定期的（半年に1回等）に肝機能検査を行うこと。

7. 相互作用

本剤は、OATP1B1及びBCRPの基質である。

(1) 併用禁忌とその理由

併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
シクロスポリン (サンディミュン、ネオーラル等)	シクロスポリンを投与されている心臓移植患者に併用したとき、シクロスポリンの血中濃度に影響はなかったが、ロスバスタチンのAUC _{0-24h} が健康成人に単独で反復投与したときに比べて約7倍上昇したとの報告がある。	シクロスポリンがOATP1B1及びBCRP等の機能を阻害する可能性がある。

(2) 併用注意とその理由

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フィブレート系薬剤 ベザフィブレート等	フェノフィブレートとの併用においては、いずれの薬剤の血中濃度にも影響はみられていない。しかし一般に、HMG-CoA還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	両剤共に横紋筋融解症の報告がある。危険因子：腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者
ニコチン酸	一般に、HMG-CoA還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	危険因子：腎機能障害のある患者
アゾール系抗真菌薬 イトラコナゾール等		
マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン等		

Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

(2) 併用注意とその理由
(つづき)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン	抗凝血作用が増強することがある。本剤を併用する場合は、本剤の投与開始時及び用量変更時にも頻回にプロトロンビン時間国際標準比 (INR) 値等を確認し、必要に応じてワルファリンの用量を調節する等、注意深く投与すること。	機序は不明
制酸剤 水酸化マグネシウム・水酸化アルミニウム	ロスバスタチンの血中濃度が約50%に低下することが報告されている。ロスバスタチン投与後2時間経過後に制酸剤を投与した場合には、ロスバスタチンの血中濃度は非併用時の約80%であった。	機序は不明
ロピナビル・リトナビル アタザナビル/リトナビル ダルナビル/リトナビル グレカプレビル・ピブレンタスビル	ロスバスタチンとロピナビル・リトナビルを併用したときロスバスタチンのAUCが約2倍、Cmaxが約5倍、アタザナビル及びリトナビル両剤とロスバスタチンを併用したときロスバスタチンのAUCが約3倍、Cmaxが7倍、ダルナビル及びリトナビル両剤とロスバスタチンを併用したときロスバスタチンのAUCが約1.5倍、Cmaxが約2.4倍上昇したとの報告がある。 またロスバスタチンとグレカプレビル・ピブレンタスビル ^{注)} を併用したとき、ロスバスタチンのAUCが約2.2倍、Cmaxが約5.6倍上昇したとの報告がある。	左記薬剤がOATP1B1及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。
ダクラタスビル アスナプレビル ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル	ロスバスタチンとダクラタスビル、アスナプレビル、又はダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル ^{注)} を併用したとき、ロスバスタチンの血中濃度が上昇したとの報告がある。	ダクラタスビル、ベクラブビルがOATP1B1、1B3及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。また、アスナプレビルがOATP1B1、1B3の機能を阻害する可能性がある。
グラゾプレビル/ エルバスビル	ロスバスタチンとグラゾプレビル ^{注)} 及びエルバスビルを併用したとき、ロスバスタチンのAUCが約2.3倍、Cmaxが約5.5倍上昇したとの報告がある。	左記薬剤がBCRPの機能を阻害する可能性がある。
ソホスブビル・ベルパタスビル	ロスバスタチンとベルパタスビルを併用したとき、ロスバスタチンのAUCが約2.7倍、Cmaxが約2.6倍上昇したとの報告がある。	ベルパタスビルがOATP1B1、1B3及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。
ダロルタミド	ロスバスタチンとダロルタミドを併用したとき、ロスバスタチンのAUCが5.2倍 ⁶⁾ 、Cmaxが5.0倍上昇したとの報告がある。	ダロルタミドがOATP1B1、1B3及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。
レゴラフェニブ	ロスバスタチンとレゴラフェニブを併用したとき、ロスバスタチンのAUCが3.8倍、Cmaxが4.6倍上昇したとの報告がある。	レゴラフェニブがBCRPの機能を阻害する可能性がある。
カプマチニブ塩酸塩水和物	ロスバスタチンとカプマチニブ塩酸塩水和物を併用したとき、ロスバスタチンのAUCが約2.1倍、Cmaxが約3.0倍上昇したとの報告がある。	カプマチニブ塩酸塩がBCRPの機能を阻害することにより、ロスバスタチンの血中濃度が増加する可能性がある。

Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

(2) 併用注意とその理由 (つづき)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
バダデュスタット	ロスバスタチンとバダデュスタットを併用したとき、ロスバスタチンのAUCが約2.5倍、C _{max} が約2.7倍上昇したとの報告がある。	バダデュスタットがBCRPの機能を阻害することにより、ロスバスタチンの血中濃度が増加する可能性がある。
エルトロンボパグ	ロスバスタチンとエルトロンボパグを併用したとき、ロスバスタチンのAUCが約1.6倍上昇したとの報告がある。	エルトロンボパグがOATP1B1及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。

注) 他社が実施した承認用量外の用量における試験結果に基づく。

8. 副作用

(1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(2) 重大な副作用と 初期症状

重大な副作用 (以下、全て頻度不明)

- 1) **横紋筋融解症**: 筋肉痛、脱力感、CK (CPK) 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれ、急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止すること。
- 2) **ミオパチー**: ミオパチーがあらわれることがあるので、広範な筋肉痛、高度な脱力感や著明なCK (CPK) の上昇があらわれた場合には投与を中止すること。
- 3) **免疫介在性壊死性ミオパチー**: 免疫介在性壊死性ミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 4) **肝炎、肝機能障害、黄疸**: 肝炎、AST (GOT)、ALT (GPT) の上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査等の観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 5) **血小板減少**: 血小板減少があらわれることがあるので、血液検査等の観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 6) **過敏症状**: 血管浮腫を含む過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 7) **間質性肺炎**: 間質性肺炎があらわれることがあるので、長期投与であっても、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 8) **末梢神経障害**: 四肢の感覚鈍麻、しびれ感等の感覚障害、疼痛、あるいは筋力低下等の末梢神経障害があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 9) **多形紅斑**: 多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

(3) その他の副作用

その他の副作用

	頻度不明
皮膚 ^{注1)}	そう痒症、発疹、蕁麻疹
消化器	腹痛、便秘、嘔気、下痢、膵炎、口内炎
筋・骨格系	CK (CPK) 上昇、無力症、筋肉痛、関節痛、筋痙攣
精神神経系	頭痛、浮動性めまい、健忘、睡眠障害 (不眠、悪夢等)、抑うつ
内分泌	女性化乳房
代謝異常	HbA1c上昇、血糖値上昇
肝臓	肝機能異常 [AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇]
腎臓	蛋白尿 ^{注2)} 、腎機能異常 (BUN上昇、血清クレアチニン上昇)

注1) 症状が認められた場合には投与を中止すること。

注2) 通常一過性であるが、原因不明の蛋白尿が持続する場合には減量するなど適切な処置を行うこと。

(4) 項目別副作用発現 頻度及び臨床検査値 異常一覧

該当資料なし

(5) 基礎疾患、合併症、 重症度及び手術の 有無等背景別の 副作用発現頻度

該当資料なし

(6) 薬物アレルギーに対 する注意及び試験法

禁忌 (次の患者には投与しないこと) (抜粋)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

副作用 (1) 重大な副作用 (抜粋)

過敏症状 (頻度不明): 血管浮腫を含む過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

9. 高齢者への投与

高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下していることが多いので、患者の状態を観察しながら投与すること。また、横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。

なお、他社が実施した臨床試験では高齢者と非高齢者においてロスバスタチンの血漿中濃度に明らかな差は認められていない。

10. 妊婦、産婦、授乳婦等 への投与

妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。

[妊娠中の投与に関する安全性は確立していないが、ラットに他のHMG-CoA還元酵素阻害剤を大量投与した場合に胎児の骨格奇形が報告されている。更にヒトでは、他のHMG-CoA還元酵素阻害剤で、妊娠3ヵ月までの間に服用したとき、胎児に先天性奇形があらわれたとの報告がある。]

(2) 授乳中の婦人には投与しないこと。

[ラットで乳汁中への移行が報告されている。]

Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

11. 小児等への投与	小児等への投与 低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない(使用経験が少ない)。
12. 臨床検査結果に及ぼす影響	該当資料なし
13. 過量投与	該当資料なし
14. 適用上の注意	適用上の注意 薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。 [PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]
15. その他の注意	その他の注意 海外において、ロスバスタチンを含むHMG-CoA還元酵素阻害剤投与中の患者では、糖尿病発症のリスクが高かったとの報告がある。
16. その他	該当しない

Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験	
(1) 薬効薬理試験	「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照
(2) 副次的薬理試験	該当資料なし
(3) 安全性薬理試験	該当資料なし
(4) その他の薬理試験	該当資料なし
2. 毒性試験	
(1) 単回投与毒性試験	該当資料なし
(2) 反復投与毒性試験	該当資料なし
(3) 生殖発生毒性試験	該当資料なし
(4) その他の特殊毒性	該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分	製剤（ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」・錠5mg「ゼリア」）： 処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること） 有効成分（ロスバスタチンカルシウム）： 該当しない
2. 有効期間又は使用期限	使用期限：3年（安定性試験結果に基づく） 包装に表示の使用期限内に使用すること
3. 貯法・保存条件	室温保存 開封後は湿気を避けて保存すること
4. 薬剤取扱い上の注意点	
(1) 薬局での取り扱い上の留意点について	該当しない
(2) 薬剤交付時の取扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）	VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目、「14. 適用上の注意」の項を参照
(3) 調剤時の留意点について	該当しない
5. 承認条件等	該当しない
6. 包装	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」： PTP 100錠（10錠×10） 瓶 500錠 ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」： PTP 100錠（10錠×10）
7. 容器の材質	PTP包装： アルミニウム（両面） 瓶包装： 瓶 ; ポリエチレン キャップ ; ポリプロピレン 乾燥剤 ; シリカゲル
8. 同一成分・同効薬	同一成分薬： クレストール錠2.5mg・錠5mg・OD錠2.5mg・OD錠5mg （製造販売元：アストラゼネカ株式会社、発売元：塩野義製薬株式会社） 同効薬： アトルバスタチンカルシウム、シンバスタチン、ピタバスタチンカルシウム、プラバスタチンナトリウム、フルバスタチンナトリウム

X. 管理的事項に関する項目

9. 国際誕生年月日
ロスバスタチンカルシウム製剤：2002年11月6日（オランダ）
10. 製造販売承認年月日
及び承認番号
製造販売承認年月日：
2017年8月15日
承認番号：
ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」：22900AMX00673000
ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」：22900AMX00674000
11. 薬価基準収載年月日
2017年12月8日
12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容
効能・効果の追加に係る一部変更承認：2019年9月18日
家族性高コレステロール血症
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容
該当しない
14. 再審査期間
該当しない
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報
本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。
16. 各種コード
薬価基準収載
- | 販売名 | 包装 | HOT（13桁）番号 | 厚生労働省薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|
| ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」 | PTP 100錠（10錠×10） | 1257281010101 | 2189017F1189 | 622572801 |
| | 瓶 500錠 | 1257281010201 | | |
| ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」 | PTP 100錠（10錠×10） | 1257298010101 | 2189017F2185 | 622572901 |
17. 保険給付上の注意
本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

X I . 文 献

1. 引用文献

- 1) 高折修二ほか監訳：グッドマン・ギルマン薬理書，第12版，135，廣川書店，東京，2013
- 2) 日本薬品工業株式会社：安定性に関する資料（社内資料）
- 3) 日本薬品工業株式会社：無包装状態における安定性に関する資料（社内資料）
- 4) 日本薬品工業株式会社：溶出に関する資料（社内資料）
- 5) 日本薬品工業株式会社：生物学的同等性に関する資料（社内資料）
- 6) Zurth, C., et al.: Eur J Drug Metab Pharmacokinet., 44,747, 2019

2. その他の参考文献

該当資料なし

X II. 参考資料

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. 主な外国での発売状況 | 該当しない |
| 2. 海外における臨床支援
情報 | 該当資料なし |

XⅢ. 備 考

その他の関連資料

該当資料なし

