

日本薬局方

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

# 注射用蒸留水

DISTILLED WATER FOR INJECTION

貯 法 : 室温保存  
使用期限 : ラベル及び外箱に表示  
注) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

許可番号	14A1X00002
薬価収載	薬価基準収載
販売開始	1961年1月

## \*【組成・性状】

### \*1. 組成

本剤は、1管中に注射用蒸留水を5mL含有する。

### 2. 製剤の性状

本剤は無色澄明の水性注射液で、浸透圧比、比重は次のとおりである。

浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	0
比重 $d_{20}^{20}$	1.000

## \*\*【主要文献及び文献請求先】

### \*\*<主要文献>

1) ネオクリティケア製薬社内資料 : 安定性試験 (2020)

### \*\*<文献請求先>

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。  
ネオクリティケア製薬株式会社 学術情報フリーダイヤル  
〒112-0006 東京都文京区小日向4-2-8  
TEL 0120-265-321  
FAX 03-5840-5145

## 【効能又は効果】

注射剤の溶解希釈剤、注射剤の製剤。

## 【用法及び用量】

本品の適当量を取り、注射剤の溶解、希釈に用いる。  
また、注射剤の製剤に用いる。

## 【使用上の注意】

### 適用上の注意

- (1) **調製時** : 注射剤の溶解・希釈液として使用する場合は、注射用蒸留水が適切であることを確認すること。
- (2) **投与前** :
  - 1) 投与に際しては、感染に対する配慮をすること (患者の皮膚や器具消毒)。
  - 2) 開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。
- (3) **投与时** : 溶解・希釈した注射剤の用法・用量及び使用上の注意に留意して投与すること。

## \*【取扱い上の注意】

### \* 安定性試験

最終包装製品を用いた長期保存試験 (室温、3年) の結果、外観等は規格の範囲内であり、注射用蒸留水は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。<sup>1)</sup>

## \*【包装】

5mL×50管

\*\* **ネオクリティケア製薬株式会社**  
神奈川県厚木市旭町四丁目18番29号