

貯 法：気密容器、火気を避けて保存  
使用期限：容器底部に記載

日本標準商品分類番号  
872615


承認番号	21700AMX00055000
薬価収載	2005年12月
販売開始	1984年1月

## 外用殺菌消毒剤

# 消毒用イソプロパノール液50%「ヤクハン」 Isopropanol for Disinfection 50% "YAKUHAN"

**【禁忌】**（次の部位には使用しないこと）  
損傷皮膚及び粘膜〔刺激作用がある。〕

構造式：



### 【組成・性状】

- 組成  
本品は20℃でイソプロパノール（C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O）47.1～53.1vol%を含む。
- 性状  
本品は無色澄明の液で、特異なおいがある。

### 【取扱い上の注意】

#### 安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度75%、6ヵ月）の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

### 【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	手指・皮膚の消毒 医療機器の消毒
用法・用量	通常イソプロパノールとして、50vol%液を用いる。

### 【包 装】

500mL、5L、18L

### \*【文献請求先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター  
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21  
フリーダイヤル (0120) 517-215  
Fax (076) 442-8948

### 【使用上の注意】

- 重要な基本的注意  
(1)眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には、直ちに  
よく水洗すること。  
(2)広範囲又は長期間使用する場合、蒸気の吸入に注意すること。  
〔イソプロパノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた  
場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。〕
- 副作用  
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施  
していない。

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹等
皮膚 <sup>注)</sup>	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

- 臨床検査結果に及ぼす影響  
注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの  
判断を妨害することがある。
- 適用上の注意  
(1)投与経路  
外用にのみ使用すること。  
(2)使用時  
1)同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による  
皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。  
2)本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透  
しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に  
用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。  
3)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カ  
テーテル等には、変質するものがあるので、このような器具  
は長時間浸漬しないこと。  
4)引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。

### 【薬効薬理】

殺菌消毒作用

### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：イソプロパノール（Isopropanol）  
化学名：Propan-2-ol  
分子式：C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O  
分子量：60.10

\*  販売元  
**日医工株式会社**  
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元

**ヤクハン製薬株式会社**  
北海道北広島市北の里27番地