

**2012年4月 第6版
製造販売業者の住所変更に伴う改訂

日本標準商品分類番号 872615

承認番号 16000AMZ04494000

薬価収載 1950.10

販売開始 1949.8

再評価結果公表 1982.8

*2008年5月 第5版 改訂

外皮用殺菌消毒剤

日本薬局方

消毒用エタノール

(消毒用アルコール)

<貯法>

保存条件：遮光して、火気を避けて保存する。

容器：気密容器

*販売名 消毒用エタノール「コザカイ・M」

Ethanol for Disinfection

【禁忌】 (次の部位には使用しないこと。)

損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有するので]

*【組成・性状】

本品は15℃でエタノール (C₂H₆O :46.07) 76.9
～81.4 vol %を含む (比重による)。

本品は無色澄明の液である。

本品は水と混和する。本品は点火するとき、淡青色
の炎をあげて燃える。本品は揮発性である。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位 (手術野) の皮膚の消毒、
医療機器の消毒

【用法・用量】

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確
となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合は使用を
中止すること。

2. 適用上の注意

1) 人体

- ア、原液又は濃厚液は刺激作用があるので経口
投与しないこと。
- イ、眼に入らないように注意すること。入った
場合には水でよく洗い流すこと。
- ウ、広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気
の吸入に注意すること。
- エ、同一部位に反復使用した場合には、脱脂等
による皮膚荒れを起こすことがあるので注
意すること。

2) その他

本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部
にまで浸透しないことがあるので、これらが付
着している医療機器等に用いる場合には、十分
に洗い落してから使用すること。

3. その他の注意

承認外の経皮的エタノール注入療法 (P E I T)
使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の
局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、
肝梗塞、肝不全等が報告されている。

【薬効薬理】

本剤は、使用濃度において栄養型細菌 (グラム陽
性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有
効であるが、芽胞 (炭疽菌、破傷風菌等) 及び一
部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

- (1) 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合に
は、腐蝕を防止するために0.2～1.0%の亜硝
酸ナトリウムを添加すること。
- (2) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、
塗装カテーテル等には、変質するものがある
ので、このような器具は長時間浸漬しないこ
と。
- (3) 本液はニス溶于すので、ニスの塗ってある
建具や家具等には本液が付着しないように注
意すること。

火気厳禁 アルコール類 危険等級Ⅱ 水溶性

製造販売元

小堺製薬株式会社

**東京都墨田区両国 4-36-9

電話番号 03(3631)1495

