

逆性石ケン液0.01 「ヨシダ」

500mL

開封日

年 月 日

販売

外用殺菌消毒剤

2015年1月改訂(第4版)

滅菌製剤

逆性石ケン液0.01 「ヨシダ」

0.01% Benzalkonium Chloride Solution
日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

調剤

01049872881850117

500mL

0.01%

製造番号
使用期限



キャップ:PP
ボトル:PP
ラベル:PS

ゴム:ゴム栓

202006

逆性石ケン液0.01 「ヨシダ」

500mL

外用殺菌消毒剤

500mL

日本標準商品分類番号
872616

承認番号
21000AMZ00151000
貯蔵:室温保存
販売開始:1998年7月
再評価結果:1982年8月

【組成・性状】

- 1.組成
ベンザルコニウム塩化物0.01%v/v%
- 2.製剤の性状
本剤は無色～淡黄色澄明の液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】 【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
手術部位(手術野)の粘膜の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
感染皮膚面の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
結膜囊の洗浄・消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。

【使用上の注意】

- 1.副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

過敏症 注) 発疹、瘙痒感等の過敏症状(頻度不明)

注)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

2.適用上の注意

- (1) 人体
 - 1) 投与経路: 経口投与しないこと。浣腸には使用しないこと。
 - 2) 使用時:
 - ア. 皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。
 - イ. 粘膜・創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋脱力を起こすおそれがある)。
 - ウ. 密封包帯、ギフス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。

0.01% Benzalkonium Chloride Solution
日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

(2) その他

- 1) 調製方法
織維、布(綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等)は本剤の成分であるベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下となるないように注意すること。

2) 使用時

- ア. 血清、體汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。
- イ. 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。
- ウ. 皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。

【薬効基準】

本剤はグラム陽性菌、陰性菌及び真菌には有効であるが、核糖及び大部分のウイルスに対する効果は期待できない。

【取扱上の注意】

本剤は滅菌製剤なので、開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央5-1-10



製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951