

逆性石ケン液0.2 「ヨシダ」

500mL

開封日

年 月 日

工.密封包帯、ギフス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。

(2) その他

1) 調製方法
繊維、布（綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等）は本剤の成分であるベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。

2) 使用時

ア.血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。
イ.石けん類は本剤の殺菌作用を减弱させるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。
ウ.皮革消毒液を使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液中に浸すこと。

3) 器具等材質
ア.合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カーテール等への使用は避けることが望ましい。

イ.金属器具を長時間浸漬する必要がある場合は、腐食を防止するためにベンザルコニウム塩化物0.1%溶液に0.5~1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

ウ.皮革製品の消毒に使用すると変質させることがあるので、使用しないこと。

【薬効薬理】
本剤はグラム陽性菌、陰性菌及び真菌には有効であるが、結核菌及び大部分のウイルスに対する効果は期待できない。

【取扱上の注意】

本剤は滅菌剤なので、開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央5-1-10

販売

外用殺菌消毒剤

2015年1月改訂(第3版)

滅菌剤

逆性石ケン液0.2 「ヨシダ」

0.2% Benzalkonium Chloride Solution
日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

調剤

500mL

0.2%

00104987288189015

製造番号
使用期限

キャップ:PP
ボトル:PP
ラベル:PS
ゴム:ゴム栓

202007

逆性石ケン液0.2 「ヨシダ」

500mL

外用殺菌消毒剤

500mL

日本標準商品分類番号
872616

承認番号
21000AMZ00852000

貯蔵状況
室温保存

貯蔵状況
1998年12月

販売開始
1999年 1月

貯蔵状況
再評価結果
1982年 8月

【組成・性状】

- 1.組成
ベンザルコニウム塩化物0.2%w/v%
- 2.製剤の性状
本剤は無色~淡黄色澄明の液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落とした後、ベンザルコニウム塩化物0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗いの場合には、5~10分間ブランシングする。
手術部位(手術野)の皮膚の消毒	手術前局所皮膚面をベンザルコニウム塩化物0.1%溶液で約5分間洗い、その後ベンザルコニウム塩化物0.2%溶液を塗布する。
手術部位(手術野)の粘膜の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01~0.025%溶液を用いる。
皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	皮膚・粘膜の創傷部位の消毒
感染皮膚面の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
医療機器の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.1%溶液を用いる。
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	ベンザルコニウム塩化物0.05~0.2%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。
腔洗浄	ベンザルコニウム塩化物0.02~0.05%溶液を用いる。
結膜炎の洗浄・消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01~0.05%溶液を用いる。

滅菌剤

逆性石ケン液0.2 「ヨシダ」

0.2% Benzalkonium Chloride Solution
日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
1) 本剤は濃度に注意して使用すること。
2) 灰症人は易感性の部位(粘膜、陰股部等)に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
- 3) 本剤を希釈して使用する場合は、精製水を使用して調製後滅菌処理すること。

2.副作用

- 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

過敏症 注) 発疹、蕁瘡感等の過敏症状(頻度不明)

- 3.臨床検査結果に及ぼす影響
本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

4.適用上の注意

- (1) 1) 投与経路:経口投与しないこと。浣腸には使用しないこと。
2) 使用時
ア.原液が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
イ.皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。
ウ.粘膜・創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋脱力を起こすそれがある)。



製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951