

日本薬局方 酸化亜鉛

※酸化亜鉛「VTRS」原末

Zinc Oxide Powder

承認番号	23100AMX00088
薬価収載	2022年4月
販売開始	1951年7月
再評価結果	1979年2月

貯法：気密容器、室温保存
使用期限：最終年月を外箱等に記載

【禁忌（次の部位には使用しないこと）】

1. 重度または広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。〕
2. 患部が湿潤している場合〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。〕

【組成・性状】

1. 組成

1g中：

販売名	酸化亜鉛「VTRS」原末
成分	
有効成分	日局 酸化亜鉛 1g

2. 性状

本剤は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

【効能・効果】

軽度の皮膚病変の収れん・消炎・保護・緩和な防腐

【用法・用量】

外用散剤（散布剤）として15～100%

軟膏剤・液剤（懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等）として2～60%

上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ1日1～数回患部に適用する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注：このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

使用部位

- (1)誤って吸入させないように注意させること。
- (2)眼には使用しないこと。

【薬効薬理】

局所の収れん、分泌物の減少、痂皮の軟化、上皮の形成などの作用を有する。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：酸化亜鉛（Zinc Oxide）

分子式：ZnO

分子量：81.38

性状：白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

水、エタノール（95）、酢酸（100）又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【包装】

酸化亜鉛「VTRS」原末：500g

※【文献請求先】

ヴィアトリス製薬株式会社 メディカルインフォメーション部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
フリーダイヤル 0120-419-043

※【製造販売元】

マイランEPD合同会社
東京都港区虎ノ門5丁目11番2号

※【販売元】

ヴィアトリス製薬株式会社
東京都港区虎ノ門5丁目11番2号