

※※2021年7月改訂(第6版)
※2017年11月改訂

持続性Ca拮抗剤

処方箋医薬品^(注)

日本薬局方

日本標準商品分類番号

872149

貯法：室温保存、遮光保存、気密容器
使用期限：外箱に表示の使用期限内に
使用すること。
注意：取扱い上の注意の項参照。

アゼルニジピン錠

アゼルニジピン錠8mg「YD」

アゼルニジピン錠16mg「YD」

AZELNIDIPINE TABLETS

	錠8mg	錠16mg
承認番号	22500AMX00312	22500AMX00313
薬価収載	2013年6月	2013年6月
販売開始	2013年6月	2013年6月

注)注意－医師等の処方箋により使用する
こと

[禁忌] (次の患者には投与しないこと)

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人(「妊婦、
産婦、授乳婦等への投与」の項参照)

(2) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

※※(3) アゾール系抗真菌剤(外用剤を除く)(イトラコナ
ゾール、ミコナゾール、フルコナゾール、ホスフル
コナゾール、ボリコナゾール)、HIVプロテアーゼ
阻害剤(リトナビル含有製剤、ネルフィナビル、ア
タザナビル、ホスアンプレナビル、ダルナビル含有
製剤)、コピシタット含有製剤を投与中の患者
(「相互作用」の項参照)

[組成・性状]

1. 組成

アゼルニジピン錠8mg「YD」

1錠中、アゼルニジピン8mgを含有する。

添加物として、セルロース、ヒドロキシプロピルセル
ロース、無水ケイ酸、ポリソルベート80、メグルミン、カ
ルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有する。

アゼルニジピン錠16mg「YD」

1錠中、アゼルニジピン16mgを含有する。

添加物として、セルロース、ヒドロキシプロピルセル
ロース、無水ケイ酸、ポリソルベート80、メグルミン、カ
ルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有する。

2. 性状

アゼルニジピン錠8mg「YD」

淡黄白色の割線入りの素錠である。

アゼルニジピン錠16mg「YD」

淡黄白色の割線入りの素錠である。

	外形			直径 (mm)	厚さ (mm)	重量 (mg)	識別 コード (PTP)
	表	裏	側面				
アゼルニジ ピン錠8mg 「YD」				約7.1	約3.3	140	YD 174
アゼルニジ ピン錠16mg 「YD」				約9.1	約4.1	280	YD 175

[効能・効果]

高血圧症

[用法・用量]

通常、成人にはアゼルニジピンとして8～16mgを1日1回朝
食後経口投与する。なお、1回8mgあるいは更に低用量から
投与を開始し、症状により適宜増減するが、1日最大16mgま
でとする。

[使用上の注意]

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

(1) 重篤な肝・腎機能障害のある患者

[本剤は肝臓で代謝される。また一般に重篤な腎機能障
害のある患者では、降圧に伴い腎機能が低下する可能性
がある。]

(2) 高齢者(「高齢者への投与」の項参照)

2. 重要な基本的注意

(1) カルシウム拮抗剤の投与を急に中止したとき、症状が悪
化した症例が報告されているので、本剤の休薬を要する
場合は徐々に減量し、観察を十分に行うこと。また、患者
に医師の指示なしに服薬を中止しないように注意する
こと。

(2) 本剤の投与により、まれに過度の血圧低下を起こすおそ
れがあるので、そのような場合には減量又は休薬するな
ど適切な処置を行うこと。

(3) 降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるの
で、高所作業、自動車の運転等、危険を伴う機械を操作す
る際には注意させること。

3. 相互作用

本剤は、主としてチトクロームP450 3A4(CYP3A4)で
代謝される。

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アゾール系抗真菌剤 (外用剤を除く) イトラコナゾール (イトリゾール) ミコナゾール(フ ロリド) フルコナゾール (ジフルカン) ホスフルコナゾー ル(プロジフ) ボリコナゾール (ブイフェンド)	イトラコナゾールと の併用により本剤の AUCが2.8倍に上昇 することが報告され ている。	これらの薬剤が CYP3A4を阻害し、 本剤のクリアランス が低下すると考えら れる。

※※

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
HIVプロテアーゼ阻害剤 リトナビル含有製剤(ノービア、カレトラ) ネルフィナビル(ピラセプト) アタザナビル(レイアタツ) ホスアンプレナビル(レクシヴァ) ダルナビル含有製剤(プリジスタ、プレジコピックス) コビススタット含有製剤 スタリビルド ゲンボイヤ プレジコピックス	併用により本剤の作用が増強されるおそれがある。	これらの薬剤がCYP3A4を阻害し、本剤のクリアランスが低下すると考えられる。

(2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他の降圧剤	過度の降圧が起こるおそれがある。必要があれば他の降圧剤あるいは本剤を減量すること。	作用メカニズムの異なる降圧剤の併用により薬理作用が増強される。
ジゴキシン	併用によりジゴキシンのCmaxが1.5倍、AUCが1.3倍に上昇することが報告されている。必要があればジゴキシンを減量すること。	ジゴキシンの腎排泄(尿細管分泌)及び腎外からの排泄を阻害するためと考えられる。
シメチジン イマチニブメシル酸塩 マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン クラリスロマイシン等	併用により本剤の作用が増強されるおそれがある。必要があれば本剤を減量あるいはこれらの薬剤の投与を中止すること。	これらの薬剤がCYP3A4を阻害し、本剤のクリアランスが低下すると考えられる。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
シンバスタチン	併用によりシンバスタチンのAUCが2.0倍に上昇することが報告されている。必要があれば本剤又はシンバスタチンの投与を中止すること。	これらの薬剤がCYP3A4を競合的に阻害することにより、相互のクリアランスが低下すると考えられる。腎機能障害のある患者は特に注意すること。
シクロスポリン	併用により本剤又はこれらの薬剤の作用が増強されるおそれがある。必要があれば本剤又はこれらの薬剤を減量すること。	これらの薬剤がCYP3A4を競合的に阻害することにより、相互のクリアランスが低下すると考えられる。
ベンゾジアゼピン系薬剤 ジアゼパム ミダゾラム トリアゾラム等 経口黄体・卵胞ホルモン 経口避妊薬等		
タンドスピロнокエン酸塩	併用により本剤の作用が増強されるおそれがある。必要があれば本剤を減量あるいはタンドスピロнокエン酸塩の投与を中止すること。	セロトニン受容体を介した中枢性の血圧降下作用が降圧作用を増強する。
リファンピシン フェニトイン フェノバルビタール	併用により本剤の作用が減弱されるおそれがある。	これらの薬剤の代謝酵素誘導作用により、本剤のクリアランスが上昇すると考えられる。
グレープフルーツジュース	本剤の血中濃度が上昇することが報告されている。降圧作用が増強されるおそれがあることから、本剤の服用中はグレープフルーツジュースを飲用しないよう注意すること。	グレープフルーツジュースに含まれる成分がCYP3A4による本剤の代謝を阻害し、クリアランスを低下させるためと考えられる。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用

1) 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)

AST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GTPの上昇等の肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2) 房室ブロック、洞停止、徐脈(いずれも頻度不明)

房室ブロック、洞停止、徐脈があらわれることがあるので、めまい、ふらつき等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

下記の副作用があらわれることがあるので、異常が認められた場合には必要に応じ投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症 ^(注1)	発疹、そう痒、血管浮腫
精神神経系	頭痛・頭重感、ふらつき、めまい、立ちくらみ、眠気

	頻度不明
消化器	胃部不快感、悪心、便秘、腹痛、下痢、歯肉肥厚、口内炎
循環器	動悸、ほてり、顔面潮紅
血液	好酸球増多
肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、LDH上昇、 γ-GTP上昇、肝機能異常、ALP上昇、総ビリルビン上昇
泌尿器	BUN上昇、クレアチニン上昇、尿硝子円柱増加、頻尿
その他	尿酸上昇、総コレステロール上昇、CK(CPK)上昇、カリウム上昇、倦怠感、異常感(浮遊感、気分不良等)、カリウム低下、浮腫、しびれ、乳び腹水 ^{注2)}

注1)投与を中止すること。また、頻度では光線過敏症が報告されている。
注2)低アルブミン血症の患者で起こりやすい。

5. 高齢者への投与

高齢者に使用する場合は、8mgあるいは更に低用量から投与を開始し、経過を十分に観察しながら慎重に投与することが望ましい。

[一般に高齢者では、過度の降圧は好ましくないとされている(脳梗塞が起こるおそれがある)。]

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。

[動物実験(ラット)で妊娠前～初期の投与において着床前及び着床後胎死亡率の増加、出生児の体重低下、妊娠期間及び分娩時間の延長が認められている。また、妊娠末期の投与において妊娠期間及び分娩時間の延長が認められている。]

(2)授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は授乳を中止させること。

[動物実験(ラット)で乳汁中へ移行することが報告されている。]

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

8. 適用上の注意

薬剤交付時

P T P包装の薬剤はP T Pシートから取り出して服用するよう指導すること。(P T Pシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている)

9. その他の注意

(1)因果関係は明らかではないが、本剤による治療中に心筋梗塞、心不全や不整脈(心房細動等)がみられたとの報告がある。

(2)CAPD(持続的外来腹膜透析)施行中の患者の透析排液が白濁することが報告されているので、腹膜炎等との鑑別に留意すること。

[薬物動態]


アゼルニジピン錠8mg[YD]

(1)生物学的同等性試験

アゼルニジピン錠8mg[YD]と標準製剤をクロスオーバー法によりそれぞれ1錠(アゼルニジピンとして8mg)、健康成人男子18名に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。¹⁾

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₄₈ (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
アゼルニジピン錠8mg[YD]	40.94±12.25	5.52±2.46	2.7±0.7	9.8±2.5
標準製剤(錠剤、8mg)	37.56±11.17	4.85±1.79	2.8±0.6	9.9±3.5

(平均値±標準偏差、n=18)



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(2)溶出挙動

アゼルニジピン錠8mg[YD]は、日本薬局方医薬品各条に定められたアゼルニジピン錠の溶出規格に適合していることが確認されている。


アゼルニジピン錠16mg[YD]

(1)生物学的同等性試験

アゼルニジピン錠16mg[YD]と標準製剤をクロスオーバー法によりそれぞれ1錠(アゼルニジピンとして16mg)、健康成人男子20名に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。²⁾

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₄₈ (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
アゼルニジピン錠16mg[YD]	91.34±24.39	11.51±4.65	3.2±0.9	10.4±2.7
標準製剤(錠剤、16mg)	84.42±22.29	10.20±4.16	3.1±0.6	10.9±3.2

(平均値±標準偏差、n=20)



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(2) 溶出挙動

アゼルニジピン錠16mg[YD]は、日本薬局方医薬品各条に定められたアゼルニジピン錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

[有効成分に関する理化学的知見]

一般名：アゼルニジピン (Azelnidipine)


化学名：3-[1-(Diphenylmethyl)azetidion-3-yl]

5-(1-methylethyl) (4*RS*)-2-amino-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

分子式：C₃₃H₃₄N₄O₆

分子量：582.65

構造式：



性状：淡黄色～黄色の結晶性の粉末又は塊を含む粉末である。

エタノール(99.5)又は酢酸(100)に溶けやすく、水にほとんど溶けない。

エタノール(99.5)溶液(1→100)は旋光性を示さない。

[取扱い上の注意]

アゼルニジピン錠8mg[YD]

(1) 保管方法

本剤は光により着色するので開封後も遮光して保存して下さい。

(2) 安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヶ月)の結果、アゼルニジピン錠8mg[YD]は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。³⁾

アゼルニジピン錠16mg[YD]

(1) 保管方法

本剤は光により着色するので開封後も遮光して保存して下さい。

(2) 安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヶ月)の結果、アゼルニジピン錠16mg[YD]は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。⁴⁾

[包装]

アゼルニジピン錠8mg[YD]

PTP：100錠

アゼルニジピン錠16mg[YD]

PTP：100錠、500錠

[主要文献]

- 1) (株)陽進堂社内資料：生物学的同等性試験
- 2) (株)陽進堂社内資料：生物学的同等性試験
- 3) (株)陽進堂社内資料：安定性試験
- 4) (株)陽進堂社内資料：安定性試験

※[文献請求先]

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

株式会社 陽進堂 お客様相談室
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号
☎ 0120-647-734

製造販売元

 株式会社 陽進堂
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号