

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2013 に準拠して作成

アレルギー性疾患治療剤

日本薬局方 オロパタジン塩酸塩錠

オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」

オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Tablets “KYORIN”

剤 形	フィルムコーティング錠
製 剤 の 規 制 区 分	該当しない
規 格 ・ 含 量	オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」： 1錠中、日局オロパタジン塩酸塩 2.5mg 含有 オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」： 1錠中、日局オロパタジン塩酸塩 5mg 含有
一 般 名	和名：オロパタジン塩酸塩 (JAN) 洋名：Olopatadine Hydrochloride (JAN)
製 造 販 売 承 認 年 月 日 薬 価 基 準 収 載 ・ 発 売 年 月 日	製造販売承認年月日：2012年 8月 15日 薬価基準収載年月日：2012年12月 14日 発 売 年 月 日：2012年12月 14日
開 発 ・ 製 造 販 売 (輸 入) ・ 提 携 ・ 販 売 会 社 名	製造販売元：キョーリンリメディオ株式会社 販 売 元：杏林製薬株式会社
医 薬 情 報 担 当 者 の 連 絡 先	
問 い 合 わ せ 窓 口	キョーリンリメディオ株式会社 学術部 TEL：0120-960189 FAX：0120-189099 受付時間：8時～22時（日、祝日、その他当社の休業日を除く） 医療関係者向けホームページ https://med.kyorin-rmd.com/

本 IF は 2020 年 9 月 改 訂 の 添 付 文 書 の 記 載 に 基 づ き 改 訂 し た。

最新 の 添 付 文 書 情 報 は、独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ <https://www.pmda.go.jp/> に て ご 確 認 下 さ い。

I F 利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、I F と略す）の位置付け並びに I F 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において I F 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において新たな I F 記載要領 2008 が策定された。

I F 記載要領 2008 では、I F を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること（e-I F）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-I F が提供されることとなった。

最新版の e-I F は、（独）医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-I F を掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-I F の情報を検討する組織を設置して、個々の I F が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、I F 記載要領の一部改訂を行い I F 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

2. I F とは

I F は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は I F の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された I F は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

【I F の様式】

- ①規格は A 4 判、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤字・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ② I F 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「I F 利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2 頁にまとめる。

【 I F の作成】

- ① I F は原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ② I F に記載する項目及び配列は日病薬が策定した I F 記載要領に準拠する。
- ③ 添付文書の内容を補完するとの I F の主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「 I F 記載要領 2013」と略す）により作成された I F は、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（ P D F ）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

【 I F の発行】

- ① 「 I F 記載要領 2013」は、平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ② 上記以外の医薬品については、「 I F 記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合には I F が改訂される。

3. I F の利用にあたって

「 I F 記載要領 2013」においては、 P D F ファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体の I F については、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、 I F の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や I F 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の M R 等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、 I F の利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、 I F が改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、 I F の使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

I F を薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。 I F は日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、 I F があくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013 年 4 月改訂)

目 次


I. 概要に関する項目	1	2. 薬物速度論的パラメータ	16
1. 開発の経緯	1	3. 吸収	17
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	4. 分布	17
II. 名称に関する項目	2	5. 代謝	17
1. 販売名	2	6. 排泄	18
2. 一般名	2	7. トランスポーターに関する情報	18
3. 構造式又は示性式	2	8. 透析等による除去率	18
4. 分子式及び分子量	2	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	19
5. 化学名(命名法)	2	1. 警告内容とその理由	19
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2	2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)	19
7. CAS登録番号	2	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	19
III. 有効成分に関する項目	3	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	19
1. 物理化学的性質	3	5. 慎重投与内容とその理由	19
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	19
3. 有効成分の確認試験法	3	7. 相互作用	19
4. 有効成分の定量法	3	8. 副作用	20
IV. 製剤に関する項目	4	9. 高齢者への投与	21
1. 剤形	4	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	21
2. 製剤の組成	4	11. 小児等への投与	21
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	4	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	21
4. 製剤の各種条件下における安定性 ^{2)~4)}	5	13. 過量投与	21
5. 調製法及び溶解後の安定性	7	14. 適用上の注意	21
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	7	15. その他の注意	22
7. 溶出性 ⁵⁾	7	16. その他	22
8. 生物学的試験法	10	IX. 非臨床試験に関する項目	23
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	10	1. 薬理試験	23
10. 製剤中の有効成分の定量法	11	2. 毒性試験	23
11. 力価	11	X. 管理的事項に関する項目	24
12. 混入する可能性のある夾雑物	11	1. 規制区分	24
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	11	2. 有効期間又は使用期限	24
14. その他	11	3. 貯法・保存条件	24
V. 治療に関する項目	12	4. 薬剤取扱い上の注意点	24
1. 効能又は効果	12	5. 承認条件等	24
2. 用法及び用量	12	6. 包装	24
3. 臨床成績	12	7. 容器の材質	24
VI. 薬効薬理に関する項目	14	8. 同一成分・同効薬	25
1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	14	9. 国際誕生年月日	25
2. 薬理作用	14	10. 製造販売承認年月日及び承認番号	25
VII. 薬物動態に関する項目	15	11. 薬価基準収載年月日	25
1. 血中濃度の推移・測定法	15	12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	25
		13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	25

14. 再審査期間	25
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	25
16. 各種コード	26
17. 保険給付上の注意	26
XI. 文献	27
1. 引用文献	27
2. その他の参考文献	27
XII. 参考資料	28
1. 主な外国での発売状況	28
2. 海外における臨床支援情報	28
XIII. 備考	29
1. その他の関連資料	29

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯	オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」及びオロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」は、後発医薬品として薬食発第 0331015 号(平成 17 年 3 月 31 日)に基づき、規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を行い承認申請し、2012 年 8 月に承認を取得、2012 年 12 月に発売に至った。
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1) アレルギー症の抑制作用を持つ第二世代抗ヒスタミン薬の一つで、ヒスタミン H ₁ 受容体拮抗を主作用とし、肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制作用を併せ持ち、国内で開発されたアレルギー性疾患治療薬である。 ¹⁾ 2) 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 重大な副作用として、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸が報告されている。 (VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、8. 副作用(2)重大な副作用と初期症状の項を参照)

II. 名称に関する項目

1. 販売名	
(1) 和名	オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」 オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」
(2) 洋名	OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Tablets 2.5mg “KYORIN” OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Tablets 5mg “KYORIN”
(3) 名称の由来	成分の一般名に由来する。
2. 一般名	
(1) 和名（命名法）	オロパタジン塩酸塩(JAN)
(2) 洋名（命名法）	Olopatadine Hydrochloride(JAN) Olopatadine(INN)
(3) ステム	三環系 H ₁ 受容体拮抗薬：-tadine
3. 構造式又は示性式	
4. 分子式及び分子量	分子式：C ₂₁ H ₂₃ NO ₃ ・HCl 分子量：373.87
5. 化学名（命名法）	{11-[(1 <i>Z</i>)-3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenzo[<i>b, e</i>]oxepin-2-yl}acetic acid monohydrochloride (IUPAC)
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	特になし
7. CAS 登録番号	140462-76-6 (Olopatadine Hydrochloride) 113806-05-6 (Olopatadine)



Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質	
(1) 外観・性状	白色の結晶又は結晶性の粉末である。
(2) 溶解性	ギ酸に極めて溶けやすく、水にやや溶けにくく、エタノール(99.5)に極めて溶けにくい。0.1mol/L 塩酸試液に溶ける。
(3) 吸湿性	該当資料なし
(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点	融点：約 250℃（分解）
(5) 酸塩基解離定数	該当資料なし
(6) 分配係数	該当資料なし
(7) その他の主な示性値	pH：1.0g を水 100mL に溶かした液の pH は 2.3～3.3 である。
2. 有効成分の各種条件下における安定性	該当資料なし
3. 有効成分の確認試験法	日本薬局方「オロパタジン塩酸塩」の確認試験による。 (1) 紫外可視吸光度測定法 (2) 赤外吸収スペクトル測定法（塩化カリウム錠剤法） (3) 塩化物の定性反応(2)
4. 有効成分の定量法	日本薬局方「オロパタジン塩酸塩」の定量法による。 電位差滴定法（0.1mol/L 過塩素酸で滴定）

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別、外観及び性状

販売名	オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」	オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」
剤形	フィルムコーティング錠	割線入り フィルムコーティング錠
色調	淡黄赤色	淡黄赤色
外観		
直径(mm)	6.1	7.1
厚さ(mm)	2.7	2.8
重量(mg)	80	120

(2) 製剤の物性

該当資料なし

(3) 識別コード

オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」：KRM146

オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」：KRM147

(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等

該当資料なし

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成分）の含量

オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」：

1錠中、日局オロパタジン塩酸塩 2.5mg 含有

オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」：

1錠中、日局オロパタジン塩酸塩 5mg 含有

(2) 添加物

D-マンニトール、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース（置換度タイプ：2910）、マクロゴール 6000、酸化チタン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ

(3) その他

特になし

3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

IV. 製剤に関する項目

4. 製剤の各種条件下における安定性^{2)~}

4)

【加速試験】²⁾

<保存条件>

40±1℃、75±5%RH

<試験検体>

PTP 包装品 : PTP シート (ポリ塩化ビニルフィルム及びアルミニウム箔)
紙箱

<試験項目及び規格>

試験項目	規 格
性状	[2.5mg] 淡黄赤色のフィルムコーティング錠
	[5mg] 淡黄赤色の片面割線入りフィルムコーティング錠
確認試験	紫外可視吸光度測定法により吸収スペクトルを測定するとき、波長 295~299nm に吸収の極大を示す。
溶出性	水/900mL/パドル法/毎分 50 回転/15 分間/85%以上
定量	含量 : 95.0~105.0%

<試験結果>

【オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」】

試験項目	開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	適	適	適	適
確認試験	適			適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量)	100.4%	99.0%	99.4%	99.0%

(1 ロット n=3 の 3 ロットの平均値)

【オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」】

試験項目	開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	適	適	適	適
確認試験	適			適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量)	98.9%	100.1%	98.5%	99.8%

(1 ロット n=3 の 3 ロットの平均値)

【無包装状態での安定性】

IV. 製剤に関する項目

[オロパジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」]³⁾

保存条件	結 果			
	性状	溶出性	含量	硬度
温度 [40°C、3 ヶ月、 遮光・密栓]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
湿度 [75%RH、25°C、3 ヶ月、 遮光・開放]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
光 [曝光量 60 万 lx・hr、 25°C、(密栓)]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

[規格] 性状：淡黄赤色のフィルムコーティング錠、溶出性：15 分間 85%以上、
含量：95.0～105.0%、硬度：2.0kgf 以上

[オロパジン塩酸塩錠 5mg「杏林」]⁴⁾

保存条件	結 果			
	性状	溶出性	含量	硬度
温度 [40°C、3 ヶ月、 遮光・密栓]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
湿度 [75%RH、25°C、3 ヶ月、 遮光・開放]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
光 [曝光量 60 万 lx・hr、 25°C、(密栓)]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

[規格] 性状：淡黄赤色の片面割線入りフィルムコーティング錠、溶出性：15 分間 85%
以上、含量：95.0～105.0%、硬度：2.0kgf 以上

<参考>評価基準

分類	性状	溶出性	定量法(含量)	硬度
変化なし	外観上の変化を、ほとんど認めない場合	規格値内 の場合	含量低下が 3%未満の場合	硬度変化が 30%未満の場合
変化あり (規格内)	わずかな色調変化 (退色等)等を認め るが、品質上、問題 とならない程度の変 化であり、規格を満 たしている場合		含量低下が3% 以上で、規格値 内の場合	硬度変化が 30%以上で、 硬度が2.0kg 重 以上の場合
変化あり (規格外)	形状変化や著しい色 調変化等を認め、規 格を逸脱している場 合	規格値外 の場合	規格値外 の場合	硬度変化が30% 以上で、 硬度が2.0kg 重 未満の場合

本試験は、「(社)日本病院薬剤師会：錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)、平成11年8月20日」を参考に評価しました。本資料は本剤の安定性に関する資料であり、無包装で保存した本剤を使用した場合の有効性・安全性についての評価は実施しておりません。

IV. 製剤に関する項目

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化
(物理化学的变化)

該当しない

7. 溶出性⁵⁾

【溶出挙動における同等性】

〔オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」〕

オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」を標準製剤とし、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(薬食審査発第 1124004 号平成 18 年 11 月 24 日)」の B 水準に従い、標準製剤との溶出挙動の比較を行った。

<試験方法>

試験法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法(パドル法)

試験液：以下の試験液 900mL

試験液の温度：37±0.5℃

試験液		回転数
pH1.2	溶出試験第 1 液	50 回転/分
pH4.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50 回転/分
pH6.8	溶出試験第 2 液	50 回転/分
水	水	50 回転/分
pH4.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	100 回転/分

<結果>

(1) 平均溶出率

判定基準：試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にある。

溶出条件	判定時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)		
		オロパタジン 塩酸塩錠 2.5mg「杏林」	標準製剤 (オロパタジン 塩酸塩錠 5mg「杏林」)	差
pH1.2/50rpm	15	98.4	100.5	-2.1
pH4.0/50rpm	15	100.4	98.9	+1.5
pH6.8/50rpm	15	99.8	102.0	-2.2
水/50rpm	15	99.4	100.9	-1.5
pH4.0/100rpm	15	100.5	99.8	+0.7


IV. 製剤に関する項目

(2) 個々の溶出率：

判定基準：平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない。

溶出条件	判定時点 (分)	12 ベッセルの溶出率(%)	
		平均値	範囲 (最小値～最大値)
pH1.2/50rpm	15	98.4	96.0 ～ 101.6
pH4.0/50rpm	15	100.4	95.6 ～ 106.0
pH6.8/50rpm	15	99.8	97.2 ～ 101.6
水/50rpm	15	99.4	96.8 ～ 104.0
pH4.0/100rpm	15	100.5	98.8 ～ 103.2

以上より、平均溶出率、個々の溶出率ともに溶出挙動の同等性の判定基準に適合したため、オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」は標準製剤（オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」）と溶出挙動が同等であると判定された。



IV. 製剤に関する項目

【溶出挙動における類似性】

〔オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」〕

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(薬食審査発第 1124004号平成 18 年 11 月 24 日)に従い、標準製剤との溶出挙動の比較を行った。

<試験方法>

試験法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法(パドル法)

試験液：以下の試験液 900mL

試験液の温度：37±0.5℃

試験液		回転数
pH1.2	溶出試験第 1 液	50 回転/分
pH5.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50 回転/分
pH6.8	溶出試験第 2 液	50 回転/分
水	水	50 回転/分
pH5.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	100 回転/分

<判定基準>

標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合：


試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

<結果>

溶出条件	判定 時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)		
		オロパタジン塩 酸塩錠 5mg「杏林」	標準製剤 (錠剤、5mg)	差
pH1.2/50rpm	15	100.5	100.0	0.5
pH5.0/50rpm	15	99.6	97.7	1.9
pH6.8/50rpm	15	102.0	98.4	3.6
水/50rpm	15	100.9	98.6	2.3
pH5.0/100rpm	15	101.0	99.6	1.4

以上より、いずれの溶出条件においても溶出挙動の類似性の判定基準に適合することから、オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」は標準製剤と溶出挙動が類似していると判定された。

IV. 製剤に関する項目



【公的溶出規格への適合性】

オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」及びオロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」は、日本薬局方医薬品各条に定められたオロパタジン塩酸塩錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

試験条件：水 900mL、パドル法、毎分 50 回転

溶出規格：15 分間 85%以上

15 分間の溶出率 (3 ロットの最小値～最大値)	
オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」	96%～103%
オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」	98%～102%

8. 生物学的試験法

該当しない

9. 製剤中の有効成分の確認試験法

日本薬局方「オロパタジン塩酸塩錠」の確認試験による。
紫外可視吸光度測定法

IV. 製剤に関する項目

10. 製剤中の有効成分の定量法	日本薬局方「オロパタジン塩酸塩錠」の定量法による。 液体クロマトグラフィー
11. 力価	該当しない
12. 混入する可能性のある夾雑物	<i>N</i> -オキシド体、 <i>N</i> -エチル体、オキソ体、ヒドロキシ体、カルバルデヒド体等
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	特になし
14. その他	特になし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果	成人：アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴う瘙痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚瘙癢症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑） 小児：アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚瘙癢症）に伴う瘙痒
2. 用法及び用量	成人：通常、成人には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 小児：通常、7歳以上の小児には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。
3. 臨床成績	
(1) 臨床データパッケージ	該当資料なし
(2) 臨床効果	該当資料なし
(3) 臨床薬理試験	該当資料なし
(4) 探索的試験	該当資料なし
(5) 検証的試験	
1) 無作為化並行用量反応試験	該当資料なし
2) 比較試験	該当資料なし
3) 安全性試験	該当資料なし
4) 患者・病態別試験	該当資料なし
(6) 治療的使用	

V. 治療に関する項目

- | | |
|---|--------|
| 1) 使用成績調査・特定
使用成績調査（特別
調査）・製造販売後
臨床試験（市販後臨
床試験） | 該当資料なし |
| 2) 承認条件として実
施予定の内容又は
実施した試験の概
要 | 該当しない |

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	第2世代H ₁ 受容体拮抗薬： ケトチフェンフマル酸塩、メキタジン、アゼラスチン塩酸塩、オキサトミド、エメダスチンフマル酸塩、エピナスチン塩酸塩、エバスチン、セチリジン塩酸塩、ベポタスチンベシル酸塩、ロラタジン、フェキソフェナジン塩酸塩、レボセチリジン塩酸塩
2. 薬理作用	
(1) 作用部位・作用機序 ¹⁾	ヒスタミンH ₁ 受容体拮抗作用を主体とし、ケミカルメディエーター（ロイコトリエン、トロンボキサン、PAF等）の産生・遊離抑制作用を現す。更に、神経伝達物質タキキニン遊離抑制作用も有する。
(2) 薬効を裏付ける試験成績	該当資料なし
(3) 作用発現時間・持続時間	該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間

VII. 薬物動態に関する項目、1. 血中濃度の推移・測定法(3)臨床試験で確認された血中濃度の項を参照

(3) 臨床試験で確認された血中濃度⁶⁾

【生物学的同等性試験】

【オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」】

「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン（薬食審査発第 1124004 号 平成 18 年 11 月 24 日）」に基づき、オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。（IV. 製剤に関する項目 7. 溶出性の項を参照）

【オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」】


後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（薬食審査発第 1124004 号 平成 18 年 11 月 24 日）に従い、健康成人男子を対象に生物学的同等性試験を実施した。

オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠（オロパタジン塩酸塩として 5mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0→30} (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」	222.2 ±31.1	76.8 ±12.2	0.80 ±0.44	4.96 ±1.98
標準製剤 (錠剤、5mg)	224.7 ±31.2	77.0 ±13.5	0.80 ±0.44	5.11 ±1.83

(Mean ± S. D., n=16)

VII. 薬物動態に関する項目



血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4) 中毒域

該当資料なし

(5) 食事・併用薬の影響

該当資料なし

(6) 母集団（ポピュレーション）解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) バイオアベイラビリティ

該当資料なし

(4) 消失速度定数

該当資料なし

(5) クリアランス

健康成人男子（摂食下）にオロパタジン塩酸塩 10mg を単回経口投与したときのクリアランス CL/F は平均で 19.33L/hr と算出された。¹⁾

(6) 分布容積

健康成人男子（摂食下）にオロパタジン塩酸塩 10mg を単回経口投与したときの分布容積 $Vd\beta/F$ は平均で 305L と算出された。¹⁾

VII. 薬物動態に関する項目

(7) 血漿蛋白結合率	健康成人男子(摂食下)にオロパタジン塩酸塩 10mg を単回経口投与したとき、投与 2 時間後、12 時間後の血漿タンパク結合率は、それぞれ 67.9%、65.6%であった。 ¹⁾
3. 吸収	該当資料なし
4. 分布	
(1) 血液－脳関門通過性	該当資料なし
(2) 血液－胎盤関門通過性	該当資料なし
(3) 乳汁への移行性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(2)の項を参照
(4) 髄液への移行性	該当資料なし
(5) その他の組織への移行性	該当資料なし
5. 代謝	
(1) 代謝部位及び代謝経路	該当資料なし
(2) 代謝に関与する酵素(CYP450 等)の分子種	該当資料なし
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	該当資料なし
(4) 代謝物の活性の有無及び比率	該当資料なし
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

6. 排泄	
(1) 排泄部位及び経路	該当資料なし
(2) 排泄率	健康成人にオロパタジン塩酸塩 5mg 及び 10mg を単回経口投与した場合の 48 時間までの未変化体の尿中排泄率は、投与量の 63.0~71.8%であった。また、1 回 10mg を 1 日 2 回 6 日間、7 日目に 1 回の計 13 回反復経口投与した時、単回経口投与後の尿中排泄率と同程度であった。 ¹⁾
(3) 排泄速度	該当資料なし
7. トランスポーターに関する情報	該当資料なし
8. 透析等による除去率	該当資料なし

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由	該当しない
2. 禁忌内容とその理由 （原則禁忌を含む）	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> </div>
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	該当しない
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	該当しない
5. 慎重投与内容とその理由	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）</p> <p>(1) 腎機能低下患者 [高い血中濃度が持続するおそれがある。]</p> <p>(2) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）</p> <p>(3) 肝機能障害のある患者 [肝機能障害が悪化するおそれがある。]</p> </div>
6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>重要な基本的注意</p> <p>(1) 眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。</p> <p>(2) 長期ステロイド療法を受けている患者で、本剤投与によりステロイド減量を図る場合には十分な管理下で徐々に行うこと。</p> <p>(3) 本剤を季節性の患者に投与する場合は、好発季節を考慮して、その直前から投与を開始し、好発季節終了時まで続けることが望ましい。</p> <p>(4) 本剤の使用により効果が認められない場合には、漫然と長期にわたり投与しないように注意すること。</p> </div>
7. 相互作用	
(1) 併用禁忌とその理由	該当しない
(2) 併用注意とその理由	該当しない

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

8. 副作用

(1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(2) 重大な副作用と初期症状

重大な副作用

劇症肝炎、肝機能障害、黄疸（頻度不明）：劇症肝炎、AST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GTP、LDH、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(3) その他の副作用

その他の副作用

下記のような副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には減量・休薬等の適切な処置を行うこと。

分類	副作用（頻度不明）
過敏症 ^{注)}	紅斑等の発疹、浮腫（顔面・四肢等）、掻痒、呼吸困難
精神神経系	眠気、倦怠感、口渇、頭痛・頭重感、めまい、集中力低下、しびれ感、不随意運動（顔面・四肢等）
消化器	腹部不快感、腹痛、下痢、嘔気、便秘、口内炎・口角炎・舌痛、胸やけ、食欲亢進、嘔吐
肝臓	肝機能異常〔ALT(GPT)、AST(GOT)、LDH、 γ -GTP、Al-P、総ビリルビン上昇〕
血液	白血球増多、好酸球増多、リンパ球減少、白血球減少、血小板減少
腎臓・泌尿器	尿潜血、BUN 上昇、尿蛋白陽性、血中クレアチニン上昇、頻尿、排尿困難
循環器	動悸、血圧上昇
その他	血清コレステロール上昇、尿糖陽性、胸部不快感、味覚異常、体重増加、ほてり、月経異常、筋肉痛、関節痛

注) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。

(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度	該当資料なし
(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法	<p>(1) 禁忌（次の患者には投与しないこと） 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>(2) その他の副作用（頻度不明） 過敏症：紅斑等の発疹、浮腫（顔面・四肢等）、痒痒、呼吸困難 このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。</p>
9. 高齢者への投与	<p>高齢者では生理機能が低下していることが多く、副作用が発現しやすいので、低用量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。</p>
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	<p>(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]</p> <p>(2) 授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。[動物実験（ラット）で乳汁中への移行及び出生児の体重増加抑制が報告されている。]</p>
11. 小児等への投与	<p>低出生体重児、新生児、乳児、幼児に対する安全性は確立していない（使用経験が少ない）。</p>
12. 臨床検査結果に及ぼす影響	<p>本剤の投与は、アレルギー皮内反応を抑制し、アレルギーの確認に支障を来すので、アレルギー皮内反応検査を実施する前は本剤を投与しないこと。</p>
13. 過量投与	該当資料なし
14. 適用上の注意	<p>(1) 薬剤交付時: PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]</p> <p>(2) 薬剤分割時: 分割したときは遮光下に保存すること。</p>

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

15. その他の注意	因果関係は明らかではないが、本剤投与中に心筋梗塞の発症がみられた症例が報告されている。
16. その他	特になし

Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験	
(1) 薬効薬理試験（「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照）	
(2) 副次的薬理試験	該当資料なし
(3) 安全性薬理試験	該当資料なし
(4) その他の薬理試験	該当資料なし
2. 毒性試験	
(1) 単回投与毒性試験	該当資料なし
(2) 反復投与毒性試験	該当資料なし
(3) 生殖発生毒性試験	該当資料なし
(4) その他の特殊毒性	該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分	製剤	オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」	該当しない
		オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」	該当しない
	有効成分	オロパタジン塩酸塩	該当しない
2. 有効期間又は使用期限	使用期限：3年（安定性試験結果に基づく ¹⁾ ）		
3. 貯法・保存条件	室温保存		
4. 薬剤取扱い上の注意点			
(1) 薬局での取り扱い上の留意点について	特になし		
(2) 薬剤交付時の取り扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）	Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、14. 適用上の注意の項を参照 くすりのしおり：有り		
(3) 調剤時の留意点について	特になし		
5. 承認条件等	該当しない		
6. 包装	オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」	PTP：100錠	
	オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」	PTP：100錠、500錠	
7. 容器の材質	〔PTP包装品〕 PTP包装：ポリ塩化ビニルフィルム、アルミニウム箔 箱：紙		

X. 管理的事項に関する項目

8. 同一成分・同効薬	<p>同一成分薬：アレロック錠 2.5/5、アレロック OD 錠 2.5/5、アレロック顆粒 0.5%</p> <p>同 効 薬：第2世代H₁受容体拮抗薬（ケトチフェンフマル酸塩、メキタジン、アゼラスチン塩酸塩、オキサトミド、エメダスチンフマル酸塩、エピナスチン塩酸塩、エバスチン、セチリジン塩酸塩、ベポタスチンベシル酸塩、ロラタジン、フェキソフェナジン塩酸塩、レボセチリジン塩酸塩）</p>									
9. 国際誕生年月日	1996年12月18日									
10. 製造販売承認年月日及び承認番号	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 734 799 779">販売名</th> <th data-bbox="799 734 1118 779">製造販売承認年月日</th> <th data-bbox="1118 734 1436 779">承認番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 779 799 880">オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」</td> <td data-bbox="799 779 1118 880">2012年8月15日</td> <td data-bbox="1118 779 1436 880">22400AMX01172000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 880 799 981">オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」</td> <td data-bbox="799 880 1118 981">2012年8月15日</td> <td data-bbox="1118 880 1436 981">22400AMX01173000</td> </tr> </tbody> </table>	販売名	製造販売承認年月日	承認番号	オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」	2012年8月15日	22400AMX01172000	オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」	2012年8月15日	22400AMX01173000
販売名	製造販売承認年月日	承認番号								
オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」	2012年8月15日	22400AMX01172000								
オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」	2012年8月15日	22400AMX01173000								
11. 薬価基準収載年月日	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 1025 967 1070">販売名</th> <th data-bbox="967 1025 1273 1070">薬価基準収載年月日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 1070 967 1126">オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」</td> <td data-bbox="967 1070 1273 1126">2012年12月14日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1126 967 1171">オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」</td> <td data-bbox="967 1126 1273 1171">2012年12月14日</td> </tr> </tbody> </table>	販売名	薬価基準収載年月日	オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」	2012年12月14日	オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」	2012年12月14日			
販売名	薬価基準収載年月日									
オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」	2012年12月14日									
オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」	2012年12月14日									
12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	<p>○一部変更承認年月日：2014年11月20日</p> <p>内容：下記内容の追加</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1317 679 1406">効能・効果</td> <td data-bbox="679 1317 1425 1406">小児：アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚瘙癢症）に伴う瘙痒</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1406 679 1507">用法・用量</td> <td data-bbox="679 1406 1425 1507">小児：通常、7歳以上の小児には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。</td> </tr> </tbody> </table>	効能・効果	小児：アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚瘙癢症）に伴う瘙痒	用法・用量	小児：通常、7歳以上の小児には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。					
効能・効果	小児：アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚瘙癢症）に伴う瘙痒									
用法・用量	小児：通常、7歳以上の小児には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。									
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	該当しない									
14. 再審査期間	該当しない									
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。									

X. 管理的事項に関する項目

16. 各種コード

販売名	HOT(9桁)番号	厚生労働省薬価 基準収載医薬品 コード	レセプト 電算コード
オロパタジン塩酸 塩錠 2.5mg「杏林」	121880001	4490025F1015	622188001
オロパタジン塩酸 塩錠 5mg「杏林」	121881701	4490025F2151	622188101

17. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

XI. 文献

1. 引用文献	<ul style="list-style-type: none">1) 第十七改正日本薬局方解説書、C-1204（廣川書店 2016）2) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」・5mg「杏林」の安定性試験に関する資料3) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」の無包装(過酷)状態での安定性に関する資料4) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： オロパタジン塩酸塩錠 5mg「杏林」の無包装(過酷)状態での安定性に関する資料5) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」・5mg「杏林」の溶出性に関する資料6) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「杏林」・5mg「杏林」の生物学的同等性試験に関する資料
2. その他の参考文献	該当資料なし

XII. 参考資料

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. 主な外国での発売状況 | 該当しない |
| 2. 海外における臨床支援情報 | 該当資料なし |

XII. 備考

1. その他の関連資料

該当資料なし