

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2013に準拠して作成

A-IIアンタゴニスト

日本薬局方 ロサルタンカリウム錠

ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」

ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」

ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」

LOSARTAN POTASSIUM Tablets “KYORIN”

剤形	フィルムコーティング錠
製剤の規制区分	処方箋医薬品 ^{注)} 注) 注意－医師等の処方箋により使用すること
規格・含量	ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」： 1錠中、日局ロサルタンカリウム 25mg 含有 ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」： 1錠中、日局ロサルタンカリウム 50mg 含有 ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」： 1錠中、日局ロサルタンカリウム 100mg 含有
一般名	和名：ロサルタンカリウム(JAN) 洋名：Losartan Potassium(JAN)
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2012年2月15日 薬価基準収載年月日：2012年6月22日 発売年月日：2012年6月22日
開発・製造販売(輸入)・ 提携・販売会社名	製造販売元：キョーリンリメディオ株式会社 販売元：杏林製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	キョーリンリメディオ株式会社 学術部 TEL：0120-960189 FAX：0120-189099 受付時間：8時～22時（日、祝日、その他当社の休業日を除く） 医療関係者向けホームページ https://med.kyorin-rmd.com/

本IFは2022年11月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ <http://www.pmda.go.jp/>にてご確認下さい。

I F 利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、I F と略す）の位置付け並びに I F 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において I F 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において新たな I F 記載要領 2008 が策定された。

I F 記載要領 2008 では、I F を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること（e-I F）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-I F が提供されることとなった。

最新版の e-I F は、（独）医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp/>）から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-I F を掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-I F の情報を検討する組織を設置して、個々の I F が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、I F 記載要領の一部改訂を行い I F 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

2. I F とは

I F は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は I F の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された I F は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

【I F の様式】

- ①規格は A 4 判、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤字・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ② I F 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「I F 利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2 頁にまとめる。

【 I F の作成】

- ① I F は原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ② I F に記載する項目及び配列は日病薬が策定した I F 記載要領に準拠する。
- ③ 添付文書の内容を補完するとの I F の主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「 I F 記載要領 2013」と略す）により作成された I F は、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（ P D F ）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

【 I F の発行】

- ① 「 I F 記載要領 2013」は、平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ② 上記以外の医薬品については、「 I F 記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合には I F が改訂される。

3. I F の利用にあたって

「 I F 記載要領 2013」においては、 P D F ファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体の I F については、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、 I F の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や I F 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の M R 等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、 I F の利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、 I F が改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、 I F の使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

I F を薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。 I F は日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、 I F があくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013 年 4 月改訂)

目 次


I. 概要に関する項目	1	VII. 薬物動態に関する項目	20
1. 開発の経緯	1	1. 血中濃度の推移・測定法	20
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	2. 薬物速度論的パラメータ	22
II. 名称に関する項目	2	3. 吸収	22
1. 販売名	2	4. 分布	22
2. 一般名	2	5. 代謝	23
3. 構造式又は示性式	2	6. 排泄	23
4. 分子式及び分子量	2	7. トランスポーターに関する情報	23
5. 化学名(命名法)	2	8. 透析等による除去率	23
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	24
7. CAS 登録番号	2	1. 警告内容とその理由	24
III. 有効成分に関する項目	3	2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)	24
1. 物理化学的性質	3	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	24
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	24
3. 有効成分の確認試験法	3	5. 慎重投与内容とその理由	24
4. 有効成分の定量法	3	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	25
IV. 製剤に関する項目	4	7. 相互作用	26
1. 剤形	4	8. 副作用	28
2. 製剤の組成	4	9. 高齢者への投与	30
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	5	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	30
4. 製剤の各種条件下における安定性	5	11. 小児等への投与	30
5. 調製法及び溶解後の安定性	8	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	31
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	8	13. 過量投与	31
7. 溶出性	8	14. 適用上の注意	31
8. 生物学的試験法	16	15. その他の注意	31
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	16	16. その他	31
10. 製剤中の有効成分の定量法	16	IX. 非臨床試験に関する項目	32
11. 力価	16	1. 薬理試験	32
12. 混入する可能性のある夾雑物	16	2. 毒性試験	32
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	16	X. 管理的事項に関する項目	33
14. その他	16	1. 規制区分	33
V. 治療に関する項目	17	2. 有効期間又は使用期限	33
1. 効能又は効果	17	3. 貯法・保存条件	33
2. 用法及び用量	17	4. 薬剤取扱い上の注意点	33
3. 臨床成績	17	5. 承認条件等	33
VI. 薬効薬理に関する項目	19	6. 包装	33
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	19	7. 容器の材質	33
2. 薬理作用	19	8. 同一成分・同効薬	34
		9. 国際誕生年月日	34
		10. 製造販売承認年月日及び承認番号	34
		11. 薬価基準収載年月日	34

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容.....	34
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容.....	34
14. 再審査期間.....	35
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報.....	35
16. 各種コード.....	35
17. 保険給付上の注意.....	35
XI. 文献	36
1. 引用文献.....	36
2. その他の参考文献.....	36
XII. 参考資料	37
1. 主な外国での発売状況.....	37
2. 海外における臨床支援情報.....	37
XIII. 備考	38
1. その他の関連資料.....	38

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯	ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」、ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」及びロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」は、後発医薬品として薬食発第 0331015 号（平成 17 年 3 月 31 日）に基づき、規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を行い承認申請し、2012 年 2 月に承認を取得、2012 年 6 月に発売に至った。
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1) アンジオテンシン II 受容体のうち AT ₁ 受容体と選択的に結合し、アンジオテンシン II の生理作用を阻害することによって降圧作用を現す。 ¹⁾ 2) 重大な副作用として、アナフィラキシー、血管浮腫、急性肝炎または劇症肝炎、腎不全、ショック、失神、意識消失、横紋筋融解症、高カリウム血症、不整脈、汎血球減少、白血球減少、血小板減少、低血糖、低ナトリウム血症が報告されている。 (本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。)

II. 名称に関する項目

1. 販売名	
(1) 和名	ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」 ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」 ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」
(2) 洋名	LOSARTAN POTASSIUM Tablets 25mg “KYORIN” LOSARTAN POTASSIUM Tablets 50mg “KYORIN” LOSARTAN POTASSIUM Tablets 100mg “KYORIN”
(3) 名称の由来	成分の一般名に由来する。
2. 一般名	
(1) 和名（命名法）	ロサルタンカリウム (JAN)
(2) 洋名（命名法）	Losartan Potassium (JAN) Losartan (INN)
(3) ステム	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬：-sartan
3. 構造式又は示性式	
4. 分子式及び分子量	分子式：C ₂₂ H ₂₂ ClKN ₆ O 分子量：461.00
5. 化学名（命名法）	Monopotassium 5-{{[4'-(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-1 <i>H</i> -tetrazol-1-ide (IUPAC)
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	特になし
7. CAS 登録番号	124750-99-8 (Losartan Potassium) 114798-26-4 (Losartan)

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質	
(1) 外観・性状	白色の結晶性の粉末である。
(2) 溶解性	水に極めて溶けやすく、メタノール又はエタノール(99.5)に溶けやすい。
(3) 吸湿性	該当資料なし
(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点	該当資料なし
(5) 酸塩基解離定数	該当資料なし
(6) 分配係数	該当資料なし
(7) その他の主な示性値	該当資料なし
2. 有効成分の各種条件下における安定性	該当資料なし
3. 有効成分の確認試験法	日本薬局方「ロサルタンカリウム」の確認試験による。 (1)紫外可視吸光度測定法 (2)赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法） (3)カリウム塩の定性反応(1) (4)炎色反応試験(2)
4. 有効成分の定量法	日本薬局方「ロサルタンカリウム」の定量法による。 液体クロマトグラフィー

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別、外観及び性状

販売名	剤形	色調	外観	直径 (mm)	厚さ (mm)	重量 (mg)
ロサルタン カリウム錠 25mg「杏林」	円形・割線入 りフィルムコー ーティング錠	白色		約 5.6	約 3.1	78
ロサルタン カリウム錠 50mg「杏林」	円形・割線入 りフィルムコー ーティング錠	白色		約 7.6	約 3.5	156
ロサルタン カリウム錠 100mg「杏林」	ティアドロツ プ形・ フィルムコー ーティング錠	白色		長径： 約 11.1 短径： 約 7.6	約 4.5	312

(2) 製剤の物性

該当資料なし

(3) 識別コード

ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」 : KRM139
 ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」 : KRM140
 ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」 : KRM141

(4) pH、浸透圧比、粘度、 比重、無菌の旨及び 安定な pH 域等

該当資料なし

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成 分）の含量

ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」 :
 1 錠中、日局ロサルタンカリウム 25mg 含有
 ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」 :
 1 錠中、日局ロサルタンカリウム 50mg 含有
 ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」 :
 1 錠中、日局ロサルタンカリウム 100mg 含有

IV. 製剤に関する項目

(2) 添加物	乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、カルナウバロウ																										
(3) その他	特になし																										
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	該当しない																										
4. 製剤の各種条件下における安定性 ^{2)~5)}	<p>【加速試験】²⁾ 最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度 75%、6 ヶ月)の結果、ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」、ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」及びロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。</p> <p><保存条件> 40±1℃、75±5%RH</p> <p><試験検体> PTP 包装品 : PTP 包装(ポリ塩化ビニルフィルム及びアルミニウム箔)、ポリエチレンテレフタレートポリラミネート蒸着フィルムでロー包装、紙箱</p> <p><試験項目及び規格></p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">試験項目</th> <th>規 格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">性状</td> <td>25mg 錠</td> <td>白色の片面割線入りフィルムコーティング錠</td> </tr> <tr> <td>50mg 錠</td> <td>白色の片面割線入りフィルムコーティング錠</td> </tr> <tr> <td>100mg 錠</td> <td>ティアドロップ形の白色のフィルムコーティング錠</td> </tr> <tr> <td colspan="2">確認試験</td> <td>薄層クロマトグラフィー試験により試験を行うとき、試料溶液及び標準溶液から得られたスポットの Rf 値は等しい。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">製剤均一性</td> <td>含量均一性試験を行うとき、適合する。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">溶出性</td> <td>25mg 錠</td> <td>水/900mL/パドル法/50rpm/45 分間/85%以上</td> </tr> <tr> <td>50mg 錠</td> <td>水/900mL/パドル法/50rpm/45 分間/85%以上</td> </tr> <tr> <td>100mg 錠</td> <td>水/900mL/パドル法/75rpm/30 分間/85%以上</td> </tr> <tr> <td colspan="2">定量法</td> <td>含量 : 95.0~105.0%</td> </tr> </tbody> </table>		試験項目		規 格	性状	25mg 錠	白色の片面割線入りフィルムコーティング錠	50mg 錠	白色の片面割線入りフィルムコーティング錠	100mg 錠	ティアドロップ形の白色のフィルムコーティング錠	確認試験		薄層クロマトグラフィー試験により試験を行うとき、試料溶液及び標準溶液から得られたスポットの Rf 値は等しい。	製剤均一性		含量均一性試験を行うとき、適合する。	溶出性	25mg 錠	水/900mL/パドル法/50rpm/45 分間/85%以上	50mg 錠	水/900mL/パドル法/50rpm/45 分間/85%以上	100mg 錠	水/900mL/パドル法/75rpm/30 分間/85%以上	定量法		含量 : 95.0~105.0%
試験項目		規 格																									
性状	25mg 錠	白色の片面割線入りフィルムコーティング錠																									
	50mg 錠	白色の片面割線入りフィルムコーティング錠																									
	100mg 錠	ティアドロップ形の白色のフィルムコーティング錠																									
確認試験		薄層クロマトグラフィー試験により試験を行うとき、試料溶液及び標準溶液から得られたスポットの Rf 値は等しい。																									
製剤均一性		含量均一性試験を行うとき、適合する。																									
溶出性	25mg 錠	水/900mL/パドル法/50rpm/45 分間/85%以上																									
	50mg 錠	水/900mL/パドル法/50rpm/45 分間/85%以上																									
	100mg 錠	水/900mL/パドル法/75rpm/30 分間/85%以上																									
定量法		含量 : 95.0~105.0%																									

IV. 製剤に関する項目

< 試験結果 >

[ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」]

試験項目	開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	適	適	適	適
確認試験	適	適	適	適
製剤均一性	適	適	適	適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量)	99.0%	99.5%	99.9%	99.3%

(1 ロット n=3 の 3 ロットの平均値)

[ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」]

試験項目	開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	適	適	適	適
確認試験	適	適	適	適
製剤均一性	適	適	適	適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量)	98.4%	99.5%	99.6%	99.4%

(1 ロット n=3 の 3 ロットの平均値)

[ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」]

試験項目	開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	適	適	適	適
確認試験	適	適	適	適
製剤均一性	適	適	適	適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量)	99.2%	98.7%	98.9%	99.0%

(1 ロット n=3 の 3 ロットの平均値)

IV. 製剤に関する項目

【無包装状態での安定性】

〔ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」〕³⁾

保存条件	結 果			
	性状	溶出性	含量	硬度
40°C、75%RH (遮光・開放)、3 ヶ月	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
25°C、60%RH (遮光・開放)、3 ヶ月	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
曝光量 120 万 lx・hr、 25°C、60%RH (開放)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

〔規格〕性状：白色の片面割線入りフィルムコーティング錠、溶出性：45 分間 85%以上、含量：95.0～105.0%、硬度：参考値

〔ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」〕⁴⁾

保存条件	結 果			
	性状	溶出性	含量	硬度
40°C、75%RH (遮光・開放)、3 ヶ月	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
25°C、60%RH (遮光・開放)、3 ヶ月	変化なし	変化あり (規格外) [※]	変化なし	変化なし
曝光量 120 万 lx・hr、 25°C、60%RH (開放)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

〔規格〕性状：白色の片面割線入りフィルムコーティング錠、溶出性：45 分間 85%以上、含量：95.0～105.0%、硬度：参考値

※ 1 か月後の時点で規格外

〔ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」〕⁵⁾

保存条件	結 果			
	性状	溶出性	含量	硬度
40°C、75%RH (遮光・開放)、3 ヶ月	変化なし	変化あり (規格外) ^{※1}	変化なし	変化なし
25°C、60%RH (遮光・開放)、3 ヶ月	変化なし	変化なし	変化なし	変化あり (規格内) ^{※2}
曝光量 120 万 lx・hr、 25°C、60%RH (開放)	変化なし	変化なし	変化なし	変化あり (規格内) ^{※3}

〔規格〕性状：ティアドロップ形の白色のフィルムコーティング錠、溶出性：30 分間 85%以上、含量：95.0～105.0%、硬度：参考値

※1 1 か月後の時点で規格外

※2 10kgf(開始時)→9kgf(1 ヶ月)、7kgf(3 ヶ月)

※3 10kgf(開始時)→7kgf(曝光量 120 万 lx・hr)

IV. 製剤に関する項目

<参考>評価基準

分類	性状	溶出性	定量法(含量)	硬度
変化なし	外観上の変化を、ほとんど認めない場合	規格値内の場合	含量低下が3%未満の場合	硬度変化が30%未満の場合
変化あり(規格内)	わずかな色調変化(退色等)等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている場合		含量低下が3%以上で、規格値内の場合	硬度変化が30%以上で、硬度が2.0kg重以上の場合
変化あり(規格外)	形状変化や著しい色調変化等を認め、規格を逸脱している場合		規格値外の場合	規格値外の場合

本試験は、「(社)日本病院薬剤師会：錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)、平成11年8月20日」を参考に評価しました。本資料は本剤の安定性に関する資料であり、無包装で保存した本剤を使用した場合の有効性・安全性についての評価は実施しておりません。

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化(物理化学的变化)

該当しない

7. 溶出性⁶⁾

【溶出挙動における類似性】

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(薬食審査発第1124004号平成18年11月24日)に従い、標準製剤との溶出挙動の比較を行った。

<試験方法>

試験法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法(パドル法)

試験液：以下の試験液 900mL

試験液の温度：37±0.5℃

試験液		回転数
pH1.2	日本薬局方 溶出試験第1液	50回転/分
pH5.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50回転/分
pH6.8	日本薬局方 溶出試験第2液	50回転/分
水	日本薬局方 精製水	50回転/分
pH5.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	100回転/分

IV. 製剤に関する項目

[ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」]

<判定基準>

○標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合：

試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

(pH5.0/100rpm)

○標準製剤が 15～30 分に平均 85%以上溶出する場合：

標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近となる適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあるか、又は f2 関数の値が 42 以上である。

(pH6.8/50rpm、水/50rpm)

○標準製剤が 30 分以内に平均 85%以上溶出しない場合：

a:規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 85%以上となる
とき、標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあるか、又は f2 関数の値は 42 以上である。

(pH5.0/50rpm)

○標準製剤が 30 分以内に平均 85%以上溶出しない場合：

b:規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 50%以上 85%
に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率
の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間にお
いて試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±12%の範囲にあ
るか、又は f2 関数の値が 46 以上である。

(pH1.2/50rpm)

<結 果>

溶出条件	判定 時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)		平均 溶出率 の差(%)
		ロサルタンカリウム 錠 25mg「杏林」	標準製剤	
pH1.2/50rpm	60	36.6	37.2	-0.6
	120	68.1	72.2	-4.1
pH5.0/50rpm	10	58.4	43.5	+14.9
	60	92.1	84.0	+8.1
pH6.8/50rpm	10	58.4	63.5	-5.1
	15	80.0	79.5	+0.5
水/50rpm	10	65.7	64.6	+1.1
	15	86.5	81.3	+5.2
pH5.0/100rpm	15	95.4	96.7	—

IV. 製剤に関する項目

○pH1.2/50rpm

標準製剤が規定された試験時間(120分)における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点(60分)、及び規定された試験時間において試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 12\%$ の範囲内であった。

○pH5.0/50rpm

標準製剤の平均溶出率が40%及び85%付近の適当な2時点(10分、60分)において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 15\%$ の範囲内であった。

○pH6.8/50rpm

標準製剤の平均溶出率が60%及び85%付近となる適当な2時点(10分、15分)において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 15\%$ の範囲内であった。


○水/50rpm

標準製剤の平均溶出率が60%及び85%付近となる適当な2時点(10分、15分)において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 15\%$ の範囲内であった。


○pH5.0/100rpm

試験製剤が15分以内に平均85%以上溶出した。

全ての溶出条件において判定基準に適合したため、標準製剤は試験製剤と溶出挙動が類似していると判定された。



IV. 製剤に関する項目



〔ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」〕

<判定基準>

○標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合：

試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 \pm 15%の範囲にある。

(pH5.0/100rpm)

○標準製剤が 15~30 分に平均 85%以上溶出する場合：

標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近となる適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 \pm 15%の範囲にあるか、又は f_2 関数の値が 42 以上である。

(pH6.8/50rpm、水/50rpm)

○標準製剤が 30 分以内に平均 85%以上溶出しない場合：

a: 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 85%以上となる時、標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 \pm 15%の範囲にあるか、又は f_2 関数の値は 42 以上である。

(pH5.0/50rpm)

○標準製剤が 30 分以内に平均 85%以上溶出しない場合：

b: 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 50%以上 85%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 \pm 12%の範囲にあるか、又は f_2 関数の値が 46 以上である。

(pH1.2/50rpm)

IV. 製剤に関する項目

< 結 果 >

溶出条件	判定 時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)		平均 溶出率 の差(%)
		ロサルタンカリウム 錠 50mg「杏林」	標準製剤	
pH1.2/50rpm	60	23.8	32.0	-8.2
	120	59.1	61.4	-2.3
pH5.0/50rpm	10	45.6	35.3	+10.3
	45	91.1	85.6	+5.5
pH6.8/50rpm	10	49.1	56.0	-6.9
	30	97.3	92.0	+5.3
水/50rpm	10	53.1	54.0	-0.9
	30	98.6	93.0	+5.6
pH5.0/100rpm	15	84.3	92.7	-8.4

○pH1.2/50rpm

標準製剤が規定された試験時間(120分)における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点(60分)、及び規定された試験時間において試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±12%の範囲内であった。

○pH5.0/50rpm

標準製剤の平均溶出率が40%及び85%付近の適当な2時点(10分、45分)において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲内であった。

○pH6.8/50rpm

標準製剤の平均溶出率が60%及び85%付近となる適当な2時点(10分、30分)において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲内であった。

○水/50rpm


標準製剤の平均溶出率が60%及び85%付近となる適当な2時点(10分、30分)において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲内であった。

○pH5.0/100rpm

15分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲内であった。

全ての溶出条件において判定基準に適合したため、標準製剤は試験製剤と溶出挙動が類似していると判定された。

IV. 製剤に関する項目



[ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」]

<判定基準>

○標準製剤が 15～30 分に平均 85%以上溶出する場合：

標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近となる適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 \pm 15%の範囲にあるか、又は f_2 関数の値が 42 以上である。

(pH5.0/100rpm)

○標準製剤が 30 分以内に平均 85%以上溶出しない場合：

a: 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 85%以上となる時、標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 \pm 15%の範囲にあるか、又は f_2 関数の値は 42 以上である。

(pH5.0/50rpm、pH6.8/50rpm、水/50rpm)

○標準製剤が 30 分以内に平均 85%以上溶出しない場合：

b: 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 50%以上 85%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率

IV. 製剤に関する項目

の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 12\%$ の範囲にあるか、又は f_2 関数の値が 46 以上である。

(pH1.2/50rpm)

<結 果>

溶出条件	判定 時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)		平均 溶出率 の差(%)
		ロサルタンカリウム 錠 100mg「杏林」	標準製剤	
pH1.2/50rpm	60	20.8	22.1	-1.3
	120	58.8	52.2	+6.6
pH5.0/50rpm	10	34.2	30.9	+3.3
	45	89.8	85.7	+4.1
pH6.8/50rpm	10	37.6	47.8	-10.2
	30	86.9	83.6	+3.3
水/50rpm	10	38.2	48.7	-10.5
	30	86.4	84.4	+2.0
pH5.0/100rpm	10	48.4	52.9	-4.5
	15	71.7	83.8	-12.1

○pH1.2/50rpm

標準製剤が規定された試験時間(120分)における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点(60分)、及び規定された試験時間において試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 12\%$ の範囲内であった。

○pH5.0/50rpm

標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の適当な 2 時点(10分、45分)において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 15\%$ の範囲内であった。

○pH6.8/50rpm

標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の適当な 2 時点(10分、30分)において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 15\%$ の範囲内であった。

○水/50rpm

標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の適当な 2 時点(10分、30分)において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 15\%$ の範囲内であった。


○pH5.0/100rpm

標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近となる適当な 2 時点(10分、15分)において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 15\%$

IV. 製剤に関する項目

の範囲内であった。

全ての溶出条件において判定基準に適合したため、標準製剤は試験製剤と溶出挙動が類似していると判定された。



【公的溶出規格への適合性】

ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」、ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」及びロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」は、日本薬局方医薬品各条に定められたロサルタンカリウム錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

〔ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」〕

試験条件：水 900mL、パドル法、毎分 50 回転

溶出規格：45 分間 85%以上

30 分間の溶出率（3 ロットの最小値～最大値）：92.1%～103.4%

〔ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」〕

試験条件：水 900mL、パドル法、毎分 50 回転

溶出規格：45 分間 85%以上

30 分間の溶出率（3 ロットの最小値～最大値）：90.5%～101.4%

IV. 製剤に関する項目

	<p>[ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」] 試験条件：水 900mL、パドル法、毎分 75 回転 溶出規格：30 分間 85%以上 15 分間の溶出率（3 ロットの最小値～最大値）：86.4%～99.4%</p>
8. 生物学的試験法	該当しない
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	日本薬局方「ロサルタンカリウム錠」の確認試験による。 薄層クロマトグラフィー
10. 製剤中の有効成分の定量法	日本薬局方「ロサルタンカリウム錠」の定量法による。 液体クロマトグラフィー
11. カ価	該当しない
12. 混入する可能性のある夾雑物	イミダゾール環部とテトラゾール環部との 2 分子縮合体(2 種)、イミダゾール環部間での 2 分子縮合体(1 種)
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	特になし
14. その他	特になし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

1. 高血圧症
2. 高血圧及び蛋白尿を伴う 2 型糖尿病における糖尿病性腎症

<効能・効果に関連する使用上の注意>

高血圧及び蛋白尿を伴う 2 型糖尿病における糖尿病性腎症の場合

高血圧及び蛋白尿（尿中アルブミン／クレアチニン比 300mg／g 以上）を合併しない患者における本剤の有効性及び安全性は確認されていない。

2. 用法及び用量

1. 高血圧症
通常、成人にはロサルタンカリウムとして 25～50mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1 日 100mg まで増量できる。
2. 高血圧及び蛋白尿を伴う 2 型糖尿病における糖尿病性腎症
通常、成人にはロサルタンカリウムとして 50mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、血圧値をみながら 1 日 100mg まで増量できる。ただし、過度の血圧低下を起こすおそれのある患者等では 25mg から投与を開始する。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

高血圧及び蛋白尿を伴う 2 型糖尿病における糖尿病性腎症に対して、本剤を投与後、血清クレアチニン値が前回の検査値と比較して 30%（あるいは 1mg／dL）以上増加した場合、及び糸球体ろ過値、1／血清クレアチニン値の勾配等で評価した腎機能障害の進展速度が加速された場合は、減量あるいは投与中止を考慮すること。

3. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

(2) 臨床効果

該当資料なし

(3) 臨床薬理試験

該当資料なし

(4) 探索的試験

該当資料なし

(5) 検証的試験

1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

V. 治療に関する項目

2) 比較試験	該当資料なし
3) 安全性試験	該当資料なし
4) 患者・病態別試験	該当資料なし
(6) 治療的使用	
1) 使用成績調査・特定 使用成績調査（特別 調査）・製造販売後 臨床試験（市販後臨 床試験）	該当資料なし
2) 承認条件として実 施予定の内容又は 実施した試験の概 要	該当しない

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬： カンデサルタン シレキセチル、バルサルタン、テルミサルタン、オルメサルタン メドキシミル、イルベサルタン
2. 薬理作用	
(1) 作用部位・作用機序 ¹⁾	アンジオテンシンⅡ受容体のうち AT ₁ 受容体と選択的に結合し、アンジオテンシンⅡの生理作用を阻害することによって降圧作用を現す。本薬の主代謝物のカルボン酸体も本薬と同様の作用を示す。なお、ブラジキニンの分解酵素(キニナーゼⅡ)には直接作用しない。
(2) 薬効を裏付ける試験成績	該当資料なし
(3) 作用発現時間・持続時間	該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間

VII. 薬物動態に関する項目、1. 血中濃度の推移・測定法(3)臨床試験で確認された血中濃度の項を参照

(3) 臨床試験で確認された血中濃度⁷⁾

【生物学的同等性試験】


後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(薬食審査発第 1124004 号 平成 18 年 11 月 24 日)に従い、健康成人男子を対象に生物学的同等性試験を実施した。

ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」、ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」、ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」と各標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (ロサルタンカリウムとして 25mg、50mg、100mg) 健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。

【ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」】

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0→12} (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」	202±64	83.1±50.0	1.90±1.45	2.03±0.41
標準製剤 (錠剤、25mg)	198±69	85.4±51.7	1.44±0.88	2.07±0.33

(Mean±S. D., n=24)




VII. 薬物動態に関する項目

〔ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」〕

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0→12} (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ロサルタン カリウム錠 50mg「杏林」	503±193	257±149	1.35±0.88	1.79±0.22
標準製剤 (錠剤、50mg)	501±200	253±150	1.70±1.22	1.81±0.20


(Mean±S.D., n=22)



〔ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」〕

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0→12} (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ロサルタン カリウム錠 100mg「杏林」	1014±260	568±178	1.45±0.86	1.67±0.19
標準製剤 (錠剤、100mg)	1086±318	593±224	1.67±1.05	1.66±0.16

(Mean±S.D., n=24)



血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

VII. 薬物動態に関する項目

(4) 中毒域	該当資料なし
(5) 食事・併用薬の影響	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、7. 相互作用の項を参照
(6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因	該当資料なし
2. 薬物速度論的パラメータ	
(1) 解析方法	該当資料なし
(2) 吸収速度定数	該当資料なし
(3) バイオアベイラビリティ	該当資料なし
(4) 消失速度定数 ⁷⁾	ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」 : 0.355 ± 0.080 (hr ⁻¹) (n=24) ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」 : 0.393 ± 0.050 (hr ⁻¹) (n=22) ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」 : 0.420 ± 0.048 (hr ⁻¹) (n=24)
(5) クリアランス	該当資料なし
(6) 分布容積	該当資料なし
(7) 血漿蛋白結合率	該当資料なし
3. 吸収	該当資料なし
4. 分布	
(1) 血液-脳関門通過性	該当資料なし
(2) 血液-胎盤関門通過性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(1)の項を参照

VII. 薬物動態に関する項目

(3) 乳汁への移行性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(2)の項を参照
(4) 髄液への移行性	該当資料なし
(5) その他の組織への移行性	該当資料なし
5. 代謝	
(1) 代謝部位及び代謝経路 ¹⁾	主に肝臓
(2) 代謝に関与する酵素(CYP450等)の分子種	主に薬物代謝酵素チトクローム P450 2C9(CYP2C9)により活性代謝物であるカルボン酸体に代謝される。
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	該当資料なし
(4) 代謝物の活性の有無及び比率 ¹⁾	主代謝物は活性代謝物であるカルボン酸体である。
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	該当資料なし
6. 排泄	
(1) 排泄部位及び経路	該当資料なし
(2) 排泄率 ¹⁾	健康成人にロサルタンカリウム 25、50、100 又は 200mg を 1 回経口投与した場合、投与後 30 時間までのロサルタン及びカルボン酸体の尿中排泄率は各投与量のそれぞれ 3.2~4.1%及び 6.1~7.9%であった。
(3) 排泄速度	該当資料なし
7. トランスポーターに関する情報	該当資料なし
8. 透析等による除去率	該当資料なし

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由	該当しない
2. 禁忌内容とその理由 (原則禁忌を含む)	<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照） 3. 重篤な肝障害のある患者（「慎重投与」の項参照） 4. アリスキレンを投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）[非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている]（「重要な基本的注意」の項参照）
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	V. 治療に関する項目、1. 効能又は効果<効能・効果に関連する使用上の注意>の項を参照
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	V. 治療に関する項目、2. 用法及び用量<用法・用量に関連する使用上の注意>の項を参照
5. 慎重投与内容とその理由	<p>慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者（「重要な基本的注意」の項参照） (2) 高カリウム血症の患者（「重要な基本的注意」の項参照） (3) 重篤な腎機能障害のある患者 [高カリウム血症があらわれやすい。また、腎機能の悪化が起きるおそれがあるので、血清クレアチニンが2.5mg/dL 以上の場合には、投与量を減らすなど慎重に投与すること。（「重要な基本的注意」の項参照）] (4) 肝機能障害又はその既往のある患者 [外国において、健康成人と比較して軽・中等度のアルコール性肝硬変患者ではロサルタンの消失速度が遅延し、ロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度がそれぞれ約5倍及び約2倍に上昇することが報告されている。] (5) 脳血管障害のある患者 [過度の降圧が脳血流不全を惹起し、病態を悪化させるおそれがある。] (6) 体液量が減少している患者（利尿降圧剤投与中、厳重な減塩療法中、血液透析中）（「重要な基本的注意」の項参照）

Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

(7) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

重要な基本的注意

- (1) 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者においては、腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。
- (2) 高カリウム血症の患者においては、高カリウム血症を増悪させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現するおそれがあるので、血清カリウム値に注意すること。
- (3) アリスキレンを併用する場合、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。なお、eGFR が 60mL/min/1.73m² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンとの併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。
- (4) 本剤の投与によって、一過性の血圧低下（ショック症状、意識消失、呼吸困難等を伴う）を起こすおそれがあるので、そのような場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。また、本剤投与中は定期的（投与開始時：2週間ごと、安定後：月1回程度）に血圧のモニタリングを実施すること。特に次の患者では投与は少量より開始し、増量する場合は患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。
 - ア．利尿降圧剤投与中の患者
 - イ．嚴重な減塩療法中の患者
 - ウ．血液透析中の患者
- (5) 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- (6) 手術前 24 時間は投与しないことが望ましい。
- (7) 本剤を含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬投与中にまれに肝炎等の重篤な肝障害があらわれたとの報告がある。肝機能検査を実施するなど、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- (8) 2 型糖尿病における糖尿病性腎症の患者では貧血があらわれやすいので、本剤投与中は定期的（投与開始時：2週間ごと、安定後：月1回程度）に血液検査を実施するなど観察を十分に行い、異常が認められた

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

場合には貧血の原因を考慮し、適切な処置を行うこと。

- (9) 2 型糖尿病における糖尿病性腎症の患者では血清カリウム上昇及び血清クレアチニン上昇があらわれやすいので、本剤投与中は定期的（投与開始時：2 週間ごと、安定後：月 1 回程度）に血清カリウム値及び血清クレアチニン値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。血清カリウム値及び血清クレアチニン値に異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。特に、本剤とアンジオテンシン変換酵素阻害剤を併用した場合、急性腎障害、高カリウム血症のリスクが増加するとの報告があるため、本剤とアンジオテンシン変換酵素阻害剤を併用する際には注意すること。

7. 相互作用

本剤は、薬物代謝酵素チトクローム P450 2C9 (CYP2C9) 及び 3A4 (CYP3A4) により活性代謝物であるカルボン酸体に代謝される。

(1) 併用禁忌とその理由

該当しない

(2) 併用注意とその理由

【併用注意】（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤 スピロラクトン トリアムテレン等 カリウム補給剤 塩化カリウム アンジオテンシン変換 酵素阻害剤 トリメトプリム含有製 剤 スルファメトキサゾ ール・トリメトプリム	血清カリウム上昇、高カリウム血症を起こすおそれがある。	併用によりカリウム貯留作用が増強するおそれがある。腎機能障害のある患者には特に注意すること。 また、本剤とアンジオテンシン変換酵素阻害剤及びカリウム保持性利尿剤の3剤併用の場合には特に注意すること。
アリスキレン	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、腎機能、血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。なお、eGFR が	併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

	60mL/min/1.73m ² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンとの併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。	
アンジオテンシン変換酵素阻害剤	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、腎機能、血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。	
非ステロイド性消炎鎮痛剤 インドメタシン等	本剤の降圧作用が減弱されるおそれがある。	プロスタグランジンの合成阻害作用により、本剤の降圧作用を減弱させる可能性がある。
	腎機能が悪化している患者では、さらに腎機能が悪化するおそれがある。	プロスタグランジンの合成阻害作用により、腎血流量が低下するためと考えられる。
リチウム 炭酸リチウム	リチウム中毒が報告されているので、血中リチウム濃度に注意すること。	本剤のナトリウム排泄作用により、リチウムの蓄積が起これら考えられている。
グレープフルーツジュース	降圧作用が減弱されるおそれがある。本剤の投与中はグレープフルーツジュースの摂取は避けること。	グレープフルーツジュースに含まれる成分のCYP3A4 阻害作用によりロサルタンの活性代謝物の血中濃度が低下するため、本剤の降圧作用が減弱されるおそれがある。

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

8. 副作用

(1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(2) 重大な副作用と初期症状

重大な副作用

次のような副作用があらわれることがあるので、症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- 1) **アナフィラキシー**（頻度不明）：不快感、口内異常感、発汗、蕁麻疹、呼吸困難、全身潮紅、浮腫等が症状としてあらわれることがあるので観察を十分に行うこと。
- 2) **血管浮腫**（頻度不明）：顔面、口唇、咽頭、舌等の腫脹が症状としてあらわれることがあるので観察を十分に行うこと。
- 3) **急性肝炎または劇症肝炎**（頻度不明）
- 4) **腎不全**（頻度不明）
- 5) **ショック、失神、意識消失**（頻度不明）：ショック、血圧低下に伴う失神、意識消失があらわれることがあるので、観察を十分に行い、冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。特に血液透析中、嚴重な減塩療法中、利尿降圧剤投与中の患者では低用量から投与を開始し、増量する場合は患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。
- 6) **横紋筋融解症**（頻度不明）：筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。
- 7) **高カリウム血症**（頻度不明）：重篤な高カリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
- 8) **不整脈**（頻度不明）：心室性期外収縮、心房細動等の不整脈があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
- 9) **汎血球減少、白血球減少、血小板減少**（頻度不明）：汎血球減少、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
- 10) **低血糖**（頻度不明）：低血糖があらわれることがある（糖尿病治療中の患者であらわれやすい）ので、観察を十分に行い、脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合に

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

	<p>は、投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>11) 低ナトリウム血症（頻度不明）：う怠感、食欲不振、嘔気、嘔吐、痙攣、意識障害等を伴う低ナトリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど、直ちに適切な処置を行うこと。</p>																		
(3) その他の副作用	<p>その他の副作用</p> <p>次のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</p> <table border="1" data-bbox="486 772 1428 1512"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>副作用（頻度不明）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>精神神経系</td> <td>頭痛、めまい、耳鳴、眠気、不眠、浮遊感</td> </tr> <tr> <td>循環器系</td> <td>低血圧、調律障害（頻脈等）、起立性低血圧、胸痛、動悸</td> </tr> <tr> <td>消化器</td> <td>口内炎、口角炎、胃不快感、胃潰瘍、下痢、嘔吐・嘔気、口渇</td> </tr> <tr> <td>肝臓</td> <td>肝機能障害（AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、LDH上昇等）、黄疸</td> </tr> <tr> <td>腎臓</td> <td>BUN上昇、クレアチニン上昇</td> </tr> <tr> <td>皮膚</td> <td>多形紅斑、紅皮症、発疹、光線過敏、紅斑、そう痒、蕁麻疹</td> </tr> <tr> <td>血液</td> <td>貧血、赤血球減少、ヘマトクリット低下、好酸球増多</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>勃起不全、咳嗽、発熱、ほてり、味覚障害、しびれ感、眼症状（かすみ、異和感等）、倦怠感、無力症／疲労、浮腫、関節痛、筋痙攣、筋肉痛、総コレステロール上昇、CK(CPK)上昇、血中尿酸値上昇、女性化乳房</td> </tr> </tbody> </table>	分類	副作用（頻度不明）	精神神経系	頭痛、めまい、耳鳴、眠気、不眠、浮遊感	循環器系	低血圧、調律障害（頻脈等）、起立性低血圧、胸痛、動悸	消化器	口内炎、口角炎、胃不快感、胃潰瘍、下痢、嘔吐・嘔気、口渇	肝臓	肝機能障害（AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、LDH上昇等）、黄疸	腎臓	BUN上昇、クレアチニン上昇	皮膚	多形紅斑、紅皮症、発疹、光線過敏、紅斑、そう痒、蕁麻疹	血液	貧血、赤血球減少、ヘマトクリット低下、好酸球増多	その他	勃起不全、咳嗽、発熱、ほてり、味覚障害、しびれ感、眼症状（かすみ、異和感等）、倦怠感、無力症／疲労、浮腫、関節痛、筋痙攣、筋肉痛、総コレステロール上昇、CK(CPK)上昇、血中尿酸値上昇、女性化乳房
分類	副作用（頻度不明）																		
精神神経系	頭痛、めまい、耳鳴、眠気、不眠、浮遊感																		
循環器系	低血圧、調律障害（頻脈等）、起立性低血圧、胸痛、動悸																		
消化器	口内炎、口角炎、胃不快感、胃潰瘍、下痢、嘔吐・嘔気、口渇																		
肝臓	肝機能障害（AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、LDH上昇等）、黄疸																		
腎臓	BUN上昇、クレアチニン上昇																		
皮膚	多形紅斑、紅皮症、発疹、光線過敏、紅斑、そう痒、蕁麻疹																		
血液	貧血、赤血球減少、ヘマトクリット低下、好酸球増多																		
その他	勃起不全、咳嗽、発熱、ほてり、味覚障害、しびれ感、眼症状（かすみ、異和感等）、倦怠感、無力症／疲労、浮腫、関節痛、筋痙攣、筋肉痛、総コレステロール上昇、CK(CPK)上昇、血中尿酸値上昇、女性化乳房																		
(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧	該当資料なし																		
(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度	該当資料なし																		

Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法	<p>(1) 禁忌（次の患者には投与しないこと） 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>(2) 重大な副作用 症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。 アナフィラキシー（頻度不明）：不快感、口内異常感、発汗、蕁麻疹、呼吸困難、全身潮紅、浮腫等が症状としてあらわれることがあるので観察を十分に行うこと。</p>
9. 高齢者への投与	<p>(1) 高齢者では一般に生理機能が低下しているので、患者の状態に注意すること。</p> <p>(2) 高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされている（脳梗塞等が起こるおそれがある）ので、低用量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。</p> <p>(3) 高齢者での体内薬物動態試験で、ロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度が非高齢者に比べて高くなることが認められている（非高齢者に比較してロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度がそれぞれ約 2 倍及び約 1.3 倍に上昇）。</p> <p>(4) 高齢者と非高齢者との間で降圧効果及び副作用の発現に関する差異は認められていない。</p>
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	<p>(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。また、投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。[妊娠中期及び末期に本剤を含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を投与された高血圧症の患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、多臓器不全、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の奇形、頭蓋顔面の奇形、肺の発育不全等があらわれたとの報告がある。]</p> <p>(2) 本剤投与中は授乳を中止させること。[動物実験（ラット）で乳汁中へ移行することが報告されている。]</p> <p>（参考） ラットの周産期及び授乳期に 10～100mg/kg/日投与した試験において、100mg/kg/日で産児死亡の軽度の増加が認められた。また、各投与群で産児の低体重が認められ、本試験の無毒性量は追加試験の成績から 5mg/kg/日であった。</p>
11. 小児等への投与	小児等に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

12. 臨床検査結果に及ぼす影響	該当資料なし
13. 過量投与	該当資料なし
14. 適用上の注意	<p>薬剤交付時:PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]</p>
15. その他の注意	該当しない
16. その他	特になし

Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験	
(1) 薬効薬理試験（「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照）	
(2) 副次的薬理試験	該当資料なし
(3) 安全性薬理試験	該当資料なし
(4) その他の薬理試験	該当資料なし
2. 毒性試験	
(1) 単回投与毒性試験	該当資料なし
(2) 反復投与毒性試験	該当資料なし
(3) 生殖発生毒性試験	該当資料なし
(4) その他の特殊毒性	該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分	製剤	ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」	処方箋医薬品 ^{注)}
		ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」	処方箋医薬品 ^{注)}
		ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」	処方箋医薬品 ^{注)}
	有効成分	ロサルタンカリウム	該当しない
	注) 注意－医師等の処方箋により使用すること		
2. 有効期間又は使用期限	使用期限：3年（安定性試験結果に基づく ²⁾ ）		
3. 貯法・保存条件	室温保存（開封後は湿気を避けて保存すること）		
4. 薬剤取扱い上の注意点			
(1) 薬局での取り扱い上の留意点について	特になし		
(2) 薬剤交付時の取り扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）	Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目、14. 適用上の注意の項を参照 くすりのしおり：有り		
(3) 調剤時の留意点について	特になし		
5. 承認条件等	該当しない		
6. 包装	ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」	PTP：100錠、500錠	
	ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」	PTP：100錠、500錠	
	ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」	PTP：100錠	
7. 容器の材質	〔PTP包装品〕 PTP包装：ポリ塩化ビニルフィルム及びアルミニウム箔 ピロー包装：ポリエチレンテレフタレートポリラミネート蒸着フィルム 紙箱		

X. 管理的事項に関する項目

8. 同一成分・同効薬	<p>同一成分薬：ニューロタン錠 25mg、ニューロタン錠 50mg、ニューロタン錠 100mg</p> <p>同 効 薬：アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬： カンデサルタン シレキセチル、バルサルタン、テルミサルタン、 オルメサルタン メドキシミル、イルベサルタン</p>												
9. 国際誕生年月日	1994年 9月 2日												
10. 製造販売承認年月日 及び承認番号	<table border="1"> <thead> <tr> <th>販売名</th> <th>製造販売承認年月日</th> <th>承認番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」</td> <td>2012年 2月 15日</td> <td>22400AMX00557000</td> </tr> <tr> <td>ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」</td> <td>2012年 2月 15日</td> <td>22400AMX00558000</td> </tr> <tr> <td>ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」</td> <td>2012年 2月 15日</td> <td>22400AMX00559000</td> </tr> </tbody> </table>	販売名	製造販売承認年月日	承認番号	ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」	2012年 2月 15日	22400AMX00557000	ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」	2012年 2月 15日	22400AMX00558000	ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」	2012年 2月 15日	22400AMX00559000
販売名	製造販売承認年月日	承認番号											
ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」	2012年 2月 15日	22400AMX00557000											
ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」	2012年 2月 15日	22400AMX00558000											
ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」	2012年 2月 15日	22400AMX00559000											
11. 薬価基準収載年月日	<table border="1"> <thead> <tr> <th>販売名</th> <th>薬価基準収載年月日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」</td> <td>2012年 6月 22日</td> </tr> <tr> <td>ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」</td> <td>2012年 6月 22日</td> </tr> <tr> <td>ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」</td> <td>2012年 6月 22日</td> </tr> </tbody> </table>	販売名	薬価基準収載年月日	ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」	2012年 6月 22日	ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」	2012年 6月 22日	ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」	2012年 6月 22日				
販売名	薬価基準収載年月日												
ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」	2012年 6月 22日												
ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」	2012年 6月 22日												
ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」	2012年 6月 22日												
12. 効能又は効果追加、 用法及び用量変更追 加等の年月日及びそ の内容	<p>一部変更承認年月日：2012年 7月 18日</p> <p>内容：以下の効能・効果、用法・用量の追加</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="494 1512 726 1601">【効能・効果】</td> <td data-bbox="734 1512 1436 1601">高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症</td> </tr> <tr> <td data-bbox="494 1612 726 1792">【用法・用量】</td> <td data-bbox="734 1612 1436 1792">通常、成人にはロサルタンカリウムとして50mgを1日1回経口投与する。なお、血圧値をみながら1日100mgまで増量できる。ただし、過度の血圧低下を起こすおそれのある患者等では25mgから投与を開始する。</td> </tr> </table>	【効能・効果】	高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症	【用法・用量】	通常、成人にはロサルタンカリウムとして50mgを1日1回経口投与する。なお、血圧値をみながら1日100mgまで増量できる。ただし、過度の血圧低下を起こすおそれのある患者等では25mgから投与を開始する。								
【効能・効果】	高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症												
【用法・用量】	通常、成人にはロサルタンカリウムとして50mgを1日1回経口投与する。なお、血圧値をみながら1日100mgまで増量できる。ただし、過度の血圧低下を起こすおそれのある患者等では25mgから投与を開始する。												
13. 再審査結果、再評価 結果公表年月日及び その内容	該当しない												

X. 管理的事項に関する項目

14. 再審査期間	該当しない																		
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。																		
16. 各種コード	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 544 756 689">販売名</th> <th data-bbox="756 544 986 689">HOT(9桁)番号</th> <th data-bbox="986 544 1214 689">厚生労働省薬価 基準収載医薬品 コード</th> <th data-bbox="1214 544 1444 689">レセプト 電算コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 689 756 786">ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」</td> <td data-bbox="756 689 986 786">121760501</td> <td data-bbox="986 689 1214 786">2149039F1252</td> <td data-bbox="1214 689 1444 786">622176001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 786 756 882">ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」</td> <td data-bbox="756 786 986 882">121761201</td> <td data-bbox="986 786 1214 882">2149039F2259</td> <td data-bbox="1214 786 1444 882">622176101</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 882 756 981">ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」</td> <td data-bbox="756 882 986 981">121762901</td> <td data-bbox="986 882 1214 981">2149039F3247</td> <td data-bbox="1214 882 1444 981">622176201</td> </tr> </tbody> </table>			販売名	HOT(9桁)番号	厚生労働省薬価 基準収載医薬品 コード	レセプト 電算コード	ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」	121760501	2149039F1252	622176001	ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」	121761201	2149039F2259	622176101	ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」	121762901	2149039F3247	622176201
販売名	HOT(9桁)番号	厚生労働省薬価 基準収載医薬品 コード	レセプト 電算コード																
ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」	121760501	2149039F1252	622176001																
ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」	121761201	2149039F2259	622176101																
ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」	121762901	2149039F3247	622176201																
17. 保険給付上の注意	本剤は診療報酬上の後発医薬品である。																		

XI. 文献

1. 引用文献	<ol style="list-style-type: none">1) 第十七改正日本薬局方解説書, C-6013 (廣川書店 2016)2) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」・50mg「杏林」・100mg「杏林」の安定性試験に関する資料3) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」の無包装状態での安定性に関する資料4) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: ロサルタンカリウム錠 50mg「杏林」の無包装状態での安定性に関する資料5) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: ロサルタンカリウム錠 100mg「杏林」の無包装状態での安定性に関する資料6) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」・50mg「杏林」・100mg「杏林」の溶出性に関する資料7) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: ロサルタンカリウム錠 25mg「杏林」・50mg「杏林」・100mg「杏林」の生物学的同等性試験に関する資料
2. その他の参考文献	該当資料なし

XII. 参考資料

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. 主な外国での発売状況 | 該当しない |
| 2. 海外における臨床支援情報 | 該当資料なし |

XII. 備考

1. その他の関連資料

該当資料なし