

※※印：2022年12月改訂(第19版、承継に伴う改訂)  
※印：2020年11月改訂

日本標準商品分類番号
871124 871139

貯法：室温保存
使用期限：外装に表示の使用期限内に使用すること。
注意：【 <b>取扱い上の注意</b> 】の項参照
規制区分：向精神薬、習慣性医薬品、処方箋医薬品 (注意－習慣性あり) (注意－医師等の処方箋により使用すること)

承認番号	22500AMX01282000
※※ 薬価収載	2022年12月
販売開始	1978年 6月
再評価結果	1997年 6月
再評価結果 (品質再評価)	2003年 9月

睡眠誘導剤、抗痙攣剤

# ※※ **ニトラゼパム錠5mg「NIG」**

## Nitrazepam Tab.

### ニトラゼパム錠

#### 【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 急性閉塞隅角緑内障の患者 [抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある]
- 重症筋無力症の患者 [重症筋無力症の症状を悪化させるおそれがある]

#### 【原則禁忌(次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)】

肺性心、肺気腫、気管支喘息及び脳血管障害の急性期等で呼吸機能が高度に低下している場合 [炭酸ガスナルコーススを起こしやすい] (【副作用】の項参照)

#### 【組成・性状】

組成	1錠中：ニトラゼパム ……………5mg (添加物) アルファー化デンブン、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、部分アルファー化デンブン		
性状	白色の素錠		
識別コード(PTP)	t 162 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5 mg</span>		
外形(サイズ)	表(直径mm)  8.4	裏(重量mg)  100	側面(厚さmm)  3.6

#### 【効能・効果】

- 不眠症
- 麻酔前投薬
- 異型小発作群  
點頭てんかん、ミオクロヌス発作、失立発作等  
焦点性発作  
焦点性痙攣発作、精神運動発作、自律神経発作等

#### 【用法・用量】

- 不眠症に用いる場合  
通常、成人にはニトラゼパムとして1回5～10mgを就寝前に経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。
- 麻酔前投薬の場合  
通常、成人にはニトラゼパムとして1回5～10mgを就寝前または手術前に経口投与する。なお、年齢・症状・疾患により適宜増減する。
- 抗てんかん剤として用いる場合  
通常、成人・小児ともニトラゼパムとして1日5～15mgを適宜分割投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。

#### 【用法・用量に関連する使用上の注意】

不眠症には、就寝の直前に服用させること。また、服用して就寝した後、睡眠途中において一時的に起床して仕事等をする可能性があるときは服用させないこと。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 衰弱者 [作用が強くあらわれる]
- 高齢者 (【**高齢者への投与**】の項参照)
- 心障害のある患者 [心障害が悪化するおそれがある]
- 肝障害、腎障害のある患者 [肝障害、腎障害のある患者では一般に排泄が遅延する傾向があるので、薬物の体内蓄積による副作用の発現に注意すること]
- 脳に器質的障害のある患者 [作用が強くあらわれる]

##### 2. 重要な基本的注意

- 本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中度・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、**自動車の運転等危険を伴う機械の操作**に従事させないように注意すること。
- 連用により薬物依存を生じることがあるので、抗てんかん剤として用いる場合以外は、漫然とした継続投与による長期使用を避けること。本剤の投与を継続する場合には、治療上の必要性を十分に検討すること。(【**重大な副作用**】の項参照)

##### 3. 相互作用

##### 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アルコール 中枢神経抑制剤 フェノチアジン誘導体 バルビツール酸誘導体 等	中枢神経抑制作用が増強されることがあるので併用しないことが望ましい。やむを得ず併用する場合には慎重に投与すること。	共に中枢神経抑制作用を有する。
MAO阻害剤	中枢神経抑制作用が増強されることがあるので併用しないことが望ましい。やむを得ず併用する場合には慎重に投与すること。	本剤の代謝が抑制される。
シメチジン	本剤の中枢神経抑制作用が増強されるおそれがある。	本剤の代謝が抑制される。

##### 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

##### (1) 重大な副作用(頻度不明)

- 呼吸抑制、炭酸ガスナルコースス** 呼吸抑制があらわれることがある。また、呼吸機能が高度に低下している患者に投与した場合、炭酸ガスナルコーススを起こすことがあるので、このような場合には気道を確保し、換気を図るなど適切な処置を行うこと。
- 依存性** 連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び使用期間に注意し慎重に投与すること。また、連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、痙攣発作、せん妄、振戦、不眠、不安、幻覚、妄想等の離脱症状があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。
- 刺激興奮、錯乱** 刺激興奮、錯乱等があらわれることがある。

4) **肝機能障害、黄疸** AST (GOT)、ALT (GPT)、 $\gamma$ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(2) **重大な副作用(類薬)**

**一過性前向き健忘、もうろう状態** 類薬(他の不眠症治療薬)において、一過性前向き健忘、また、もうろう状態があらわれることがあるので、本剤を投与する場合には少量から開始するなど、慎重に行うこと。なお、類薬において、十分に覚醒しないまま、車の運転、食事等を行い、その出来事を記憶していないとの報告がある。異常が認められた場合には投与を中止すること。

(3) **その他の副作用**

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、そう痒感等
精神神経系	ふらつき、歩行失調、眠気・残眠感、頭痛・頭重感、めまい、不安、見当識障害、興奮、不機嫌、不快感、多幸症等
循環器 <sup>注2)</sup>	軽度の血圧低下、徐脈傾向
消化器	食欲不振、便秘、口渇、悪心・嘔吐、下痢等
骨格筋	倦怠感等の筋緊張低下症状
その他	覚醒遅延傾向 <sup>注2)</sup> 、夜尿・頻尿、発熱等

注1) 症状があらわれた場合には投与を中止すること。

注2) 麻酔前投薬として用いた場合。

5. **高齢者への投与**

高齢者では、運動失調等の副作用が発現しやすいので少量から投与を開始するなど慎重に投与すること。

6. **妊婦、産婦、授乳婦等への投与**

- 妊婦(3ヵ月以内)又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中に他のベンゾジアゼピン系薬剤の投与を受けた患者の中に、奇形を有する児等の障害児を出産した例が対照群と比較して有意に多いとの疫学的調査報告がある]
- 妊娠後期の婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[ベンゾジアゼピン系薬剤で新生児に哺乳困難、嘔吐、活動低下、筋緊張低下、過緊張、嗜眠、傾眠、呼吸抑制・無呼吸、チアノーゼ、易刺激性、神経過敏、振戦、低体温、頻脈等を起こすことが報告されている。なお、これらの症状は、離脱症状あるいは新生児仮死として報告される場合もある。また、ベンゾジアゼピン系薬剤で新生児に黄疸の増強を起こすことが報告されている。]
- 分娩前に連用した場合、出産後新生児に離脱症状があらわれることが、ベンゾジアゼピン系薬剤で報告されている。
- 授乳婦への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は授乳を避けさせること。[ヒト母乳中へ移行し、新生児に嗜眠、体重減少等を起こすことが他のベンゾジアゼピン系薬剤(ジアゼパム)で報告されており、また黄疸を増強する可能性がある]
- ラットでの試験[50、100、200mg/kg強制経口投与、妊娠8~14日(7日間)]において、50mg/kg投与群で内臓変異(仮性水腎症等)の発現率の増加がみられ、100mg/kg投与群で外形異常(水頭症、小眼症、小耳症、尾の異常等)及び骨格異常(頸椎弓異常等)の発現率の増加がみられた。また、100及び200mg/kg投与群で胎児死亡率の増加がみられた。

7. **過量投与**

本剤の過量投与が明白又は疑われた場合の処置としてフルマゼニル(ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤)を投与する場合には、使用前にフルマゼニルの使用上の注意(禁忌、慎重投与、相互作用等)を必ず読むこと。

8. **適用上の注意**

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている)

9. **その他の注意**

投与した薬剤が特定されないままにフルマゼニル(ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤)を投与された患者で、新たに本剤を投与する場合、本剤の鎮静・抗痙攣作用が変化、遅延するおそれがある。

**【抗てんかん剤として用いる場合には、下記事項にも注意すること】**

1. **慎重投与**(次の患者には慎重に投与すること)

脳に老年性変化のある患者 [作用が強くなる]

2. **副作用**

	頻度不明
精神神経系	傾眠
呼吸器 <sup>注)</sup>	気道分泌過多(重症脳障害のある患者に用いた場合)
消化器 <sup>注)</sup>	嚥下障害(重症脳障害のある患者に用いた場合)
中枢神経系 <sup>注)</sup>	大発作の回数増加(大発作てんかんを伴う患者に用いた場合)

注) 症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。

3. **小児等への投与**

乳児、幼児又は小児では、気道分泌過多、嚥下障害を起こすことがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

4. **その他の注意**

- 長期間ベンゾジアゼピン系薬剤(クロナゼパム)を投与されているてんかん患者に、フルマゼニル(ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤)を投与して痙攣発作を誘発したとの報告がある。
- 海外で実施された複数の抗てんかん薬における、てんかん、精神疾患等を対象とした199のプラセボ対照臨床試験の検討結果において、自殺念慮及び自殺企図の発現のリスクが、抗てんかん薬の服用群でプラセボ群と比較して約2倍高く(抗てんかん薬服用群：0.43%、プラセボ群：0.24%)、抗てんかん薬の服用群では、プラセボ群と比べ1000人あたり1.9人多いと計算された(95%信頼区間：0.6-3.9)。また、てんかん患者のサブグループでは、プラセボ群と比べ1000人あたり2.4人多いと計算されている。

**【薬物動態】**

1. **血中濃度(参考)<sup>1)</sup>**

ニトラゼパム錠5mg[N I G]を2錠(ニトラゼパムとして10mg)イヌに経口投与したとき、未変化体は投与後約2時間で最高血中濃度に達し、消失半減期は約2.4時間であった。

2. **溶出性<sup>2)</sup>**

ニトラゼパム錠5mg[N I G]の溶出性は、日本薬局方外医薬品規格第3部に定められた規格に適合していることが確認されている。

**【薬効薬理】<sup>3)</sup>**

GABA<sub>A</sub>受容体のサブユニットに存在するベンゾジアゼピン結合部位に結合することにより、抑制性伝達物質GABAの受容体親和性を高め、Cl<sup>-</sup>チャンネル開口作用を増強して神経機能抑制作用を促進する。

**【有効成分に関する理化学的知見】**

一般名：ニトラゼパム(Nitrazepam)

化学名：7-Nitro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one


分子式：C<sub>15</sub>H<sub>11</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>

分子量：281.27

融点：約227℃(分解)

性状：白色～淡黄色の結晶又は結晶性の粉末で、においはない。酢酸(100)に溶けやすく、アセトン又はクロロホルムにやや溶けやすく、メタノール、エタノール(95)又はエタノール(99.5)に溶けにくく、ジエチルエーテルに極めて溶けにくく、水にほとんど溶けない。

構造式：



### 【取扱い上の注意】

1. 開封後は湿気を避けて保存すること。
2. 安定性試験結果の概要<sup>4)</sup>  
長期保存試験(25℃、相対湿度60%、3年)の結果、ニトラゼパム錠5mg「N I G」は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

### 【包 装】

ニトラゼパム錠5mg「N I G」  
※PTP包装：100錠(10錠×10)  
バラ包装：1,200錠

### 【主要文献】

- 1) 日医工岐阜工場(株)社内資料(薬物動態試験)
- 2) 日医工岐阜工場(株)社内資料(溶出試験)
- 3) 第十七改正日本薬局方解説書
- 4) 日医工岐阜工場(株)社内資料(安定性試験)

### ※※【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。  
日医工株式会社 お客様サポートセンター  
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21  
TEL (0120) 517-215  
FAX (076) 442-8948

販売

**武田薬品工業株式会社**  
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

※※  発売元  
**日医工株式会社**  
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

※※  製造販売元  
**日医工岐阜工場株式会社**  
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21