

外皮用収れん・消炎・保護剤

日本薬局方

亜鉛華軟膏

亜鉛華軟膏<ハチ>

Zinc Oxide Ointment

500g

貯法：気密容器
室温保存

発売元
 **健栄製薬株式会社**
 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
 電話番号 06(6231)5626

製造販売元
 **東洋製薬化成株式会社**
 大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
 重度又は広範囲の熱傷

※〔組成・性状〕

1g中 日局酸化亜鉛200mg含有。
 添加物として流動パラフィン、サラシミツロウ、
 ソルビタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセ
 リン、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒ
 ドロキシルエンを含有する。

白色である。

〔効能・効果〕

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
 外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門痒痒症、
 白癬、面皰、疔、よう

その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

〔用法・用量〕通常、症状に応じ1日1～数回、
 患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確
 となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

投与経路：眼には使用しないこと。

【薬効薬理】

酸化亜鉛の収れん、消炎、保護、緩和な防腐並び
 に浸出液吸収性を持ち、更に皮膚軟化性及び皮膚
 密着性を有する。これらの作用により、痂皮を軟
 化し、肉芽形成・表皮形成を促進させて皮膚疾患
 を速やかに改善する。

製造番号

使用期限

承認番号 (61AM)3148
 薬価収載 1986年3月
 販売開始 1988年11月
 再評価結果 1979年2月

調剤

販売



キャップ：PP
 ガーフィルム：PE
 ボトル：PE
 外装フィルム：PET