

日本標準商品分類番号
8 7 2 1 9

規制区分
劇薬 処方箋医薬品(注意-医師等の 処方箋により使 用すること)

## プロスタグランジンE<sub>1</sub>製剤

※日本薬局方 アルプロスタジル注射液

# アルプロスタジル注10 $\mu$ gシリンジ「科研」

キット製剤

ALPROSTADIL Inj.

貯法
遮光、凍結を避け5℃以下に 保存
有効期間
1年(外箱及びシリンジに使用 期限を表示)

	アルプロスタジル注 10 $\mu$ gシリンジ「科研」
承認番号	22900AMX00625000
薬価収載	2017年12月
販売開始	2017年12月

### 【警告】

動脈管依存性先天性心疾患(新生児)に投与する場合には、本剤投与により無呼吸発作が発現することがあるので、呼吸管理設備の整っている施設で投与すること。

### 【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

1. 重篤な心不全の患者  
[心不全の増強があらわれるとの報告がある]
2. 出血(頭蓋内出血、消化管出血、咯血等)している患者  
[出血を助長するおそれがある]
3. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人  
[「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照]
4. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

### 【組成・性状】

有効成分	1シリンジ(2mL)中に日本薬局方アルプロスタジル10 $\mu$ gを含有する。
添加物	高度精製卵黄レシチン 36mg オレイン酸 4.8mg 精製オリブ油 200mg 濃グリセリン 44.2mg pH調節剤
性状	白色の乳濁液で、僅かに粘性があり、特異なおいがある注射液
pH	4.5~6.0
浸透圧比	0.9~1.1(日局生理食塩液に対する比)

### 【効能・効果】

- 慢性動脈閉塞症(バージャー病、閉塞性動脈硬化症)における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛の改善
- 下記疾患における皮膚潰瘍の改善  
進行性全身性硬化症  
全身性エリテマトーデス
- 糖尿病における皮膚潰瘍の改善
- 振動病における末梢血行障害に伴う自覚症状の改善ならびに末梢循環・神経・運動機能障害の回復
- 動脈管依存性先天性心疾患における動脈管の開存

### 【用法・用量】

- 慢性動脈閉塞症(バージャー病、閉塞性動脈硬化症)、進行性全身性硬化症、全身性エリテマトーデス、糖尿病、振動病の場合  
通常、成人1日1回1~2mL(アルプロスタジルとして5~10 $\mu$ g)をそのまま又は輸液に混和して緩徐に静注、又は点滴静注する。  
なお、症状により適宜増減する。
- 動脈管依存性先天性心疾患の場合  
輸液に混和し、開始時アルプロスタジル5ng/kg/minとして持続静注し、その後は症状に応じて適宜増減して有効最小量とする。

#### 〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

本剤を輸液以外の他の薬剤と混和使用しないこと。ただし血漿増量剤(デキストラン、ゼラチン製剤等)との混和は避けること。なお、持続投与を行う場合には、ライン内での凝集を防ぐため、必ず単独ラインで投与すること。

### 【使用上の注意】

#### 1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1)心不全の患者  
[心不全の増強傾向があらわれることがある]
- (2)緑内障、眼圧亢進のある患者  
[眼圧を亢進させるおそれがある]
- (3)胃潰瘍の合併症及び既往歴のある患者  
[既往のある患者に胃出血を起こすおそれがある]
- (4)間質性肺炎の患者  
[間質性肺炎を増悪することがある]
- (5)腎不全の患者  
[腎不全を増悪することがある]
- (6)出血傾向のある患者  
[出血を助長するおそれがある]
- (7)抗凝血剤(ワルファリンカリウム等)あるいは血小板機能を抑制する薬剤(アスピリン、チクロピジン塩酸塩、シロスタゾール等)、血栓溶解剤(ウロキナーゼ等)を投与中の患者(「相互作用」の項参照)

#### 2. 重要な基本的注意

- (1)慢性動脈閉塞症(バージャー病、閉塞性動脈硬化症)、進行性全身性硬化症、全身性エリテマトーデス、振動病、糖尿病における皮膚潰瘍の患者に適用する場合には、次の事項を考慮すること。
  - 1)本剤による治療は対症療法であり、投与中止後再燃することがあるので注意すること。
  - 2)心不全、肺水腫、胸水があらわれることがあるので、循環状態(血圧、脈拍等)を十分に観察すること。また、動悸、胸苦しさ、呼吸困難、浮腫等が認められた場合には本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。特に高齢者は心機能等生理機能が低下しているため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。
- (2)糖尿病における皮膚潰瘍の患者に適用する場合には、次の事項を考慮すること。
  - 1)糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法、経口血糖降下剤、インスリン等の治療を行った上での適用を考慮すること。
  - 2)外用の糖尿病性潰瘍治療剤では十分な効果が期待されない患者に対して適用を考慮すること。
  - 3)投与中は経過を十分に観察し、4週間連日投与して効果が認められない場合には、他の適切な治療に切り替えること。
- (3)動脈管依存性先天性心疾患の新生児に適用する場合には、次の事項を考慮すること。
  - 1)重篤な疾患を有する新生児への投与なので、観察を十分に行い慎重に投与すること。なお、副作用が発現した場合は、投与中止、注入速度の減速など適切な処置を講ずること。
  - 2)過量投与により副作用発現率が高まるおそれがあるため、有効最小量で維持すること。
  - 3)長期投与により長管骨膜に肥厚がみられるとの報告があるので観察を十分に行い、必要以上の長期投与は避けること。

### 3. 相互作用

#### 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗凝血剤 ワルファリンカリウム等 血小板機能を抑制する薬剤 アスピリン、 チクロピジン塩酸塩、 シロスタゾール等 血栓溶解剤 ウロキナーゼ等	出血傾向の増強を来すおそれがある。	本剤は血小板凝集抑制作用を有するため、これらの薬剤との併用によりその作用を増強するおそれがある。

#### 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

##### (1) 重大な副作用(頻度不明)

###### 1) ショック、アナフィラキシー

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、蕁麻疹、喉頭浮腫、呼吸困難、チアノーゼ、血圧低下等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

###### 2) 意識消失

血圧低下に伴い一過性の意識消失があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

###### 3) 心不全、肺水腫

心不全(増強を含む)、肺水腫、胸水があらわれることがあるので、動悸、胸苦しさ、呼吸困難、浮腫等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと(「重要な基本的注意」の項参照)。

###### 4) 間質性肺炎

間質性肺炎(増悪を含む)があらわれることがあるので、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

###### 5) 心筋梗塞

心筋梗塞があらわれることがあるので、観察を十分に行い、胸痛、胸部圧迫感、心電図異常等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

###### 6) 脳出血、消化管出血

脳出血、消化管出血があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。

###### 7) 無顆粒球症、白血球減少、血小板減少

無顆粒球症、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

###### 8) 肝機能障害、黄疸

AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、 $\gamma$ -GTP等の上昇を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

###### 9) 無呼吸発作

新生児に投与した場合、無呼吸発作があらわれることがあるので、観察を十分に行うこと。なお、発現した場合は、減量、注入速度の減速、投与中止など適切な処置を行うこと。

##### (2) その他の副作用

1) 下記のような症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発現した場合には、減量、投与中止など適切な処置を行うこと。

頻度 分類	頻度不明
消化器	嘔気、腹痛、嘔吐、下痢、腹部膨満感・不快感、食欲不振、便秘、口腔腫脹感、口内炎(アフタを含む)
循環器	血圧低下 <sup>注)</sup> 、血管炎、顔面潮紅、胸部絞扼感 <sup>注)</sup> 、発赤、胸痛 <sup>注)</sup> 、動悸、頻脈、血圧上昇 <sup>注)</sup>
呼吸器	咳嗽、呼吸困難、喘息 <sup>注)</sup>
血液	好酸球增多
中枢神経系	発熱、頭痛、めまい、倦怠感、しびれ(感)、悪寒、振戦、痙攣
皮膚	発疹、そう痒感、蕁麻疹、発汗

頻度 分類	頻度不明
腎臓	腎不全の増悪 <sup>注)</sup>
注射部位	血管痛、発赤、こわばり、そう痒感
出血傾向 <sup>注)</sup>	出血(鼻出血、眼底出血、結膜出血、皮下出血、血尿等)
その他	熱感、四肢疼痛(増強を含む)、気分不良、浮腫、視力低下、脱毛、低ナトリウム血症、四肢腫脹

注)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

2) 新生児への投与にあたっては、1)に記載した副作用のほか、低クロール血症、低カルシウム血症、高脂血症があらわれることがあるので観察を十分に行うこと。

#### 5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

#### 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。  
[動物実験(ラット、*in vitro*)で子宮収縮作用が報告されており、また、ヒトにおける妊娠中の投与に関する安全性は確立していない]

#### 7. 小児等への投与

動脈管依存性先天性心疾患以外の小児に対する安全性は確立していない。

#### 8. 適用上の注意

(1) 投与時：本剤投与により副作用があらわれた場合には、投与の中止、投与速度の変更など適切な処置を講ずること。

(2) 調製時：

1) 凍結したものは使用しないこと。

2) 本剤を輸液に混和し使用する場合は混和後24時間以内に使用し残液は廃棄すること。

(3) その他：

1) ポリ塩化ビニル製の輸液セット等を使用した場合、可塑性剤であるDEHP [di-(2-ethylhexyl)phthalate; フタル酸ジ-(2-エチルヘキシル)] が製剤中に溶出することが報告されている。

特に動脈管依存性先天性心疾患の新生児への投与に際しては、持続静注によりDEHPの総溶出量が増加するので、ポリ塩化ビニル製の輸液セット等の使用を避けることが望ましい。

2) 本剤は脂肪乳剤を含有しているため、ポリカーボネート製の延長チューブ等を使用した場合、そのコネクタ一部分にひび割れが発生し、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性があるため注意すること。ただし、本剤を生理食塩液等の輸液で50倍以上希釈した場合、ひび割れは認められなかった。<sup>1)</sup>

#### 9. その他の注意

アルプロスタジル製剤の投与により脳梗塞がみられたとの報告がある。

#### 【臨床成績】<sup>2)</sup>

<参考：アルプロスタジル注10 $\mu$ g[NI G] (アンプル品)での試験>

##### 1. 臨床効果

四肢潰瘍または安静時疼痛を有する慢性動脈閉塞症を対象に国内13施設でアルプロスタジル注10 $\mu$ g[NI G]の臨床試験を実施した。その結果、有効性評価症例33例における全般改善度は「改善」以上66.7%(22/33例)、「やや改善」以上97.0%(32/33例)であった。

##### 2. 副作用及び臨床検査値の変動

安全性検討症例42例のうち、副作用が報告されたのは3例(7.1%)であり、その内訳は前胸部発疹、下肢の疼痛・しびれの増強及び血尿が各1例であった。

また、38例に実施した臨床検査では、1例(2.6%)に本剤との関連性が疑われるALT(GPT)上昇が認められた。

#### 【薬効薬理】<sup>3)</sup>

<参考：アルプロスタジル注10 $\mu$ g[NI G] (アンプル品)での試験>

##### 血小板凝集抑制作用

アルプロスタジル注10 $\mu$ g[NI G] (10mL/kg*i.v.*：アルプロスタジルとして50 $\mu$ g/kg)は、ラット*ex vivo*系におけるADP惹起血小板凝集に対し、35.0%の抑制率を示した。

## 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：Alprostadil(アルプロスタジル)


化学名：7-[(1*R*,2*R*,3*R*)-3-Hydroxy-2-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl] heptanoic acid

分子式：C<sub>20</sub>H<sub>34</sub>O<sub>5</sub>

分子量：354.48

融点：114～118℃

構造式：



性状：アルプロスタジルは白色の結晶又は結晶性の粉末である。エタノール(99.5)又はテトラヒドロフランに溶けやすく、アセトニトリルに溶けにくく、水にほとんど溶けない。

## 【取扱い上の注意】<sup>4)</sup>

安定性試験結果の概要

長期保存試験(5℃、1年1ヵ月)の結果、アルプロスタジル注10μgシリンジ「科研」は通常の市場流通下において1年間安定であることが確認された。

## 【包装】

アルプロスタジル注10μgシリンジ「科研」：10シリンジ

## 【主要文献及び文献請求先】

### 〈主要文献〉

- 1) 日医工岐阜工場(株)社内資料 (ポリカーボネート製医療機器との併用試験)
- 2) 日医工岐阜工場(株)社内資料 (臨床試験)
- 3) 日医工岐阜工場(株)社内資料 (薬効薬理試験)
- 4) 日医工岐阜工場(株)社内資料 (安定性試験)


### 〈文献請求先〉

主要文献に記載の社内資料につきましては下記にご請求ください。

科研製薬株式会社 医薬品情報サービス室  
〒113-8650 東京都文京区本駒込二丁目28番8号  
電話 0120-519-874

## アルプロスタジル注シリンジ「科研」の使用方法

①ゴム栓を回しながら引き抜いてください。



②ゴム栓を外したら直ちに注射針を装着し、ご使用ください。

### 〈注意〉

- ゴム栓取り外しの際、ルアー部(針装着部)に指が触れないようにしてください。誤って指が触れてしまった場合は使用しないでください。
- ピロー包装開封前に破れ・はがれ等があった場合は使用しないでください。
- ピロー包装から取り出したとき、薬液の漏れ等が無いか確認し、万一、異常が認められた場合には使用しないでください。
- 本剤の使用は1回限りとし、開封後は速やかに使用し、使用後は廃棄してください。

※※  発売元  
**科研製薬株式会社**  
東京都文京区本駒込二丁目28番8号

※※  製造販売元  
**日医工岐阜工場株式会社**  
富山市総曲輪1丁目6番21