

鎮痛・消炎剤

サリチル酸メチル「東豊」

日本薬局方 サリチル酸メチル
Methyl Salicylate

開封日 年 月 日

500mL

製造販売元

東豊薬品株式会社

東京都葛飾区西新小岩4-15-3

※※2021年4月改訂(第5版)
(妊婦、産婦、授乳婦等
への投与追加)

※2016年2月改訂(第4版)
(組成の記載方法変更)

日本標準商品分類番号 872641

承認番号	16000AMZ04260
薬価収載	未収載
販売開始	1974年1月
再評価結果	1982年1月

【貯法】 気密容器、室温保存
【使用期限】 製造の翌月から3年

【禁忌】(次の患者には使用しないこと)
本剤に対して過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

※組成: 本剤はサリチル酸メチル(C₈H₈O₃) 98.0%以上を含む。

性状: 本剤は無色～微黄色の液で、強い特異なおいがある。

【効能又は効果】

下記における鎮痛・消炎
関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫

【用法及び用量】

5%又はそれ以上の濃度の液剤、軟膏剤又はリニメント剤として
皮膚局所に塗布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査
を実施していない。

その他の副作用

		頻度不明
過敏症 ^{注)}		発赤、発疹等の過敏症状
大量使用	消化器系	悪心・嘔吐、食欲不振等
	循環器系	頭痛、頻脈等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止
すること。

※※2. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある女
性に対しては、治療上の有益性が危険
性を上回ると判断される場合にのみ使
用すること。妊婦に対する安全性は確立
していない。

シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐
剤)を妊婦に使用し、胎児の腎機能障
害及び尿量減少、それに伴う羊水過少
症が起きたとの報告がある。

3. 適用上の注意

眼には使用しないこと。

〈注意〉

火気厳禁 危険等級Ⅲ
第4類 第3石油類

製造番号

使用期限

キャップ:PP
パッキン:PE
外装フィルム:PS
ガラス:瓶