

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2013に準拠して作成

経口用セフェム系抗生物質製剤

日本薬局方 セフジニル細粒

セフジニル細粒小児用10%「SW」

CEFDINIR Fine Granules for Pediatric [SW]

剤形	細粒
製剤の規制区分	処方箋医薬品* ※注意－医師等の処方箋により使用すること
規格・含量	1g中日局セフジニル100mg(力価)含有
一般名	和名：セフジニル 洋名：Cefdinir
製造販売承認年月日 薬価基準収載 ・発売年月日	製造販売承認年月日：2022年8月15日 薬価基準収載年月日：2022年12月9日 発売年月日：2023年2月1日
開発・製造販売(輸入)・ 提携・販売会社名	製造販売元：沢井製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	沢井製薬株式会社 医薬品情報センター TEL：0120-381-999、FAX：06-7708-8966 医療関係者向け総合情報サイト： https://med.sawai.co.jp/

本IFは2022年8月作成の電子添文の記載に基づき作成した。

最新の情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ<https://www.pmda.go.jp/>にてご確認ください。

IF利用の手引きの概要 —日本病院薬剤師会—

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書(以下、添付文書と略す)がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和63年に日本病院薬剤師会(以下、日病薬と略す)学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」(以下、IFと略す)の位置付け並びにIF記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成10年9月に日病薬学術第3小委員会においてIF記載要領の改訂が行われた。

更に10年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成20年9月に日病薬医薬情報委員会においてIF記載要領2008が策定された。

IF記載要領2008では、IFを紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF等の電磁的データとして提供すること(e-IF)が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版のe-IFが提供されることとなった。

最新版のe-IFは、(独)医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページ(<http://www.info.pmda.go.jp/>)から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IFを掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせてe-IFの情報を検討する組織を設置して、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008年より年4回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF記載要領の一部改訂を行いIF記載要領2013として公表する運びとなった。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

[IFの様式]

①規格はA4版、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体(図表は除く)で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。

- ②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁にまとめる。

[IFの作成]

- ①IFは原則として製剤の投与経路別(内用剤、注射剤、外用剤)に作成される。
- ②IFに記載する項目及び配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠する。
- ③添付文書の内容を補完するとのIFの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領2013」(以下、「IF記載要領2013」と略す)により作成されたIFは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体(PDF)から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[IFの発行]

- ①「IF記載要領2013」は、平成25年10月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ②上記以外の医薬品については、「IF記載要領2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果(臨床再評価)が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはIFが改訂される。

3. IFの利用にあたって

「IF記載要領2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体のIFについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IFを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IFは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、IFがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013年4月改訂)

目次

I. 概要に関する項目	1	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	19
1. 開発の経緯	1	1. 警告内容とその理由	19
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)	19
II. 名称に関する項目	2	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	19
1. 販売名	2	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	19
2. 一般名	2	5. 慎重投与内容とその理由	19
3. 構造式又は示性式	2	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	19
4. 分子式及び分子量	2	7. 相互作用	19
5. 化学名(命名法)	2	8. 副作用	20
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	3	9. 高齢者への投与	22
7. CAS登録番号	3	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	22
III. 有効成分に関する項目	4	11. 小児等への投与	22
1. 物理化学的性質	4	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	22
2. 有効成分の各種条件下における安定性	4	13. 過量投与	22
3. 有効成分の確認試験法	4	14. 適用上の注意	22
4. 有効成分の定量法	5	15. その他の注意	22
IV. 製剤に関する項目	6	16. その他	23
1. 剤形	6	IX. 非臨床試験に関する項目	24
2. 製剤の組成	6	1. 薬理試験	24
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	6	2. 毒性試験	24
4. 製剤の各種条件下における安定性	6	X. 管理的事項に関する項目	25
5. 調製法及び溶解後の安定性	9	1. 規制区分	25
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	9	2. 有効期間又は使用期限	25
7. 溶出性	9	3. 貯法・保存条件	25
8. 生物学的試験法	11	4. 薬剤取扱い上の注意点	25
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	11	5. 承認条件等	26
10. 製剤中の有効成分の定量法	11	6. 包装	26
11. 力価	11	7. 容器の材質	26
12. 混入する可能性のある夾雑物	11	8. 同一成分・同効薬	26
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	11	9. 国際誕生年月日	26
14. その他	11	10. 製造販売承認年月日及び承認番号	26
V. 治療に関する項目	12	11. 薬価基準収載年月日	26
1. 効能又は効果	12	12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	26
2. 用法及び用量	12	13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	26
3. 臨床成績	12	14. 再審査期間	26
VI. 薬効薬理に関する項目	14	15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	27
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	14	16. 各種コード	27
2. 薬理作用	14	17. 保険給付上の注意	27
VII. 薬物動態に関する項目	15	XI. 文献	28
1. 血中濃度の推移・測定法	15	1. 引用文献	28
2. 薬物速度論的パラメータ	16	2. その他の参考文献	28
3. 吸収	17	XII. 参考資料	29
4. 分布	17	1. 主な外国での発売状況	29
5. 代謝	17	2. 海外における臨床支援情報	29
6. 排泄	18	XIII. 備考	29
7. トランスポーターに関する情報	18	その他の関連資料	29
8. 透析等による除去率	18		

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

セフジニル細粒小児用10%「SW」は、日局セフジニルを含有する経口用セフェム系抗生物質製剤である。

セフジニルは、グラム陽性菌及び陰性菌に広範囲な抗菌スペクトルを持ち、特にグラム陽性菌のブドウ球菌属、レンサ球菌属などに対して従来の経口用セフェム剤よりも強く、殺菌的に作用する。¹⁾

本剤は、後発医薬品として2022年8月に承認を得て、2023年2月に上市に至った。

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- 1) 経口用第3世代セフェム系薬である。
- 2) ストロベリー様の芳香があり、添加剤由来の甘味を有する。
- 3) 細菌細胞壁の合成を阻害することで抗菌作用を発揮する。β-lactamaseに安定で、β-lactamase産生菌にもすぐれた抗菌力を示す。¹⁾
- 4) 重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、皮膚障害、血液障害、大腸炎、間質性肺炎、PIE症候群、腎障害、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸が報告されている。

II. 名称に関する項目

II. 名称に関する項目

1. 販売名

1) 和名

セフジニル細粒小児用10%「SW」

2) 洋名

CEFDINIR Fine Granules for Pediatric [SW]

3) 名称の由来

通知「平成17年9月22日 薬食審査発第0922001号」に基づき命名した。

2. 一般名

1) 和名(命名法)

セフジニル(JAN)


2) 洋名(命名法)

Cefdinir(JAN、INN)

3) ステム

cef- : cephalosporanic acid系の抗生物質

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式 : C₁₄H₁₃N₅O₅S₂

分子量 : 395.41

5. 化学名(命名法)

(6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetylamino]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号
略号：CFDN

7. CAS登録番号
91832-40-5

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

1) 外観・性状

白色～淡黄色の結晶性の粉末である。

2) 溶解性

水、エタノール(95)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。pH7.0の0.1mol/Lリン酸塩緩衝液に溶ける。

溶解度(37°C)²⁾ : pH1.2 : 1.94mg/mL、pH4.0 : 0.988mg/mL、pH6.8 : 5.03mg/mL、水 : 0.381mg/mL

3) 吸湿性

水分 : 2.0%以下(1g、容量滴定法、直接滴定。ただし、水分測定用メタノールの代わりに水分測定用ホルムアミド/水分測定用メタノール混液(2 : 1)を用いる)

4) 融点(分解点)、沸点、凝固点

該当資料なし

5) 酸塩基解離定数

解離定数(25°C) : pKa₁ = 1.9(カルボキシル基、滴定法)、pKa₂ = 3.3(アミノ基、滴定法)、pKa₃ = 9.9(ヒドロキシイミノ基、滴定法)²⁾

6) 分配係数

該当資料なし

7) その他の主な示性値

旋光度[α]_D²⁰ : -58～-66° (0.25g、pH7.0の0.1mol/L リン酸塩緩衝液、25mL、100mm)

2. 有効成分の各種条件下における安定性

液性(pH) : 遮光、pH6.88、25°C、24時間で約5%分解する。²⁾

保存条件 : 遮光して保存する。

3. 有効成分の確認試験法

日局「セフジニル」の確認試験に準ずる。

1) 紫外可視吸光度測定法

2) 赤外吸収スペクトル測定法

3) 核磁気共鳴スペクトル測定法

4. 有効成分の定量法
日局「セフジニル」の定量法に準ずる。(液体クロマトグラフィー)

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

1) 剤形の区別、外観及び性状

品名	剤形	性状
セフジニル細粒小児用10%「SW」	細粒	淡赤白色

2) 製剤の物性

製剤均一性(分包品)：日局一般試験法 製剤均一性試験法の項により質量偏差試験を行うとき、規格に適合する。

溶出性：日局セフジニル細粒 溶出性の項により試験を行うとき、規格に適合する。

3) 識別コード

該当しない

4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定なpH域等

該当資料なし

2. 製剤の組成

1) 有効成分(活性成分)の含量

1g中に日局セフジニル100mg(力価)を含有する。

2) 添加物

添加物として、デキストリン、二酸化ケイ素、乳糖、白糖、バニリン、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色102号、香料を含有する。

3) その他

該当資料なし

3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

4. 製剤の各種条件下における安定性

1) 加速試験³⁾

目的

本製剤の一定の流通期間中における品質の安定性を短期間で推定するため、加速試験を実施する。

方法

試験条件

保存条件	40±1℃/75±5%RH
保存期間	6ヵ月
ロット数	3ロット
試験回数	3回/ロット
保存形態	分包包装(分包/アルミピロー) バラ包装

結果

いずれのロットもすべての試験項目において規格に適合した。

分包包装		イニシャル			6ヵ月後		
試験項目	ロット	1ロット目	2ロット目	3ロット目	1ロット目	2ロット目	3ロット目
	性状		淡赤白色の細粒			淡赤白色の細粒	
確認試験		適合	適合	適合	適合	適合	適合
質量偏差試験		適合	適合	適合	適合	適合	適合
溶出試験		適合	適合	適合	適合	適合	適合
定量試験		適合	適合	適合	適合	適合	適合

バラ包装		イニシャル			6ヵ月後		
試験項目	ロット	1ロット目	2ロット目	3ロット目	1ロット目	2ロット目	3ロット目
	性状		淡赤白色の細粒			淡赤白色の細粒	
確認試験		適合	適合	適合	適合	適合	適合
溶出試験		適合	適合	適合	適合	適合	適合
定量試験		適合	適合	適合	適合	適合	適合

2)長期保存試験³⁾

目的

本製剤の一定の流通期間中における品質の安定性を確認するため、長期保存試験を実施する。

方法

本製剤の[規格及び試験方法]により実施する。

試験条件

保存条件	25℃/60%RH	
保存期間	36ヵ月	
試験回数	1ロット、1回(定量試験のみ3回)	
保存形態	分包包装	分包(セロファン・ポリエチレン)/ピロー(アルミニウム・ポリエチレンラミネートフィルム/乾燥剤)/紙箱
	バラ包装	バラ(ポリエチレン容器、ポリプロピレンキャップ/乾燥剤)/紙箱

IV. 製剤に関する項目

結果

すべての試験項目において規格に適合した。

分包包装

試験項目 \ 保存期間	イニシャル	36ヵ月後
性状	淡赤白色の細粒	淡赤白色の細粒
確認試験	適合	適合
質量偏差試験	適合	適合
溶出試験	適合	適合
定量試験	適合	適合

バラ包装

試験項目 \ 保存期間	イニシャル	36ヵ月後
性状	淡赤白色の細粒	淡赤白色の細粒
確認試験	適合	適合
溶出試験	適合	適合
定量試験	適合	適合

3) 無包装下の安定性試験⁴⁾

目的

本製剤の無包装状態の安定性を確認するため試験を実施する。

方法

無包装の本製剤を下記条件で保存した後、下記試験項目について本製剤の[規格及び試験方法]に従い試験を実施する。結果は「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)」(平成11年8月20日(社)日本病院薬剤師会)を参考に評価する。

保存条件

温度	40℃、遮光気密容器
湿度	30℃/75%RH、遮光開放
光	1000lx、気密容器

試験項目及び試験回数

試験項目	試験回数
外観・溶出性	1回
含量	3回

結果

試験項目 \ 保存条件・期間	外観	溶出性	含量※
イニシャル	淡赤白色の細粒	適合	101.6
温度(3ヵ月)	変化なし	変化なし	変化あり (規格内) 95.6
湿度(3ヵ月)	変化あり(規格外) くすんだ淡赤白色の細粒 固化を認めた	変化なし	変化あり (規格内) 94.9
光(120万lx・hr)	変化あり(規格内) 淡赤白色の細粒 わずかに退色を認めた	変化なし	変化あり (規格内) 98.0

※：表示量に対する含有率(%)、平均値

各試験項目の評価基準

【外観】

分類	評価基準
変化なし	外観上の変化を、ほとんど認めない場合
変化あり(規格内)	わずかな色調変化(退色等)等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている場合
変化あり(規格外)	形状変化や著しい色調変化を認め、規格を逸脱している場合

【溶出性】

分類	評価基準
変化なし	規格値内の場合
変化あり(規格外)	規格値外の場合

【含量】

分類	評価基準
変化なし	含量低下が3%未満の場合
変化あり(規格内)	含量低下が3%以上で、規格値内の場合
変化あり(規格外)	規格値外の場合

5. 調製法及び溶解後の安定性
該当しない

6. 他剤との配合変化(物理化学的变化)
XIII. 備考「配合変化試験」参照⁵⁾







7. 溶出性
本剤は、日本薬局方に定められた溶出規格に適合していることが確認されている。

＜溶出挙動における同等性及び類似性＞⁶⁾

目的	試験製剤と標準製剤の生物学的同等性試験における溶出挙動の類似性の判定を行うため、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成13年5月31日 医薬審発第786号)に準じ、溶出試験を実施する。	
方法	日本薬局方 一般試験法 溶出試験法 パドル法	
条件	回転数・試験液	50rpm : pH1.2、50rpm : pH3.0、50rpm : pH5.5、50rpm : pH6.8、50rpm : 水、100rpm : pH3.0
	試験液量	900mL
	液温度	37±0.5℃
	試験数	12 ベッセル
結果	<p><50rpm : pH1.2> 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p><50rpm : pH3.0> 標準製剤の平均溶出率が60%(5分)及び85%(30分)付近の2時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。</p> <p><50rpm : pH5.5> 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p>	

IV. 製剤に関する項目

結果	<p><50rpm : pH6.8> 両製剤とも 15 分以内に平均 85%以上溶出した。</p> <p><50rpm : 水> 標準製剤の平均溶出率が 60% (4 分) 及び 85% (15 分) 付近の 2 時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。</p> <p><100rpm : pH3.0> 両製剤とも 15 分以内に平均 85%以上溶出した。</p>
結論	以上の結果より、両製剤の溶出挙動は同等であると判断した。



([] : 判定基準の適合範囲)

8. 生物学的試験法
該当しない
9. 製剤中の有効成分の確認試験法
日局「セフジニル細粒」の確認試験に準ずる。(紫外可視吸光度測定法)
10. 製剤中の有効成分の定量法
日局「セフジニル細粒」の定量法に準ずる。(液体クロマトグラフィー)
11. 力価
セフジニル($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$)としての量を質量(力価)で示す。
12. 混入する可能性のある夾雑物
該当資料なし
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報
該当資料なし
14. その他
該当資料なし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

<適応菌種>

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌

<適応症>

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

<効能又は効果に関連する使用上の注意>

咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、中耳炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」⁷⁾を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。

2. 用法及び用量

通常、小児に対してセフジニルとして1日量9～18mg(力価)/kgを3回に分割して経口投与する。

なお、年齢及び症状に応じて適宜増減する。

<用法及び用量に関連する使用上の注意>

- 1) 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。
- 2) 高度の腎障害のある患者では血中濃度が持続するので、腎障害の程度に応じて投与量を減量し、投与の間隔をあけて使用すること。
- 3) 鉄剤との併用は避けることが望ましい。
やむを得ず併用する場合には、本剤の投与後3時間以上間隔をあけて投与する。(「相互作用」の項参照)

3. 臨床成績

1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

2) 臨床効果

該当資料なし

3) 臨床薬理試験：忍容性試験

該当資料なし

4) 探索的試験：用量反応探索試験

該当資料なし

5) 検証的試験

(1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

(2) 比較試験

該当資料なし

(3) 安全性試験

該当資料なし

(4) 患者・病態別試験

該当資料なし

6) 治療的使用

(1) 使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)

該当資料なし

(2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当しない

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群……………

細胞壁合成阻害作用：セフトロキジムプロキシセチル、セフィキシム、セフトラムピボキシル、セフトレンピボキシル、セフカペンピボキシル塩酸塩⁸⁾

2. 薬理作用……………

セフジニルの薬理作用について以下のとおり報告されている。

1) 作用部位・作用機序

作用点は菌種により異なるが、ペニシリン結合タンパク (PBP) の 1 (1 a、1 bs)、2 及び 3 に親和性が高く、細菌細胞壁の合成を阻害することで抗菌作用を発揮する。¹⁾

2) 薬効を裏付ける試験成績

該当資料なし

3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

セフジニル製剤の薬物動態について以下のとおり報告されている。

1. 血中濃度の推移・測定法

1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

2) 最高血中濃度到達時間

VII. -1. -3) 参照

3) 臨床試験で確認された血中濃度

<生物学的同等性試験>⁹⁾

目的

セフジニル細粒小児用10%「SW」について、治療学的同等性を保証するため、健康成人男性を対象とした薬物動態試験により、標準製剤との生物学的同等性を検証する。

方法

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成13年5月31日 医薬審発第786号以下、ガイドラインと記載)に準じて、セフジニル細粒小児用10%「SW」と標準製剤を2剤2期のクロスオーバー試験によりそれぞれ1g[セフジニルとして100mg(力価)]健康成人男性に絶食下单回経口投与し、血漿中セフジニル濃度を測定する。

採血時点	0、1、2、3、4、5、6、8、10hr
休薬期間	5日間以上
測定方法	HPLC法

評価

ガイドラインの判定基準に従い、両製剤のAUC_tおよびC_{max}の対数値の平均値の差の90%信頼区間がそれぞれlog(0.8)~log(1.25)の範囲内にあるとき、両製剤は生物学的に同等であると判定する。


結果

各製剤1g投与時の薬物動態パラメータ

	C _{max} [ng(力価)/mL]	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)	AUC _{0-10hr} [ng(力価)・hr/mL]
セフジニル細粒 小児用10%「SW」	1055.1±294.7	3.3±0.5	1.6±0.3	5263.2±1369.3
標準製剤 (細粒、10%)	1003.7±273.1	3.0±0.7	1.5±0.2	5116.0±1369.5

(Mean±S.D., n=10)

VII. 薬物動態に関する項目



	対数値の平均値の差の90%信頼区間
AUC _{0-10hr}	log(0.976713) ~ log(1.096155)
Cmax	log(1.006216) ~ log(1.097784)

血漿中濃度ならびにAUC_t、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

結論

得られた薬物動態パラメータ (AUC_t、Cmax) の対数値の平均値の差の90%信頼区間は、いずれもガイドラインの基準であるlog(0.8) ~ log(1.25) の範囲内であったことから、試験製剤と標準製剤は生物学的に同等であると判定した。

4) 中毒域

該当資料なし

5) 食事・併用薬の影響

V. -2. 及びVIII. -7. 参照

6) 母集団 (ポピュレーション) 解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ.....

1) 解析方法

該当資料なし

2) 吸収速度定数

該当資料なし

3) バイオアベイラビリティ
VII. - 1. -3) 参照

4) 消失速度定数
該当資料なし

5) クリアランス
該当資料なし

6) 分布容積
該当資料なし

7) 血漿蛋白結合率
該当資料なし

3. 吸収
食後投与では吸収がやや低下した。¹⁾

4. 分布

1) 血液-脳関門通過性
該当資料なし

2) 血液-胎盤関門通過性
該当資料なし

3) 乳汁への移行性
該当資料なし

4) 髄液への移行性
該当資料なし

5) その他の組織への移行性
該当資料なし

5. 代謝

1) 代謝部位及び代謝経路
該当資料なし

2) 代謝に関与する酵素(CYP450等)の分子種
該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

4) 代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

5) 活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

6. 排泄

1) 排泄部位及び経路

主として腎から排泄される。¹⁾

2) 排泄率

小児に3及び6 mg/kgを投与したときの尿中排泄率(0～8時間)は約17～21%であった。(細粒剤のデータ)¹⁾

3) 排泄速度

VII. -6. -2) 参照

7. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

8. 透析等による除去率

血液透析による除去率は61%であった。¹⁾

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由……………
該当しない

2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)……………

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【原則禁忌】(次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)
セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由……………
V. -1. 参照

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由……………
V. -2. 参照

5. 慎重投与内容とその理由……………

慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
1) ペニシリン系抗生物質に対し、過敏症の既往歴のある患者
2) 本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギー症状を起こしやすい体質を有する患者
3) 高度の腎障害のある患者(「用法及び用量に関連する使用上の注意」の項参照)
4) 経口摂取の不良な患者又は非経口栄養の患者、全身状態の悪い患者〔ビタミンK欠乏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行うこと。〕

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法……………

重要な基本的注意
ショックがあらわれるおそれがあるので、十分な問診を行うこと。

7. 相互作用……………

- 1) 併用禁忌とその理由
該当しない

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

2) 併用注意とその理由

併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
鉄剤	本剤の吸収を約10分の1まで阻害するので、併用は避けることが望ましい。やむを得ず併用する場合には、本剤の投与後3時間以上間隔をあけて投与する。	腸管内において鉄イオンとほとんど吸収されない錯体を形成する。
ワルファリンカリウム	ワルファリンカリウムの作用が増強されるおそれがある。ただし、本剤に関する症例報告はない。	腸内細菌によるビタミンKの産生を抑制することがある。
制酸剤(アルミニウム又はマグネシウム含有)	本剤の吸収が低下し、効果が減弱されるおそれがあるので、本剤の投与後2時間以上間隔をあけて投与する。	機序不明

8. 副作用

1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

2) 重大な副作用と初期症状

- 1) 重大な副作用(頻度不明)
- (1) **ショック**：ショックを起こすことがあるので、観察を十分に行い、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便秘、耳鳴、発汗等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - (2) **アナフィラキシー**：アナフィラキシー(呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - (3) **皮膚障害**：中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis：TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、頭痛、関節痛、皮膚や粘膜の紅斑・水疱、皮膚の緊張感・灼熱感・疼痛等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - (4) **血液障害**：汎血球減少、無顆粒球症(初期症状：発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感等)、血小板減少(初期症状：点状出血、紫斑等)、溶血性貧血(初期症状：発熱、ヘモグロビン尿、貧血症状等)があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - (5) **大腸炎**：偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれることがある。腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - (6) **間質性肺炎、PIE症候群**：発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多等を伴う間質性肺炎、PIE症候群等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
 - (7) **腎障害**：急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(8) 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸：劇症肝炎等の重篤な肝炎、著しいAST(GOT)、ALT(GPT)、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分にいき、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

3) その他の副作用

2) その他の副作用

	頻度不明
過 敏 症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、紅斑、浮腫、そう痒、発熱
血 液	好酸球増多、顆粒球減少
腎 臓	BUN上昇
消 化 器	下痢、腹痛、嘔吐、悪心、食欲不振、胃部不快感、胸やけ、便秘
菌 交 代 症	口内炎、カンジダ症、黒毛舌
ビ タ ミ ン 欠 乏 症	ビタミンK欠乏症状(低プロトロンビン血症、出血傾向等)、ビタミンB群欠乏症状(舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎等)
そ の 他	めまい、頭痛、胸部圧迫感、しびれ

注)発現した場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【原則禁忌】(次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 1) ペニシリン系抗生物質に対し、過敏症の既往歴のある患者
- 2) 本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギー症状を起こしやすい体質を有する患者

重要な基本的注意

ショックがあらわれるおそれがあるので、十分な問診を行うこと。

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

副作用	
1) 重大な副作用(頻度不明)	
(1) ショック ：ショックを起こすことがあるので、観察を十分に行い、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	
(2) アナフィラキシー ：アナフィラキシー(呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	
2) その他の副作用	
	頻度不明
過 敏 症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、紅斑、浮腫、そう痒、発熱
注)発現した場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。	

9. 高齢者への投与
 該当しない

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
 該当しない

11. 小児等への投与
 低出生体重児、新生児に対する安全性は確立していない(使用経験が少ない)。

12. 臨床検査結果に及ぼす影響
 1) テステープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。
 2) 直接クームス試験陽性を呈することがあるので注意すること。

13. 過量投与
 該当資料なし

14. 適用上の注意
 該当しない

15. その他の注意
 1) 粉ミルク、経腸栄養剤など鉄添加製品との併用により、便が赤色調を呈することがある。
 2) 尿が赤色調を呈することがある。

16. その他.....

IX. 非臨床試験に関する項目

セフジニルの非臨床試験成績について以下のとおり報告されている。

1. 薬理試験.....
 - 1) 薬効薬理試験(「VI. 薬効薬理に関する項目」参照)

 - 2) 副次的薬理試験
該当資料なし

 - 3) 安全性薬理試験
該当資料なし

 - 4) その他の薬理試験
該当資料なし

2. 毒性試験.....
 - 1) 単回投与毒性試験
該当資料なし

 - 2) 反復投与毒性試験
該当資料なし

 - 3) 生殖発生毒性試験
該当資料なし

 - 4) その他の特殊毒性
該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

規制区分	
製剤	処方箋医薬品 ^{注)}
有効成分	該当しない

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

2. 有効期間又は使用期限

使用期限：3年

3. 貯法・保存条件

遮光室温保存(光による退色及び湿気による固化のおそれがある)

4. 薬剤取扱い上の注意点

1) 薬局での取扱い上の留意点について


該当しない

2) 薬剤交付時の取扱いについて(患者等に留意すべき必須事項等)

患者向医薬品ガイド：なし、くすりのしおり：有り


VIII. -15. 参照

セフジニル
細粒小児用10%[SW]の
飲ませ方



お水などに混ぜて飲ませる場合


飲ませる直前に、小さな容器で少量のお水などよくかき混ぜて飲ませてください。




注意

- お薬は、光や湿気を避けて涼しい所に保存してください。
- お薬をお水などに混ぜて飲ませる場合は速やかに飲ませてください。
- 作り置きはせず、必ず飲ませる直前に混ぜてください。

飲みやすくする工夫



お水のほかに、次のようなものに混ぜると飲みやすくなる場合があります。お薬を飲み残すことのないよう、飲みきれる量を混ぜてください。



カスタードプリン リンゴジュース アイスcream (パナソニック)

- ミルクココア

混ぜると飲みにくくなるもの

次のようなものに混ぜると飲みにくくなる場合があります。

- 緑茶 (特異な味)
- 牛乳 (甘いが特異な味)
- オレンジジュース (酸味がする)

GU00497MIA1 沢井製薬株式会社 2022年12月作成 DHH

注) 当説明書は変更・改訂される場合があります。

3) 調剤時の留意点について

該当しない

X. 管理的事項に関する項目

5. 承認条件等……………
該当しない
6. 包装……………
120包(1包0.5g・3連包)、100g(バラ)
7. 容器の材質……………
分包：[分包]セロファン・ポリエチレン、[ピロー]アルミニウム・ポリエチレンラミネートフィルム
バラ：[本体]ポリエチレン瓶、[キャップ]ポリプロピレン
8. 同一成分・同効薬……………
同一成分：セフゾンカプセル50mg/カプセル100mg/細粒小児用10%
同効薬：細胞壁合成阻害作用：セフポドキシムプロキセチル、セフィキシム、セフテラムピボキシル、セフジトレンピボキシル、セフカペンピボキシル塩酸塩⁸⁾
9. 国際誕生年月日……………
該当しない
10. 製造販売承認年月日及び承認番号……………
製造販売承認年月日：2022年8月15日、承認番号：30400AMX00318000
11. 薬価基準収載年月日……………
2022年12月9日
12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容……………
該当しない
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容……………
該当しない
14. 再審査期間……………
該当しない

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報

本剤は、投薬(あるいは投与)期間に関する制限は定められていない。

16. 各種コード

	HOT番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト電算コード
セフジニル細粒 小児用10%「SW」	129270101	6132013C1171	622927001

17. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

XI . 文 献

1. 引用文献
- 1) 日本薬局方解説書編集委員会編，第十八改正 日本薬局方解説書，廣川書店，2021，C-2844 - C-2850.
 - 2) 日本公定書協会編，医療用医薬品 品質情報集，No. 12，薬事日報社，2002，p. 169.
 - 3) 沢井製薬(株) 社内資料[安定性試験] セフジニル細粒小児用10%「SW」
 - 4) 沢井製薬(株) 社内資料[無包装下の安定性試験] セフジニル細粒小児用10%「SW」
 - 5) 沢井製薬(株) 社内資料[配合変化試験] セフジニル細粒小児用10%「SW」
 - 6) 沢井製薬(株) 社内資料[溶出試験] セフジニル細粒小児用10%「SW」
 - 7) 厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引き
 - 8) 薬剤分類情報閲覧システム<<https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/yakuzaiMenu/>> (2023/1/31アクセス)
 - 9) 沢井製薬(株) 社内資料[生物学的同等性試験] セフジニル細粒小児用10%「SW」
2. その他の参考文献

XII. 参考資料

1. 主な外国での発売状況
2. 海外における臨床支援情報
- 該当資料なし

XIII. 備考

その他の関連資料

配合変化試験⁵⁾

目的

本製剤を他剤又は嗜好品と配合した際の物理化学的变化を確認するために試験を実施する。

方法

本製剤と他剤又は嗜好品を下記条件で配合及び保存した後、下記試験項目について確認する。

保存条件及び配合方法

保存条件	①他剤との配合	25°C、75%RH、非遮光、開放
	②嗜好品との配合	室内なりゆき温湿度、室内散光下
配合方法	本製剤 1 g と他剤又は嗜好品をメスフラスコ(非遮光)内に混合し、保存する。	

試験検体、試験項目及び試験回数

ロット番号	T003	
試験項目	①他剤との配合	性状(外観・湿潤状態・におい)、重量変化率 ^{※1} 、定量試験 ^{※2}
	②嗜好品との配合	性状(外観・におい)、定量試験 ^{※2}
試験回数	1回	

※1： 重量変化率(%) = (本製剤と配合薬剤の混合・保存後の重量 / 混合前の合計重量) × 100

※2： 配合直後のセフジニル量を100とし、[]に表示量に対する含有率を示す(%)

結果

①他剤との配合

試験実施：2011年6月

分類	配合薬剤名(成分名又は分類名) 配合量	試験項目	配合結果			
			配合直後	1日後	3日後	7日後
去 た ん 剤	ムコダインDS50% (L-カルボシステイン) 配合量：1.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の微粒状の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の微粒状の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の微粒状の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の微粒状の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	100.89	101.64	102.09
		定量試験 (%)	100.00 [99.81]	99.53	100.11	99.58

な 実 一
し 施 ..

XIII. 備考

分類	配合薬剤名(成分名又は分類名) 配合量	試験項目	配合結果			
			配合直後	1日後	3日後	7日後
抗 ヒ ス タ ミ ン 剤	ペリアクチン散1% (シプロヘプタジン塩酸塩水和物) 配合量: 0.4g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	100.51	100.57	100.64
		定量試験 (%)	100.00 [99.84]	99.89	100.03	99.71
	ポララミンドライシロップ0.2% (αクロルフェニラミンマレイン酸塩) 配合量: 1.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 淡黄赤色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 淡黄赤色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 淡黄赤色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 淡黄赤色の細粒の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	わずかに凝集が認められた	わずかに凝集が認められた	わずかに凝集が認められた
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	100.32	101.39	100.46
		定量試験 (%)	100.00 [99.60]	99.66	99.79	99.51
	ニボラジン小児用細粒0.6% (メキタジン) 配合量: 1.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	100.55	100.77	100.81
		定量試験 (%)	100.00 [99.34]	99.33	99.83	99.65
	クレマスチンDS0.1%「タカタ」 (クレマスチンフマル酸塩) 配合量: 1.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物
湿潤状態		湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	
におい		甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	
重量変化率 (%)		—	100.37	100.37	100.45	
定量試験 (%)		100.00 [99.92]	99.17	99.68	99.22	
鎮 咳 去 たん 剤	アスピリン散10% (チペピジンヒベンズ酸塩) 配合量: 0.4g	外 観	淡赤白色の細粒と だいたい色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と だいたい色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と だいたい色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と だいたい色の散剤の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	100.57	100.74	100.82
		定量試験 (%)	100.00 [99.78]	99.96	99.76	99.28
止 しゃ ・ 整 腸 剤	ラックビー微粒N (ビフィズス菌製剤) 配合量: 2.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の散剤の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	101.20	103.13	105.55
		定量試験 (%)	100.00 [100.42]	99.03	99.63	99.16

—: 実施なし

分類	配合薬剤名(成分名又は分類名) 配合量	試験項目	配合結果			
			配合直後	1日後	3日後	7日後
止 し や ・ 整	ビオフィェルミン配合散 (ラクタミン) 配合量：3.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	100.86	102.14	104.27
		定量試験 (%)	100.00 [100.15]	99.79	99.82	99.62
腸 剤	ビオフィェルミンR散 (耐性乳酸菌製剤) 配合量：1.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	101.46	102.96	104.55
		定量試験 (%)	100.00 [99.91]	99.41	99.92	99.33
腸 剤	ミヤBM細粒 (酪酸菌製剤) 配合量：1.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の細粒の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	100.79	101.33	101.86
		定量試験 (%)	100.00 [99.71]	99.64	100.04	99.43
気 管 支 拮 張 剤	メプチンドライシロップ0.005% (プロカテロール塩酸塩水和物) 配合量：1.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の粉末の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	100.37	100.43	100.46
		定量試験 (%)	100.00 [98.22]	99.94	100.64	99.91
拮 張 剤	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 (ツロブテロール塩酸塩) 配合量：1.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の顆粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の顆粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の顆粒の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の顆粒の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	100.37	100.39	100.45
		定量試験 (%)	100.00 [99.54]	99.61	100.30	99.51
止 血 剤	トランサミン散50% (トラネキサム酸) 配合量：1.0g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と 白色の散剤の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率 (%)	—	100.41	100.52	100.56
		定量試験 (%)	100.00 [99.60]	99.52	100.11	99.82

—：実施なし

XIII. 備考

分類	配合薬剤名(成分名又は分類名) 配合量	試験項目	配合結果			
			配合直後	1日後	3日後	7日後
解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン「JG」原末 (アセトアミノフェン) 配合量：0.5g	外 観	淡赤白色の細粒と白色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と白色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と白色の散剤の混合物	淡赤白色の細粒と白色の散剤の混合物
		湿潤状態	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった	湿潤はなかった
		におい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい	甘いにおい
		重量変化率(%)	—	100.47	100.51	100.57
		定量試験(%)	100.00 [99.87]	99.56	99.68	98.97

—：実施なし

②嗜好品との配合

試験実施：2011年6月

配合嗜好品名 配合量	試験項目	配合結果	
		配合直後	1時間後
サントリー天然水 配合量：25mL	外 観	淡赤白色の細粒が混在する液	淡赤白色の懸濁液
	におい	甘いにおい	甘いにおい
	定量試験(%)	100.00 [102.79]	99.42
健康ミネラルむぎ茶 配合量：25mL	外 観	淡赤白色の細粒が混在する褐色の液	褐色の懸濁液
	におい	特異なにおい	特異なにおい
	定量試験(%)	100.00 [103.93]	100.28
お〜いお茶 緑茶 配合量：25mL	外 観	淡赤白色の細粒が混在する黄褐色の液	黄褐色の懸濁液
	におい	甘くわずかに特異なにおい	甘くわずかに特異なにおい
	定量試験(%)	100.00 [95.73]	103.50
明治おいしい牛乳 配合量：25mL	外 観	淡赤白色の懸濁液	淡赤白色の懸濁液
	におい	甘いにおい	甘いにおい
	定量試験(%)	100.00 [97.88]	100.19
明治ほほえみらくらくキューブ 配合量：調乳したものの25mL	外 観	淡赤白色の懸濁液	淡赤白色の懸濁液
	におい	わずかに甘いにおい	わずかに甘いにおい
	定量試験(%)	100.00 [99.44]	100.34
Dole オレンジ 100% 配合量：25mL	外 観	淡赤白色の細粒が混在する黄色の液	黄色の懸濁液
	におい	酸味のあるにおい	酸味のあるにおい
	定量試験(%)	100.00 [102.13]	101.22
Dole アップル 100% 配合量：25mL	外 観	淡赤白色の細粒が混在する白色の液	淡赤黄色の懸濁液
	におい	甘いにおい	甘いにおい
	定量試験(%)	100.00 [103.14]	100.58
ポカリスエット 配合量：25mL	外 観	淡赤白色の細粒が混在する懸濁液	淡赤白色の懸濁液 (細粒は崩壊)
	におい	特異なにおい	特異なにおい
	定量試験(%)	100.00 [99.64]	100.62

配合嗜好品名 配合量	試験項目	配合結果	
		配合直後	1時間後
Bigプッチンプリン 配合量：20g	外 観	淡赤白色の細粒と 黄白色の半固形の混合物	淡赤白色と黄白色の混合物 (細粒は崩壊)
	におい	甘いにおい	甘いにおい
	定量試験 (%)	100.00 [101.13]	99.60
明治エッセルスーパーカップ超バニラ 配合量：20g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の半固形の混合物	淡赤白色と白色の混合物 (細粒はわずかに崩壊)
	におい	甘いにおい	甘いにおい
	定量試験 (%)	100.00 [100.74]	100.17
明治ブルガリアヨーグルト 配合量：20g	外 観	淡赤白色の細粒と 白色の半固形の混合物	淡赤白色と白色の半固形の混合物 (細粒は崩壊)
	におい	特異なにおい	特異なにおい
	定量試験 (%)	100.00 [100.81]	99.32
おくすり飲めたねスティックタイプ(いちご味) 配合量：20g	外 観	淡赤白色の細粒と 赤色のゼリーの混合物	淡赤白色と赤色のゼリーの混合物 (細粒は崩壊)
	におい	甘いにおい	甘いにおい
	定量試験 (%)	100.00 [94.01]	100.90

